




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1080/A

C. II. 1080/A
16/25


16.A.2


28952


1080

Pt. 3 (Ficinus) writing

20/12/11







28952
HYGIEINA,

id est,

DE SANITATE
VENDA, MEDICI-
NÆ PARS PRIMÆ.

Auctore

TIMOTHEO BRIGHTO CAN-
tabrigiensi, Medicinæ Doctore.


Cui accesserunt De Studiosorum sanitate
libri III. Marsilii Ficini.

Ἀσκησις ὑγιεινῆς ἀγωγῆς τοφῆς, ἀσκήσις πόριαν.



F R A N C O F U R T I

Ex Officina Paltheniana, sumtibus hered.
Petri Fischeri & Ionæ Rhodii.





AMPLISSIMO ET

HONORATISSIMO DOMINO, DN.

Guiljelmo Cecilio, Equiti aurato, Baroni Burghliensi, summo

Angliae quaestori, & Sacri Regii Senatus Consiliario,

atq; Cantabrigiensis Academiae Can-
cellario.



Eteri more, honoratissime domine,
qui praeceptoris viva voce habebatur,
artes bonas docendi, discendiq; amisso,
sapientiae in primis iactura maxima, te-
poris nonnulla sumtus aliqua infelix
subrepsit, qui libris atq; doctorum monumentis le-
gendis continetur. Hinc scholis Philosophiae qui ho-
die praeficiuntur maximam partem librorum inter-
pretes facti sunt: haud sapientiae magistri. Qui vero
auscultatione qualicunq; illa spreta, ex doctorum
monimentis seipsum sibi statuunt doctores: certe
multae lectionis homines evadunt, haud multae sci-
entiae. Ex quo quum constans vix vlla doctrina tra-
datur, tot oriuntur eadem de re discrepantes homi-
num sententiae, cum quisq; quod apud magni nominis
auctorem legerit, rueri contendat, scire demum quo
fundamento rationis consistat, vel qua naturae luce
collocetur, perpendere negligat fere unusquisque.
hinc nata tanta scriptorum ambitio, tanta scribendi lu-
xuria, tanta sapientium in specie multitudo, tanta vere
sapientium orbitas atq; solitudo. Cum rectum & verum
existat unum a quo deflexum ubi sit, vel millefariam
liceat errare. Sed quid haec ad amplitudinem tuam, vel
nomini tuo inscriptam Hygieinam meam? permultum
sane in utramque partem. Nam & tu is es, quae sapien-
tia, rerumque gestarum prudentia, summo honoris

loco collocavit. Es Cantabrigiēsis Academiæ patro-
nus, es Cancellarius, deniq. is es qui facilis, & atten-
tus iustam qualemcunq. literarum nomine susce-
ptam accipies querelam. Et ego is sum cuius studia
ita comparata sunt, vt rerum natura ob oculos po-
sita, & superstitione ex auctoritate scriptorum nata,
excussa; quod in medicina verum, quodque germa-
num, & breuiter tradendum, & dilucide explican-
dum mihi ipsi proponam. Accipe ergo, honoratissi-
me Cecili, & consilii, & facti mei rationem paulo al-
lius repetitam. Omnis recta docendi ratio duobus
hisce, breuitate, perspicuitateq. continetur. Cū tota
rei doctrina ita traditur, vt nec heterogeneis impu-
ra sit, nec tautologiis molesta; ea demum brevis re-
cte dicetur: quæ autem à summis orta, per interme-
dia, ad ima fluens, methodo proponitur, omnē per-
spicuitatis euentiam continebit, qua & facilius
concepitur, & altius insidet memoriæ. Hac docendi
ratione caruit iam diu Medicina, cū auctorū nemo
his limitibus cingi se pateretur, quin, modo physicū
agere, modo palæstritam, modo coquum, modo a-
stronomum, deniq. nihil non esse, medicorum ha-
bitum sit munus & officium. Videlicet artes varias
vt vsu miscentes, quod omnino valetudinis curato-
ri foret necessum, ita parum admodum spectantes
præcepta finibus coercēda suis, nec ex æquo & iure,
alteram alterius possessiones fas esse inuadere. atq.
hoc primum male prolixam habet medicinam. Ad
hæc accedit, quod potius librorū molem quam rei
argumentum spectantes, Asiatica redundantia rem
medicam voluminum multitudine auctiorem red-
diderunt, præceptis autem ieiuni atq. aridi ipsi, qua-
lem & quantam à patribus acceperunt, talem atque
tantam lento incremento & posteris tradendam
constituerūt. Qui autem aliorum redundantia am-
putate studuerunt, verborum, non argumenti bre-
uitatem

uitatem sequuti sunt inde nihilominus quā illi ipsi quorum castigatores haberi volunt, fiunt alienis & impropriis redundantes; nec non idem sapius locis variis contra breuitatis leges, docere ex diligentis magistri officio æque statuerunt. Itaq. primus hic labor mihi suscipitur, & heterogeneorum expurgandorum, & quæ multis cognatione communia sunt, omnibus semel, nō seorsim singulis tradendorum, semper instituti memor, nec facile lectorem tautologiis obtundens. magna sane virtus, dūmodo eam assequamur. sequimur profecto, atq. dum vita superit, studiose sequemur. Atq. hæc prima virtus artis recte tradendæ existit: hic nostri prima laboris seges. Altera perspicuitatis est, quæ methodo ab vniuersalibus ad specialia, id est, à causis ad effecta transitionum gradibus sensim descendit, cuius methodi fructum cum animo perpendo, eademq. alias fere iam omnes artes dotatas considero, vt ita exultas prædico beatas, sic subit dolor vicis nostræ quibus tādīu inculta iacuit medicina. atq. hæc secūda laboris nostri materies: videlicet vt præcepta vera, propriaque pro lucis splendore, quo prima posterioribus collucet, primam sedem obtineant; reliqua, prout aliorum luce illustrari opus habet, propria serie deinde consequantur, dum in omnium postremo consistimus, quod reliquorum lumē postulat, ipsum per se perobscurum, & omnem mentis aciem fugiēs. Habes cōsiliū mei rationem, & metam studiorū, quam omnes mecum spectare debent medicina, atq. reliquarum disciplinarum doctores: eam qui attigerit, nihil ei desit quod ad breuiter facileq. docendi laudem pertineat: qui proxime attigerit, hic secundus est, quo loco in instituto tam præclaro, vel etiam infra secundos consistere pulcrum & honestum habendum. Secundum hæc leges vniuersum sapientiz studium si traderetur, (ita autem tradi deberet)

TIMOTHEI BRIGHTI

6
 & plura facilius, & certius quam ut nunc res philo-
 sophica habet disceremus. Meæ tenuitatis, probe
 conscius sum, nec nō memor dicti illius magni Ga-
 leni, *Se maxime quemq; vereri oportere.* Quid vero præ-
 stiterim reipsa testari malo, quam verbis meis præ-
 dicari. Animum quidem certe adhibui, & votū ma-
 ximum, facultate autem, si viris & usu, ætate, & stu-
 dio, & otio maiore affluentibus minus satisfaciam,
 nec mirum, qui nec ipse mihi satisfaciā. Quid tom?
 etiam num tacendum foret? Nequaquā. Dies multa
 docet mortales, & dies diem. Hanc diecularū mea-
 tum *παρδ' αἶαν* ingenue offero, fructum labo-
 rum: daturus & politiora hæc & maiora alia, ubi æ-
 tas, otium, studium, usus vberiore nos proventu au-
 xerint. Cui namq; ita vita instituitur, ut aliis prodes-
 se velit, id maturissime fieri & vitæ breuitas, atq; in-
 constantia, & rei usus in primis postulāt. Operis dif-
 ficultatem norit is, qui in hoc genere aliquādo fe-
 cerit periculum: otiosi homines & ignaui, nec pos-
 sunt, nec velint recte iudicare. Hic te vnum hono-
 ratissime Cecili, & instituti mei & operis testem, ac
 arbitrum posco; qui & ex ingenii acie qua es acerrima,
 de instituto potes statuere: & ex vñ rerumque
 experiētia, corpore iam senili ac valetudinario, qua
 summa prudentia es, de re ipsa potes decernere.
 Totius medicinæ corpus mihi efformandum ad il-
 lam breuitatis, & perspicuitatis ideam proposui:
πρὸς πλάσµα effinxi vniuersum, ad quod au-
 gustius opus aliquando dedolare cōtendemus. Hu-
 ius caput & pectus tibi, academici otii mei primitias
 offero; accipe modo precor vultu sereno; agnosce a-
 nimum, & amoris, & obseruantix testandæ cupidis-
 simum. Cantabrigiensis sum, & genere, & vitæ insti-
 tuto. His primum datum & solis luce frui, & quod
 longe maius est religione pura, & liberalium scien-
 tiarum præceptis erudiri Deniq; Cantabrigiæ & Hy-
 gicinam

gieinam hanc, & huic cōgenerem *Therapeuticam* adhuc pressam, edendam tempore commētati sumus, quo ergo piaculo, isto te taceam monumento amplissime Cancellarie? Est istud profecto, Academia priuilegia tueri, immunitates augere, literatis fauere, quod tu facis, à Cantabrigiēsis academicis, inter quos ego profiteor nomē meum, amorem, cultus officium, fausta vota, omnia deniq. quantacunq. illa sint, iure tuo venditare. Respice ergo nos, & munusculum leuidēse, nec ex munere animum, sed ex animo munus metiare. Hāc tuę amplitudini statuo columnam, inscriptam G. C. literarum patrono, quandiu libri mei genius in choro musarum sedes egerit, tandiu duraturam. Dabo autem quam meritus es si uiuo, ex materia nobiliore ac opere magis Phidiano, & Praxiteleo interea dum digniora tibi paramus, hęc boni consule, & huiusce æternæ laudis cumulum ex Musarum amore, atq. earundem ipsarum huiusce templi sacrosancti cultu perge tibi quam vberimum facere. Misericors Deus amplitudinem tuam cum Ecclesiæ ipsius tum huic Reip. & in ea Cantabrigiensibus tuis quam diutissime seruet incolumem.

Amplitudinis tuę obseruantis.

TIMOTH. BRIGHTVS.

▲ ▲

P R Æ F A T I O
Ad studiosum Lectorem.

Nemo omnium recte de re literaria iudicantium est, studiose Lector, cui non magni illius P. Rami & vita gloriosa fuit, & philosophandi institutum fructuosum. Cades nefanda, & post homines natos crudelitate, ac scelere memorabilis, quæ una cum infinitis aliis, & piis & doctis viris extinctus est, diris omnibus execranda. Huius summi viri auctoritate, & exemplo, iam tum cum primum medicos sequutus sum, ad meam utilitatem gnesia medicina præcepta ab alienis quantum ingenio potui, segregavi. Quæque pluribus communia, & sæpius repetita percepi, ad unum caput retuli, tradendæ, semel, ne latius manarent limitibus, cinxi, ordinæ, digesti. atq; hoc quo me ipse tantum studiis, viam sternerem & magis expeditam darem: & ut legendo, auscultando, meditando iudicio creui, definire atq; diuidere aliter paulo quam vel legendo, vel auscultando edoctus sum, tentavi. Sed hac parce atq; timide, cum hæc duo, recte definire ac diuidere humana mentis vim maximam contineant, & mille ingenii contentiones postulent. Aperio sodalibus meis studiorum rationem; probant, suadent pergere, fructum sæpe estantes, & honestum animi laborem. Ego sponte mea (quanquam id lente sane) incedens, horum impulsibus alacrius occurro expetito labori. Et quantum ingenio, & iudicio, & otio possum, tantum huic operi inprimis dandum existimo, & uniuersa medicina corpus efformandum mihi propono, non eo certe consilio unquam, ut theatro spectandum proponeretur, sed animi tantum causa, quo & cupiditati meæ satisfacerem, & auctoribus illis meis obtemperarem. Tandem adumbro, ut caput, & truncum, & artus liceat internoscere, apud me conditæ conscientia pudibundus, celari res nequit. Petunt à me, atque adeo precibus contendunt optimæ spei adolescentes Cantabrigienses mei copiam mearum obseruationum ipsi facerem, adeoq; eas qualescunq; viua voce priuatim interpretarer. Ego, promtior fortasse quam me longe impari oneri deceret, libenter annuo, sperans umbratilem hanc pro-

festio-

AD LECTOREM.

feſſionem, & acuen- di ſtudi- rationem mihi ipſi fore, & aliis,
 quibus ingenue labores meos communicari, rei gerenda ma-
 teriam daturam. Adſunt, auſcultant, dubitant: & ut Phi-
 loſophos decet, libere quarunt: ac demum opera muſtua colla-
 ta, interdum noſmet expedimus harentes, & difficultates ſu-
 peramus. Hoc conſilium inſtituti noſtri, ſtudioſe lector, hac
 progreſſus ratio. Reliquū eſt ut & cauſſam editionis narrem,
 & quid ipſe ad medicinam methodo explicandam præter ce-
 teros contulerim, vel certe contuſſe ſtuduerim, paucis expo-
 nam. Editionis itaq; cauſſam ſic habeto: Cum ſentirem audi-
 tores meos ſcribendi radio laborare, atq; exemplaria quæ plu-
 rima ſcriptorum vitio deprauari, cæpi deliberare, quo pacto,
 & hos ſcribendi onere liberarem, & integritati operis mei in-
 primis conſulerem, quod ratione nulla commodiore quam ty-
 pographia, fieri potuiſſe percepi. Itaque ſcriptis illis meis dili-
 gentius paulo recognitis, primam laboris partem, prælo tra-
 dendam curavi. Tantum primam, quod cum per humani in-
 genii imbecillitatem in re omnium difficillima, aggreſſus pri-
 mo, ſoli nec pro rei magnitudinis ſatis exercitato, errandi fere
 neceſſitas incumberet, in eo malui periculum facere, in quo
 errare foret leuius, & me in parte potius operis, quam in ipſo
 toto cenſorii hominum iudicii exponere. Qui proſecto cenſo-
 res ſi rei difficultatem perpenderint, vel ipſi in arenam hanc
 aliquando deſcenderint, erunt ſpero æquiores; ſin vero rei per-
 ſectæ, atq; muneris abſolutæ, fructum teneant animis præpon-
 deratum, tanti operis quantumvis inceptor ſi indulgebunt fa-
 ciles, atq; promti adiutabunt conſiliis, ut pluribus conantibus
 aliquid tandem, eſi non perfectum, ſaltem quod à perfectæ
 haud vehementer abhorreat, Medicina ſtudioſorum mani-
 bus teratur: atq; aſſimatores noſtri, ſi loco alio nullo, patien-
 tur, ſuit hac ſaltem animi noſtri ſignificatio quadam, & tan-
 quam monumentum viris & doctioribus & otio maiore A-
 cademiæ profeſſoribus inprimis (qui Regum ſtipendio vi-
 ſitant) abundantibus: quos ego per omnes muſas, & Aſcle-
 piadas patres obteſtor, nunquam committant diutius, cum re-
 liqua diſciplina, & breuitati & perſpicuitati luminibus

excellant, hac una tam præclara, tam necessaria, atque adeo
tam professoribus ipsis questuosa, heterogeneis impura sit,
tautologiis molesta, tota denique vix ars aliqua, sed ignobilis
quadam empiria habeatur. Ego si præpropere probro diluen-
do me contulerim, dabitur iusto dolori meo. Dedi quidem cer-
te operam (disco de Hygieina, & dabitur tempus sociam The-
rapeuticam expromendi) ut de temperamentis, de partium
usu, ac fabrica, de alimentis Physica, de generibus exercita-
tionum gymnastica & palæstrica, de alimentorum præpara-
tione & apparatus, culinaria, heterogenea cum sint singula,
cedant germanis Hygieina præceptis, qua indicata & con-
clusa, definitionibus, partitionibus, distributionibus, affectio-
nibus communibus & propriis comprehensa, methodo illa ar-
tium tradendarum unica ab universis ad singula disponere
studuimus. Quo labore nostro multa reliquimus fateor cogi-
tationibus posterioribus, quibus primo quoquo oris, & uberio-
ra hæc, & distinctiora dabimus, interea præsen-
tibus fructu, & inceptis
faus.

HYGI-

HYGIEINA, ID EST,
DE SANITATE TVENDA,
MEDICINÆ PARS PRIMA.



Edicina est ars curandi valetu- *Medicina.*
dinem corporis humani.

Medicinæ partes sunt duæ: *Eius par-*
ύγεινῇ & θεραπευτικῇ. *tes duæ.*

Υγεινῇ est pars medici-
næ de sanitate tuenda.

Sanitas est corporis *ὑγία- Sanitas.*
συνῇ actionibus salubriter obeundis apta.

Sanitatis membra sunt duo: Eucrasia, & salubris
Diaplasis.

Eucrasia est pars sanitatis, qua ad crasis proprias a- *Eucrasia.*
ctiones salubriter præstandas, primis qualitatibus
partes temperantur.

Eucrasie membra sunt duo: elementariū qualita-
tum mistio salubris, & calidi innati certa proportio.

Elemētarium qualitarum mistio salubris est, qua *Elemen-*
eis ipsis partes salubriter temperantur: ut, cutis tem *tariū qua-*
perata, ab hac ad calidum flectentes sequenti serie: *litatum*

Renes, Lien, Iecur, Caro simplex, Pulmo, Cor. *mistio:*

Ad Frigidum.

Cerebrum, Spinx medulla, Nerui tātum sentien-
tes, Nerui motionis, Vena: Arteria, Membrana, Ten-
do, Ligamentum, Chondrosyndesmus, Cartilago,
Os.

Ad Humidum.

Nerui sensus, Cor, Renes, Iecur, Lien, Caro simplex, Pulmo, Spina medulla, Cerebrum.

Ad Siccum.

Nerui motionis, Vena, Arteria, Membrana, Tendo, Ligamentum, Chondrosyndesmus, Cartilago, Os.

Hac de Crassis parte elementari; sequitur innati calidi proportio.

Innati calidi proportio.

Partes quo publica magis sunt aut his ortu vicinae, eo calore nativo vberius perfunduntur: vt,

Classe prima: Cor, Arteria, Pulmo.

Secunda: Iecur, Vena, Ventriculus, Intestina, Vesica fellea, Lien, Renes, Testiculi, Uterus, Vesica, urinae receptaculum.

Tertia & vltima: Cerebrum, Nerui sensus, Spina medulla, Nerui motionis, Membranae omnes, Tendo, Chondrosyndesmus, Cartilago, Os.

Hac de Eucrasia; sequitur Diaplasis salubris.

Diaplasis.

Diaplasis salubris, est pars sanitatis, qua corporis partes in organa, actionibus idonea finguntur.

Huius membra sunt duo: partium symmetria, atque harum constructio.

Symmetria partium.

Partium symmetria est, qua altera ad alteram existit analogia.

Symmetriae partes sunt duae: Partium quantitas analogia, & earum figuratio.

Quantitas.

Quantitas est, qua quantitate sunt analogae: estque vel secundum magnitudinem, vel secundum numerum.

Secundum magnitudinem, qua nec maiores, nec minores iusto sunt.

Secundum numerum, qua nec plures nec iusto pauciores.

Figuratio

Figuratio analoga est, secundum quam figuram *Figura-*
naturalem qualibet sortita est. *tio.*

Estq. figurationis analogia, vel secundum orga-
norum cavitatem: vel secundum soliditatem.

In cauis requiritur eorum— ipforum libertas, &
implitudo.

In solidis, asperitas, leuitas, vel aliter pro naturæ
sue figuratio.

Hæc de Symmetria; sequitur Constructio:

Constructio est pars Diaplasis, qua organa inter *Constru-*
se salubriter aptantur. *ctio par-*

Constructio continetur partium situ, atq; inter *tum.*
se nexu salubri.

Situs est, quo suam qualibet locum obtineat. *Situs.*


Nexus est, quo concinne partes copulantur. *Nexus.*

*Hæc de sanitatis membrum, cuius omnis Diaplasis ratio,
melius ex anatomia, quam præceptis
intelligitur.*

Signa sanitatis sunt actionum operumque salu- *Signa sa-*
britas: quæ & tempestiua sint, aut porro quantitate, *nitati.*
qualitateq. moderata.

Sanitatis tutela continetur diætâ.

Diætâ, est ratio salubriter vtendi rebus ad vitam *Diætâ.*
necessariis. Ex autem generibus distinctæ tales sunt:



DE SAN. TVENDA, PARS I. 15

Dieta partes sūt duę: Diateretica & Prophylactica. *Dieta*

Diateretica est pars dīta, qua sanitas firmatur. *partes.*

Diateretica est duplex: Communis, Specialis. *Diatera-*

Cōmunis est, quā omnium sanitatis specierū est. *tica.*

Diateretica cōmunis primum caput est, gesta fo- *Cōmunis.*
mentis pro corporis viribus quantitate exquare,
qualitate corporis crasi respondere. Ergo primū ge-
storum Diateretica communis, mox fomentorum.

Excretiones publicæ primo irritamento, excer- *Diateresis*
nantur, & à somno nocturno, exporrecto, sine mo- *motus sui*
ra expediantur. *ipsius*

Priuatæ, vt molesta sunt, egerant excremēta pri- *caussa.*
uata: hic cerebri anterioris, naribus emunctis, etiam
interdum vbi nil mouet, excrementa prolicienda.

Ablutiones, aqua dulci, temperata calore fiāt, pro
fordium ratione, si vniuersales futuræ sint: sin parti-
culares videlicet oris ac vultus, frigida curentur, at-
que os, sensoriaq. aluo ac vesica prius solutis, prolu-
antur, cura ne quid in auris meatum instillet adhi-
bita, ac demum dentes tergendī.

Exercitationes, & corporis & animi omnis mo-
tus vehementior, suscipiantur lente primum, tū in-
ualescant: alui atq. vesicæ excrementis prius depofi-
tis, mane, ventre ieiuno, capite retrorsum bene pe-
xo. Sin exercitatio ea corporis sit, ante ipsam leni-
ter corpus fricandum, & vngendum oleo dulci; vel
ambulatiuncula præparādum. Ea autem vniuersalis
esto, cum vocis contentione; ac pariter animum ob-
leſtet: quō in genere parux pilæ ludus excellit. Cef-
satio esto ante defatigationem: adhuc tumefcente
corpore, colore florente, concinne motus edente,
& cum vapore calido sudante.

Post exercitationem, vel molliter inambulandū,
spiritu contento, vel apotherapeia vtendum.

Esto autē exercitatio corporis omnis si sub dio sit
(quod saluberrimū) in vmbra parietis aut viridarij.

fin sub tecto, esto illud tectum longum 40. pedes, latum 18. altum 22.

Quibus vita laboriosa agitur, his labor exercitationis vicem supplebit.

Post cibum, quiescendum horam vnam, tū molli-
bus passibus incedendum, vt cibus descendat.

Ante cœnam, satis erit vel celeriter deambulare.

Animi studium si vehementis sit contentionis, à
solis orta haud vltra horā ante prandiū durer. Man-
suetioribus autem studiis hora tantum vna pomeri-
diana impendenda, detumescēte iam ventriculo.

Perturbationes ne vehementer admodum cor-
pus agitent, curandum.

*Haecenus diateresis motus sui ipsius tantum gratia;
sequitur qui proliu item.*

*Diateresis
motus
proliu gra-
tia.*

Concubitus esto nocturnus: corpore exercitato
die hesterno, & moderato nutrimento, eoque con-
sueti refecto: à somno primo, cōcoctione perfecta.

Suscipiat autem (maxime maribus) non ante
expletum tertium septennium.

Mulieribus esto à purgatione menstrua quā mox
finita.

Concubitum somnus excipiat leuis.

Mēstrua purgatio mulieribus à 14. ad 45. plus mi-
nus; iuuenibus luna noua, prouectioribus plena,
pro mulieris natura, satis copiose profluat, pragnā-
tibus, & lactantibus exceptis.

*Quibus
signis con-
ceptus
mulieris
deprehen-
datur.*

Concepisse mulierem, ac iam vtero gestare hisce
signis deprehēdetur: post concubitū, viri semē non
effudit. Et in ipso coitu horrorem quendā percepit:
& moderato dolore secundū pudendum, ac vmbili-
cū vexatur. Pudēdi sinus, atq. os, aridiora sunt: vteri
tamen osculo, nec duro, nec inflammato; sed ipsum
bene occlusum, & aliquantulū sursum progressum.
Tandem veneris appetentia languet, nec menses
consueti tempore apparent: venæ pectoris virent,
mammæ

mammæ intumescunt; cavitates oculorum subpal-
lida fiunt; colli pars anterior, calidior, cernix frigi-
dior apparet. Et circa secundum mensem, fere falsa,
aut acida, appetunt. Si vrina subalbida, clara, nubilo-
so rore supernatante, ac stellati lapidis colorem præ-
se ferente; atomisque in ea ipsa ascendentibus, de-
scendentibusque fuerit, argumentum initii conce-
ptionis est, post a conceptu primo mense, ima sua
parte, candicantia corpuscula ad farinæ crassioris
speciem subsidet, quæ commota, carminati xyli, co-
toniue effigiem referunt, atque tempore adhuc ac-
cedente, flaua, deinde rubra, puniceaue, postremo a-
tra (nubecula parte superna rubore suffusa) euadit.

Vbi hæc signa apparuerint, vel horum aliqua, præ- *Prægravi-
tatem dia-*
gnans censenda, atque tum omnem motum vehe-
mentem fugiat, nec mammas cōstringat, nec nimis *ta.*
arcte cingatur. Atq; hoc toto gestationis tempore.

Mense octauo, tranquilla sit quoad fieri potest, &
cibos accipiat solito parcius, & (si cum pondere pen-
det) ventrem fasciis diligenter suspendat cōstri-
ctum: ceroto etiam ex oleo viridi, vel myrtino, vel
alio adstringente aliquo, cutem ventris oblinat: vt
solidior euadat, nec in partu conatibus rumpatur:
præterea sanguinalem herbam decoctam interdum
bibat.

Mense nono, inferiores partes latius obuoluat,
superiores perstringat: loci item vnguentis & mu-
cilaginibus mollientibus laxandi: & balneo frequē-
ti vtendum. Diebus autem partui propinquis, viris
abstineant prægnantes.

Vbi vero ipsum pariendi tempus instat, atq; par-
turi cœperit, super lectum iaciatur, strato duro,
pedibus duplicatis, ac femoribus expansis: atq; tum
digito peruncto, orificium matricis leniter, ac si-
ne quassatione aperiatur, cumque ad oui magnitu-
dinem corium percipitur, tangenti obstetrici, ad sel-

B.

*Qua cir-
ca partu-
rrientes ob-
seruanda.*

lam leuetur. Atque si lassa, & imbecillis fuerit, in lecto pariat, alias, vel in sella, vel in mulieris femoribus parere poterit.

Toto partus tempore, calidum aerem sustineat, & semper obstetricem adiuuet conatibus.

Si in lecto pariat, habeat obstetrix sedile modice inferius, ut ibi sedens, facile manus immittere possit.

Sin autē sedens in sella paritura sit, obstetrix sella humiliore sedeat, ut ex superioribus partibus infantem possit adducere: pedibus interea expansis.

Ne pariens prę verecundia se concludat, obstetrix faciem auersam habeat.

Parturienti autem omnia ligamenta auferantur, obstetrix digito sinistro oleo calido peruncto orificium matricis circumagendo aperiat, ut corium illic cadere possit.

Pariens, cum dolor occurrit, quantum potest, spiritum cohibeat, neque clamet quicquam.

Si corium nondum rumpatur, obstetrix ungibus rumpat, vel caute dissecet, si rumpi nequit, & immixtis paulatim digitis, plus aperiat.

Matrice aperiente se, tum conetur parturiens, cum concludit se, conari abstineat: atque obstetrix, cum aperuerit se, prehendam secundas, & in diuersum, huc atque illuc leuiter adducat.

A lateribus vero, ministrę sine quassatione, manibus apertis deorsum deducant.

Cumq; exire foetus coeperit, manibus lino tenui, ac molli moderate calefacto, extenso, cum suscipiat obstetrix, & ut vna secunda exeant, prouideat: quæ si restiterint, atque os vteri adhuc diductum fuerit, & relicta secunda alicui parti conuoluta adhaerit, manus sinistra calida, atque oleo illita in fundum dimittratur, atque secunda extrahatur. Sin vero sit fundo connexa, leniter, atque placide, primum in obliquum

bliquum deducatur, huc atque illuc circumagen-
o, deinde paulatim validius attrahatur.

Sin vulva os clausum fuerit, vtendum perfusio-
nibus, & sinistrae manus digitis leuiter aperiendum,
& paulatim dilarandum. Quod si minus successerit,
adhibendum adhuc perfusiones, fomenta hysteri-
ca & vnguenta mollientia atq; laxantia. Atq; si ro-
busta satis fuerit, ex tempore sternutamenta, ex ca-
toreo, pipere, sinapi & naribus ad mouenda: potio-
nibus vtendum ex rosīs pallidis recentibus, allio, ar-
temisia, althaea, pulegio, rubia & ceteris hystericis,
lecoctis: ex quibus & suffitus, & fomenta parari po-
terunt, die primo, aut altero exactis.

Si nec his secunda successerint, dilaceranda non
sunt: nam haud multis post diebus, putrefacta, & in
laniem resoluta excident per se.

Si plures infantes vno deferantur, iterum, a supe-
riore, infernaque parte sic referes, vt omnia sentim
fiant, & citra confusionem: locis oleo perunctis.

A partu, spongia longa extergeatur, iaciaturq; in *A partu*
lecto cubiculo obscuro, pedibus modice patentibus, *quid a-*
ne quid foras effluere promptum impediatur. *gendum.*

Loci ipsi, pannis contegantur calefactis, & fre-
quenter mutantur. Sed & lanis mundis oportet, &
ventrem, & pectinem tegere: & ipsam partem
oleo viridi modico vino admisto irrigare.

Biduo a cibo abstinere conuenit, vel hunc liqui-
dissimum, & tenuissimum sumere.

Tertio vero die, encathismate calido, & perun-
ctione curata, aqua calida facies fouenda, cibandaq;
simplici cibo, pane aqua calida macerato, & pulti-
bus, & ouis sorbilibus: atque aquam calidam, vel a-
lium dilutum, atque calefactum potum, ad biben-
dum dabis.

Septimo autem die, vbi nihil obstiterit, lauacro
repente vti poterit, & variis cibis validioribus paulo,

*Ad reprimendum
lac puerperarum.*

& vino modico aqua diluto, vel potionē paulo meraciorē: ac sensim ad consueta pergat omnia. A partu satis purgabitur, si sanguis fluxerit vberius primo, secundo feculentus & paucus, nouissime purulentus. Nisi mater ipsa infan-tem lactet, stringendū ei lac ac reprimendum: principio modice repellentibus, linteis postea madefacto, & mammis appposito, ac post folia portulacae trita cum aceto: oui album cum aceto agitarum: & cicuta trita, &c. sunt applicanda. Vltimo digerentia, cum modica astringentia: vt apium tritum cum aceto & rosaceo, vel petroselinum aut cuminum aceto tritum, &c.

*Hactenus de gestis quibus motus adhibemus,
sequitur quies.*

Quies.

Quies esto, dum vires recreentur.

Somnus esto nocturnus: hora vna, aut altera, a coena ineatur, lecto consueto.

*Somnus
quopāto
peragendus.*

Esto autem nocturnus, dum prima, secundaq; coctio absoluta sint: quod ex vrina colore flauo, percipitur, ructibus, ac ventre contractiore.

Dormiturus, incumbat lateri primū dextro, brachiis ac cruribus modice contractis: magis hyeme quam aestate, capite parum eleuato: vt caput altitudine par sit humero summo: ad finem vero somni, in sinistrum se conuertat.

Particulari quiete (si sensus gestum sit,) mutandum obiectum, vel cessandum prorsus.

Si motus sit, reponendum est membrum ea figura, qua maxime soluti sunt musculi, motionis auctores.

Atque brachiis conuenit obtusangula: cruribus paulo minus porrecta, reliquorum membrorum, prout sese senserit quiescens maxime leuari.

*Fomenta.
Aer.*

Hactenus de gestis sequuntur fomenta.

Aer purus esto: vt qui nec stagnorum, nec paludum (excipe Aegypti paludes quae solae salubres habentur),

bentur) nec fluminum vicinorum halitu perturbatur, nec barathro, nec metallis, nec sterquilini, aut cloacarum vicinitate inficitur, nec montibus vndique, ventis occluditur.

Alimentum, respondeat sumentis viribus, temperamento consentiat: si per se vires superet sumentum. *Alimentum.* si suppar sit, maiore quantitate quantum ad indigentiam explendam satis erit. Qualitate sapidum esto, vel arte fiat tale. Nunquam tepidum sumendum, nec potio. Sumatur suadente appetitum: vespere minus sumendum, & alimenta nutriendi viribus imbecilliora: qualitatibus, quam in prandio paulo calidiora, siccioraque: ut, cibo in tria distributo, partes duæ meridie sumendæ, tertia sub noctem. Atque potus tum parcior, & paulo meracior esto. Tempora cibi, ac potus eadem sint. Sumantur autem, post turbationem corporis, ab ista exercitatione sedatam.

Cibus potum præcedat, liquidus solidum, concoctu facilis, difficilem. Incipiat (si qua sint) a salsamentis, oleribus, ac similibus. Et tum caro. Cibi omnes vna mensa sumti, sint omnia quoad fieri potest similima virtute, temperamento, materięque firmitudine. Esto ex bene habitis omnibus, nec senio confectis. *Cibus.*

Panis esto fermentatus, autopyrus, sale aspersus. *Panis.*

Si potus ex aqua sit, esto aqua illa pura, limpida, omnis saporis expers, tenuis, ac levis. *Potus.* Ut pluuiialis, quæ sine æstatis, vel principio autumnii, vel æstate media fluit, silente cœlo. Mox, quæ cum tonitruis descendit, tertio fontana omnis, cuius fons ad solem orientem erumpit, curritque super arenas, ac terram puram. Si cereuisia sit, fiat ex frumento bene maturo, pleno, ac puro, & ex materia pura nec fuliginosa, nec putrida igni succenso, bene elixetur.

Inter cibandum, pitissando, per vices, alternis mo-

deratis, sumto prius cibo, bibendum: mensura, pro ciborum siccitate, ut penitus diluantur. Sin vero a cibo urgeat sitis, cocto iam cibo in ventre, affatim bibi potest. Etiam longiore temporis intervallo interposito, interdum liberaliter potare corpore duro, conducet.

Cauendum maxime ne tempus edendo potandoque protrahatur, quin bene mansus cibus nec nimis festinanter, nec lente nimis sumendus. Potio item sensim haurienda. A cibo, si quid dentibus ipsis inhæreat, lentisco, aut salice, purgandi sunt: & os (si ea glutinosa sint) vino proluendum, vel detergente aliquo.

Foris ambientia.

Hac de sumendis, sequuntur foris tantum ambientia.

Ea munda sint omnia.

Ædes.

Ædes ex materia sicca fiant, & minime cariosa, & parietibus bene crassis.

Plateæ.

Hic ciuitatis viæ, & plateæ, saluberrimæ sunt orienti, occidentiq; soli patentes, & recte, atq; inter se distantes æque. Ex yrbium partibus, aditissimæ sunt saluberrimæ. Vestimenta apta corpori sunt, & ex materia pura, nec nimis pondere grauante, satis tamen ad aeris ambientis iniurias densa.

Vestimenta.

Huius Diætæ anomalia communis, est ex consuetudine (consueta namq; (nisi insigniter dant) meliora) & vitæ ratione.

Diateretica specialia.

Hac generalis diateretica: sequitur ex sanitatis speciebus specialis.

Sanitatis species sunt duæ: Accurata & deflectēs.

Accurata.

Accurata est, cuius catalesce, ad opera summe disponitur.

Hinc namque opera, & corporis qualitates, perfectissima sunt, ac primum actiones animales motibus validæ, & concinnæ: sensus integri, insomnia leuia, & interdum de astris agilibus, ac splendentibus.

bus, diuos aliquid boni dantes, & mortuos puris, vestibus ac albis indutos etiam dona porrigentes in somnis interdum vident, nec ipsi somnolenti, nec peruigiles.

Cupiditates intra modum.

Thymoses virtutibus consentientes.

Pulsus ac respiratio, ad ceteros moderati.

Actiones naturales tempestiuæ, opera proprie dicta: tam humores, quam excrementa, nec quantitate nec qualitate admodum molesta.

Ex humoribus, sanguinis massa ita temperatur, ut huius sanguinea pars sit maxima, & copiosissima, mox pituitæ dulcis, tum melancholica, & crassa. Vltimo bilis, minima portio sit.

Deiectio inter durum, atque diffuens consistentia mediocri, colore paululum bile tincta, quantitate respondens esculentis.

Vrina, consistentia existit mediocri, clara, pellucida, pura, colore subaureo, hypostasi alba, leui, & æquali, in acutum fastigiata, quantitate respondens poculentis.

Corporis aliena qualitas nulla, aut grauis. Color cutis floridus, & tanquam ex albo, & rubro pariter mistis.

Crines capitis flauī in vigore ætatis dum puer, fuluiores pili, inter densos, & tenues moderati: inter crispōs, ac rectos medii.

Corpore habilissimo, ac dignitate summa.

Difficile foris occurrentibus offenditur, & æqualiter se habet ad excessus omnes: siue ex anni tempestatibus, siue ex erroribus diætæ.

*Hæc de signis accurate Sani, sequitur huius
Diætæ.*

Hic exercitationibus, ac studiis moderetur.

Somno sufficiant horæ 7. vel octo:

Stratum esto inter durum, ac molle moderatum.

B 4

*Accurate
sani diætæ.*

Circa res Venereas gerat se moderate.

Aura temperata qualitatibus esto, vel arte temperetur.

Si calida sit, refrigerantibus vt rosis, violis, vitis foliis, & capreolis, salicis frondibus stratis, ac appensis. Vel frigida alternis, de vase, in vas, crebra effusione: aeris ventilatione, &c.

Frigida, luculento foco: ex materia sicca & pura, aromatum suffitu, vel stirpium odoratarum: vt luniperi, roris marini, lauri, sampsuchi, &c.

Sicca, aqua vaporibus.

Humida, suffitibus, ac ignibus.

Si duabus qualitatibus aer excesserit, tot item gradibus aduersis temperetur, qualitatibus duabus.

Nutritum: Panis esto hesternus, ex tritico trimestri, maturo, puro, denso, fractu contumaci, colore aureo cuiusmodi est primum Siculum 2. Aphricum 3. Thracium 4. Assyrium 5. Ægyptium 6. Italicum, cetera vulgaria, nec ex recens nimis molita farina, nec præter modum pista: aqua saluberrima bene subacta, & sale, ac fermento, ad gustum condita.

Et ex tota farina confecta, in moderatos panes diuila, clybano nec vasto, neq; angusto, eoq; depresso, bene cocta. Cibus reliquus esto pro viribus alendi moderatis, & temperamento temperatis, elixis, vel assis, omnibus humore suo turgentibus.

Ex carnibus Quadrupedum: Hædina, vitulina, maxime lactens, tum non lactens: deinde, agnina non lactens, iuuenis castrati ex agnis suilla iuuenis, capreolus: cuniculi iuuenes, quadrupedum lingua, & glandula. Gallinæ castrata, ex voluctibus, anserum ala, ac ventriculus, gallinacei iuuenes.

Gallorum Indicorum, phasianorum, gallinarum, agrestium, attagenarum, gallinarum perdicum, phasianorum oua, cum cortice elixa, atque tantum tremula, nec tamen forbilia: suffocata, mollia, & horū vitelli, maxime recentia omnia. Lac

Lac recens, nec partui proximum, bubulum, cum
ale pauco, melle, vel saccaro, solum longe ab aliis e-
luliis, ventre ieiuno post quod os vino adstringen-
te proluendum, & dentes tergendum,

Caseus ouillus, recens, ac mollis, nec admodum
salus, nec nimis coagulo feruens, omnia locis salu-
tibus, ac temperatis nata.

Pisces puræ aquæ indigenæ, rapidæque, & nutri-
mento puro vtentes, modicæ magnitudinis, carnis
albæ, friabilis, pinguedinis modicæ: & ex marinis,
saxatiles vt scaræ, merulæ, turdi, iuliæ fusæ, percx,
item puri, maris aselli, mero. Ex stagnis marinis
rhombus sparus, nullus, buglossa, passer, denique
ex ceteris marinis cynedus, acus, hepatus, citharus
scorpius, erythrinus, coracynus, pagrus reus, torpe-
do, &c.

Ex fluuiatilibus Salmo, truta, perca, lampræta, flu-
rio, dracus, rubecula, gobiones, &c.

Ex oleribus maluæ ac lactucæ parum, ficus recen-
tes, ac vuç, maxime passulæ, pyra dulcia, ex fructibus.

Potus, vinum viribus moderatum, vel cereuisia,
ætate vtrumque moderatum.

Domus habitationis esto ad orientem, meridio-
nalemque solem. Sita loco nec edito, nec nimis hu-
mili.

*Atq; hac accurate sani diætæ esto, sequitur anoma-
lia ex vitæ instituto.*

Hic namq; si præceptis his vacare nequit, & spon-
tis suæ sit, nullis se diætæ legibus obligare debet. Sed
varium vitæ genus sequi, modo ruri esse modo in
vrbe, sæpius in agro, nauigare, venari, quiescere in-
terdum, sed frequentius se exercere, interdum bal-
neo. interdum aquis frigidis vti, modo vngi, modo
negligere, nullum cibi genus fugere, quo populus
vtatur: interdum in conuiuio esse, interdum se re-
trahere: modo plus iusto, modo non amplius su-

*Anoma-
lia ex vi-
tæ institu-
to.*

mere: bis die potius quam semel cibum capere: & dummodo coquat, semper quamplurimum: concubitum nec nimis concupiscere, nec nimis pertimescere.

Hac de sanitate accurata atq; huius diata, sequitur defleſcens.

Sanitas defleſcens. Sanitas defleſcens est, quæ ab accurata deficit: huius signa sunt defleſcentia opera.

Diata tot gradibus esto defleſcens.

Temperie defleſcens. Defleſcens duplex est: temperie, vel cōformatione. Temperie defleſcens est, cuius crasis defleſcit.

Signa sunt crasis opera defleſcentia, vt nutritio, eiq; seruiētes actiones naturales, & inde nata opera.

Diata temperamento tot gradibus defleſcat: si vitæ ratio impedierit, error in contrario potius quàm in simili committatur.

Crasi defleſcens est duplex: vel ad calidum, vel ad frigidum.

Temperies defleſcens ad calidū. Calidæ defleſcentis signa: iracundiores temperatis sunt, pulsus maiores, frequentiores, & respiratio talis, infantes dentiunt, augescunt, & ceteris articulate citius loquuntur.

Coſtio durorū ac validorum: vrina atq; deieſtio coloratiora, iam maturi, veneris appetentiores, semen his crassiusculum, & feruentius: masculorum generatores, temperatis percipiūtur calidiores. Colore rubido sunt, pilis nigris, hispidis, cito natis, venis latis, graciles, & adipis expertes, nisi vitæ institutum & consuetudo impedierit, caleſcunt promte.

Diata: totidem gradibus calida omnia.

Calida, Humida signa.

Calida, humida signa. Sensus hebetiores, ac motus temperatis tardiores, insomnia visis plena, ad iram proni, nec tamen feri. Pulsus molles, sanguine redundant, facile venerem ferunt, ætate ad eam maturi cito semen exceraunt, semen his multum, consilientia paulo humidius.

midius, spumofum, excrementa copiofa, & moderate cocta. Color eis fanguineus: Corpus mollius, & carnofius temperato. Capilli fufflaui, recti, plani, craffi, molles, caluefcetes tandem.

Calida, Humida Diata.

Calida humidaque pariter efto.

Exercitatio his conuenit modica, & fenfim adhibita, leuiter calefaciens, balnea calida, vnctiones, & ex oleo friftiones. Somnus temperatis prolixior. Stratum mollius, vmbra tepens, orium, mora in lecto plufcula. Venus temperato rarior.

Alimenta mollia & concoctu facilia.

Domeltica, nec crudiuora, nec voracia, herbiuora, non frugiuora, multibiba, tenella, minus exercitata, locis depreffis, nec editis procreata.

Pifces cartilaginofi, anferum carnes lacte nutritorum, anatis, & volucrum paluftrium, pifcium capita, ac ventres. Alimentum fape fumtum, ac multum fi vires ferant.

Oua affa, vel elixa, nec tamen dura.

Lac afininum, bubulum, caprinum cum melle.

Ex oleribus rapum. Ex fructibus ficus virides, botri vuarum, pyra matura, vinum rubellum, vel fuluum, paulo calidius, & meracius, temperato.

Si ætate increfcente flectat, eaque tenella fit, ita deinceps ad vigorem curanda: Infantia: autem fanæ indicium eft, fi mater toto geftationis tempore fana fuerit, & infans ipfemet ciulatum recens in lucem editus fatis validum ediderit.

Itaque quamprimum recens natus eft infans, vbi modice requieuerit, ab eius vëtre digitos quatuor, fcalpello, vel culto acutiffimo, præcidendus ei vmbilicus: eoq; præcifo, fanguis inibi reftans exficccandus: & lana torta vel licio, vmbilicus ligandus tribus digitis a ventre mefuratis: deinde duplicatus vmbilicus, & lana inuolutus leuiter in medio com-

Calida humida diata.

Flectens ætate increfcendo.

Infantis fanæ indicium.

Infans recens natus quomodo curandus.

ponatur, & supra vmbilicum, hapsus lana madefactus imponatur ad vmbilici figuram formatus, tum puellum muria pauci salis (oculis cautis) prolues, vel sale asperges, delicatioribus totum corpus succo pitifana vel foenigraci detergendum. Atque deinceps bis die, horarum aliquot interstitio post cibū, ablues, loco obscuro & temperate calido. Lauatrix autem manu dextra (leui brachio eius pectori adacto) infantemprehendat, & astate aqua tepida, hyeme calida generoso ve temeto, ouorum vitellis duobus adiectis, a colluue omni exquisite pelluat: atque (vnguibus præcis) sordes naribus, digitis exprimat, atque aures, & anum, minimo digito purget, anumq; disparet oris omnem saliuam (immissio digito) tollat, & leuiter gingiuas, & linguam confricet. Cumque corpus eius viderit aliquantulum calefactum, tum in tepidam eum deponat, ac madidum iam infantem molli linteolo desiccet: & membra singula, leuibus pressuris efformet: atque excultius effingat. Vesicam (vt lotii egressus facilliter fiat) deprimat, & mollibus linteis, ac pannis leuibus, brachiis ad costas porrectis obuoluatur demum, institisque (capitio capite operto) peruinciatur, & in ipsius nares oleum coniciatur: deinde (capite super latus eleuato) cunabulo suauiter semicirculari motu quasso, succentante quapiam, obdormiat: loco temperato, nec valde lucido, nec strato, aut capitis puluino valde molli.

Dum satis solida fuerint membra, fascinandus: tumque sensim fasciæ auferendæ. Postquam vmbilici pars ceciderit, (id quod fere vel quarto vel quinto die contingit) cochlearum testarum cinere inspergatur, aut tali suilli, &c. atque frustum plumbi, denarii magnitudine cauum vmbilici effingat.

Nutrix.

Puerum in vlnis gestet nutrix iam tres menses quatuorue natus: semper antequam lactet: nec vnquam

vnquam post, quo tempore, & vagire infans poterit. & sique dum parentis temperatura pristina naturæ restituatur, infantem alia atque mater lactet nutritrix, (ante diem quartum, matris vbera ne attingat) bis ter, vel sæpius die (primo excepto) quo die, octo, vel decem horas post omnem commotionem, summat modicum mellis decocti, atque despumati, quo nutritrix os eius illinat, & mulsam tepidam post instillet. Tum, die secundo, lac offeratur.

Nutritrix vero, talis eligatur: *Qualis nutritrix eligenda.* Ætate inter 25. & 35. vel saltem haud quadragenaria senior: quæ bis, aut ter pepererit. Coloris viuidi, fortis, ac robusti colli, pectorosa, musculosa, duræ ac multæ carnis, nec obæsa, nec gracilis, cuius mammæ solidæ, ac firmæ sint: media magnitudine modicamq; duritiem obtinētes & papillas magnitudine moderatas, nec cauer-nosas, quibus lac plurimum sit: odoratū, candidum, perdulce, æquabile, nec admodū crassum, nec tenue: quod pollicis vngui instillatum dum ad lucem consideratur, inflectendo vnguē, neque cito, neque tarde, defluit.

A partu esto 45. vel 60. soles, maremque pepererit, nec abortire assueuerit: porro sana esto, & moribus integris, coitu abstineat. & conceptum fugiat: quæ si conceperit, alia eligenda. Optimis alimentis vratur, ac satis se inuitet liberaliter.

Primis diebus quibus lactare incipit, simplicem cibum, ac leuem, accipiat: & potum dilutum bibat: postea, prout robustior puer euadit, cibos solidiores ne recuset: Omnia præterquam dulcia fugiat, saporibus insignia.

Antequam applicetur mamma, si mater ea sit, crassum ex vberibus emulgeat prius, & aqua calida moueat vbera.

Nutritrix inambulet primum, post mammam fricet, & modico post lauacrum tempore, infantis ori.

applicet: & prius singulis vicibus, mellis pauxillum ex paucō vino lingendum tribuat: item lactis aliquid emulgeat, & mamillæ pressione infantis succionem iuuet. Singulis lactationibus copiam parcam adhibeat: modo dextra, modo mamma sinistra.

Lactandi vero tempus opportunum, cum labia frequentius mouerit, eaq; aperuerit sapius.

*Defectus
lactis.*

Si lac nutrici defecerit, vberius alendum, & cibi succi melioris dandi: si penuria causa sit, sin alius minus soluta, & hæc sistenda. Exercenda partes supernæ, vbera fricanda, & spongiis ex aqua tepente fouenda, & oleo irino, vel simili vngenda.

*Lac au-
gentia.*

A proprietate lac augent lumbrici terræ quinq;, vel septem, triti cū palmulis passis ex zytho, vel cereuisia coctis poti, ieiune ad dies decē. Et feniculum aut anethum viride, cum ptisana coctum, & ad sorbendum datum, lactis prouentum faciet, sic perdicis oua sorptui data, & cancri cum lapatho, & apio in iure cocti, &c. Lac si nimis crassum fuerit, nutrici pituita vomitu eliciatur & laboribus cibum præcedentibus pluribus extenuetur, & cibi succi tenuioris vsurpentur: & condimentis vtatur acrimonia expertibus: atque in iusculis origanum, hyssopum, satureiam, thymum, &c. sumat.

Lac acre.

Sin vero lac acre fuerit, nutrix balneis dulcium aquarum temperatis & cibis euchymis, & temperamento moderatis, corrigenda. Et priusquā puer māmæ admoueat, omne lac vitiatum emulgeat. Tenuē vero si fuerit vtendū in cibis pultrib. ouis elixis, & coctis, alica, pane similagineo. pedib. atq; extremis ratib. porcinis, carnibus hœdinis, volucris tenerioribus, ac vino dulci. Exercendum & his est validius.

*Coagula-
tum.*

Si lac coagulatum fuerit, mentha contusa, vel pulgium cū farina seminū leni, vel scenigræci, paucō aceto admisto, mammis applicandum, vel succus apii, cum cicerū farina, & aceto mistus, & applicatus, lac coagulatum dissoluet. Post

Post annū & sex menses, est ablaſtandus: aut ſup-
 leto biennio: lacteq; ſolo eſt alendus, vel alimento
 rulento dū inferiores dentes ediderit. Dentire aut
 re incipiunt infantes 7. menſe, quibus tum multa
 ris ſaliua, & gingiuarū dolor, ac vēter ſolutus: quo
 tempore, a durorum maſticatione abſtineant, ma-
 illa lanis ſuccidis, oleo chamæmelino intinctis ſo-
 eantur: ac gingiua butyro, ac melle, pariter miſtis,
 uiter fricentur: & aqua calida foueantur.

*Infans
 quando
 ablaſtan-
 dus.*

Cum prædictos dentes ediderit: tum bene præ-
 ſanſum dato cibū, atq; cum ablaſtandus eſt, paucis
 nte diebus, conuenit offerre micas panis in mulſa,
 el in lacte ſaccharato infuſas, vel pulſes: tumq; raro
 didas applicare, & nouiſſime prorſus lac negare,
 e quæ amara ſunt mammis illinere, potum bibat
 um dilutū, & ex vaſæ papillæ formā imitante, ore
 o exſugat. Atq; prout ætate, ac robore creuerit: a-
 mentis vtatur ſenſim firmioribus, quā in ipſa pri-
 na infantia, omnibus tamen liquidis, & calidis.

Ne infantes in vehementes animi motus incidāt,
 nagnopere cauendum: & in primis ablato eo quod
 noleſtum habet (quod interdum ex diuturnæ qui-
 etis tædio oritur) vel papilla indita, vel vocis modu-
 atione, vel motu mediocri, idq; vel in cunis, vel in
 lnis, vel pendentibus lecticis, ſedulo placandi.

Per ſe moueri queunt, cum cœperint repere: ac
 um vehementes motus cauendi, nec ſibi motibus
 credendi.

Postquam lacte nutriri infantes deſierint, libera-
 iore eis modo, & ſuo ingenio, hilariter viuere per-
 mittendi exercitiis. Vtantur, & alimentis leuio-
 ribus, viſtu tamen vberriſimo & ſæpiuſculo dato.

Cum puer a ſomno expergiſcitur, balneo fouen-
 dus: deinde dimittendus ludere, hora poſt edere
 dandum aliquid: deinde ludat diutius, poſt, balneo
 fouendus: tumque iterum cibandus.

Tertium aut quartum annum agentes, nauigio aut vehiculo modice agitari sustinent.

Septennes, equitare queunt.

Ab anno sexto, vel septimo, tum pueri, tum puella, litteratoribus blandis, humanisque tradendi, atque tum nō erit necesse balneis assiduis vti, sed hora cibi instante, mediocriter exerceat, atque (per calores) a cibo, frigidam potare queunt.

Duodecimum egressi, ad Grammaticos, & Geometras mittendi, & corpora magis exercenda.

A decimo quarto ad vicesimum primum, Mathematicis disciplinis, & sapientiæ studio incumbant & pluribus exercitiis ad corporis robur credantur.

Ætate florentibus, labor, & exercitatio validior conuenit, item cibus plenior & valentior.

Haëtenus de flectente calida humida, sequitur calida sicca deflectens.

Calida sicca deflectentis signa.

*Calida
sicca de-
flectentis
signa.*

Motus perfectus: mobilitas in opinionibus, celeritas motus, somni leues, breuesque: insomnia (si qua) ignea, ingenii celeritas, audacia, temeritas, ad Venerem procliuiore prædictis, cito satiati, vox clara, aspera que, coëctio validior; Calidis humidis, excrementa pauca, semen paucum, densissimum, crassissimum, globosum, feruens, tarde excretum. Valde hirsuti corpore, capitis pili cito, & multum aucti nigri colore, caluescunt tandem facile, firmum, articulatum, musculatum, & pinguedinis exors totum corpus: cutis dura, ac nigella.

Dieta.

*Calida
sicca. dia-
ta.*

Matutinae deambulationes plures temperatis, & labores, balneum calidius, frictio ex oleo calefaciente. Sudores, deambulatio acuta ab exercitatione a cœna

cœna tarda in tepore. Sol, ignis, coitus frequentior
emperatis.

Somni longiores ieiuni, vigilia ieiuna, stratum
lurum, cœna contenti esse poterunt.

Nutrimendum validum, & multum si vires ferāt
etiam ex carnibus animalium robustorum, ac cete-
rorum vino conditorum, & sale, suis sylvestris caro,
cerui, leporis, omnia volucrum genera.

Exceptis palustribus, maxime his conueniunt pa-
umbes, columbæ, perdices, galli, turtures, seminale-
ges omnes.

Cicuriū animalium sylvestria, sylvestria omnia.
Cruidiura, sylvarum materie pasta, non voracia, fa-
niura, frugiuora, sanguinea, parcibiba, vigētia, ma-
cula, nigra, hirta, assa omnia. Ex locis siccis, & estuo-
is petita. Ex piscibus: draco, scorpius, callionymus,
cuculus glaucus, perca thryssa, conchilia omnia, pi-
cium partes supernæ, salsamenta marina, panis ex
tota farina clybano coctus, & subcinericeus. Maza
recens subacta, polentæ ac farinæ recentes, panes ca-
lidi, mel, sorbitiones nullæ potiones parca.

Olera acria: allium, cepe, porrum, raphanus, na-
sturtium, &c. vinum nigrum, lene, calefaciens, cere-
uisia valida, ac generosa.

Hæc de flectente calida, sequitur de flectenti frigida.

Flectentis frigida signa.

Pulsus temperatis minores, & respiratio huica-
nalogæ, timidi, ad actiones segnes, ad iram tardi, ve-
neris minus appetentes, nec sensibus admodum va-
lentes. Corpus tactu frigidius temperato perceptū,
refrigeratio prompta. Cutis rufa, atq; si multum ex-
cesserit liuida, glabra, capillus rufus, adeps per carnes
sparsus, capilli, multo post natalem orti, tenues, &
male nutriti, stabiles, canescentes tandem, nec o-
mnino caluescentes.

*Flectentis
frigida si-
gna.*

C

*Dieta.**Dieta.*

Eatenus refrigerantia omnia, quatenus sanitas deflectat.

Frigida deflectens duplex est.

Frigida humida, vel frigida sicca.

*Frig. humida deflectentis signa.**Frigida
humida
deflectentis
signa.*

Sensus obtusiores, motus item tardiores, somnolentia, ac somnus grauis, & profundus, pulsus molles, ac parui, iræ minime tenaces, penis tarda erectio, emissio seminis velox.

Excrementa multa, semen tenue, aquosum rarum, aquosum candicans, spumofum, frigidiusculum, femellarum prolificum.

Corpus molle, laxum, rarum, pili (si qui sint) per corpus albicantes, mollissimi, atque planissimi.

*Dieta.**Dieta.*

Vehementibus abstineant tam animi, quam corporis motibus, hilariter tamen degant, atq; vmbra- tilem vitam sectentur, & lentis motibus gaudeant, parce exerceant se, balneum aquæ tepentis ieiunum, & ante id, ambulatio matutina multa exercitationis loco esse poterunt, balneum tepentis aquæ secundum cibum, somnus secundum cibum, atq; is secundum prandium brevis sedendo, calceis exsulis fricentur interdum ex aqua, & oleo. A cœna surgant tantum. Somno indulgeant liberali, strato molliusculo: Venus his conuenit rara.

Alimenta mollia sint consistentia: facilia concocti, & ex his pisces. & ex piscium partibus capita, ac ventres. Ex carnibus: domestica, herbiuora, multibiba, tenella, ex sanguia, femella, castrata, alba, nuda, minus exercitata ex locis humidis, nec æstuosis, iuscula crebra, cibi pauci, & frequentes, succorum acidorum intinctus, pingui aliquo admisto.

Suum

Suum petunculi, articuli, rostra, alæ.

Panis hordeaceus, vel avenaceus, aut ex vetustis
arinis maza, oxygala, fructus cum aliis cibis.

Lactenue: olera insipida, acida.

Potio diluta, & satis larga.

Ædes, ad Aquilonem, & occidentem solem: lo-
co humili, atque depresso sitæ.

Deflectentis frigidi, siccis, signa.

Corpus dariuseulum, tenue, sensus in iuventute *Flectentis*
tantum vigentes, respiratio, & pulsus tardiores, ac *frigidi* *se-*
tiores: irasci coacti, difficile placantur: sanguis his *ei signa.*
parcus, & semen paucum.

Dieta.

Laboribus his incumbendum prædicta pluribus, *Dieta.*
motus veloces, somni ieiuni, & a matutinis deam-
bulationibus.

Calida balnea ieiuno plurima, cœna cõtenti sint,
vigiliæ, stratum durum.

Nutrimenta: carnes animalium robustorum ace-
to maceratorum, & conditorum, & eodem modo
condita: cicurium sylvestria, & agrestia omnia, cru-
diuora, sylvarum materie pasta, nec voracia, fœmi-
nora, frugiuora, sanguinea, parcibiba, vigentia, ma-
scula, nigra omnia. Intinctibus frigidis, siccis, vel
condimentis similibus, frigida, atque sicca, arte red-
dita. Ex locis inaquosis, & æstuosis petita: volucrum
genus: palumbis, columbæ, perdicis, galli, turturis,
volucres feminileges. Ex piscibus diaco scorpius,
callionymus, cuculus, glaucus, perca, thryssa, affa
omnia: conchiliorum omne genus. Salsamenta, ma-
xime marina: mox fluuiatilia: tum palustria, & c. ex
salsamentis percæ siccissimæ. Panis ex tota farina,
elibano coctus, & subcinericeus: hordei polentæ,
ac farinæ vetustæ: holera frigida, sicca, vel præ-

C. 2.

paratione talia: vinum austerum, tenue, & cereuisia similis. Hic ex senili ætate anomalia oritur: His nãq; aer calefiat, & humectetur: & balnea quotidiana sint aquarum dulcium calida: & exercitationes leues, parca, & quies multa senibus conueniunt: atq; somnus longior & frictiones ex oleo matutina, moderata: ac tum gestatio, vel deambulatio: vitam lætam transigant, & venerem fugiant.

Cibus modicus, humectans, & calefaciens, in tria tempora vel plura partitus: hora tertia panis purus, & bene fermentatus cum melle despumato: circa horam septimam, frictis, exercitatis, ac lotis, prandium, ac in prandio aluum subducentia, ex oleribus beta, & malua, tum pisces saxatiles, atque pelagiorum genus optimum, vt scorpius, cytharus, hepatus, umbra, lacera &c. primo post prandium, in lecto quiescant: Deinde moderato motu vtantur.

Ad vesperam cœnantes piscibus abstineant, sed carnes sumant ex simplici iure decoctas. quinetiam ante cibum iuuat ficos dulcissimos virides, & maturos esse, & hyeme caricas.

Senibus si quando aluus, astricta est sorbendum oleum dulce ante cibum, vel clyster tepens infundendus. Ex oleribus: borago, buglossa, &c. acriuscula conueniant. ex fructibus vix maturæ, passulæ, amygdala, nuclei pini, pistachia, potio: vinum calidioris naturæ, substantia tenuissimum, colore fuluo, vel pallido, vt Falernum, Surrentinum, Arusiũ, Lesbium, Mygium, & Tmolites, capite firmis, imbecillioribus: Adrianum, Sabinum, Albanum, Gabriannum, Triphylinum vetustum omne, vel cereuisia satis generosa & mediæ ætatis, quibus borago, buglossa, & citrigo salubriter miscantur.

Ædes ad meridiem, loco humili.

Vestimenta villosa, & calefacientia.

Hactenus Diaterica Eucrasia flectenti.

Deflectens

*Deflectens secundum conformationem fere raro, atq;
denso corpore continetur.*

*Deflectens
conforma-
tione.
Rari.*

Rari corpore maximam partem calidiores, humi-
ioresque existunt: & tactu molles & facile ac cito
exercitatione sudantes, atq; laboribus cito exsolu-
untur, externis facile offenduntur.

Dieta.

Exercitatio moderata, balneum temperatum, &
frictio ex oleo molliuscula, moderata hilaritas, ve-
tus.

*Dieta ra-
riorum.*

Nutrimendum coctum facile, ac lentoris expers. Ex
quadruped. animalium succorum lactentium, hœdi-
na, vitulina, agnina non lactens. &c. Ex volucribus,
gallinacei, capones, phasianorum, &c. Ex piscibus, sa-
taxiles, & omnes molli carne, atq; friabili præditi.

Panis autopyrus, bene subactus, fermentatus, &
sale conditus, ac furno satis coctus.

Oua tremula, caseus oxygalactinus, & recens.

Ædes ad meridiem sitæ.

Vestimenta satis crassa, & ex panno densæ textu-
ra, vel pellibus confecta.

Densi corpore.

Densi.

Horum signa sunt raris contraria.

Dieta.

Exercitatio corpore raro minor, ac parcior, frictio
item parcior, & duriuscula. Cubile durum.

*Dieta
densiorum.*

Nutrimenta substantiæ tenuioris quam corpore
raro, panis hordeaceus, & clybanitis ex tritico, pisces
saxatiles, & ex cartilagineis, torpedo, & turtur, & a-
nchusa montosa, & turricola, ac vineas colentes: tur-
tures, ac perdices die vno mortuæ antequam edan-
tur: fructus, mora, cerasus, ficus, pruna, carica, nuces
pistachia, amygdala amaræ, pisces aceto & muria
conditi nec non carnes suilla salsa, & ex succa, po-

tus: vinum flauum, dulce, & splendidum, Aruifinum, Lesbium, Falernum, & Tmolites, vel cereuifia diluta, vel mulla tenuis.

Ædes ad Orientem.

*Hactenus de Hygieinæ parte diaterica, fequitur
Trophylactica.*

HYGIEINÆ PARS PROPHYLACTICA.

*Trophy-
lactica.*

Prophylactica eft pars Hygieinæ, qua fanitas in morbos prona erigitur.

Prophylactica partes duæ funt.

Sanitatis nimium flectentis emendatrix.

Et errorum Diætæ correctrix.

Nimium flectentis fanitatis figna funt opera nimium flectentia.

Diætæ: Sanitas deflectens nimis, tot gradibus contrariis vel etiam pluribus, fenfim per otium retro agenda.

*Emenda-
trix.*

Sanitatis nimium flectentis emendatrix eft, vel crasis, vel conformationis.

Crafs figna nimium flectentis funt huius opera flectentia. Diætæ huius, efto crafi tot gradibus contraria.

*Crafs
quando ni-
mum fle-
ctat.*

Crafs nimium flectit, vel cum aliqua tantum membra crafi flectant, vel cum pariter omnia.

Alicuius tantum membri, vel aliquorum flectentium figna funt, eis ipsis opera propria flectentia nimium. Suntque fere partes publicæ, ac principes, vt Caput, ventriculus, cor, pulmo, iecur, lien, testes, vterus.

*Capitis calidi figna funt toti flectenti communia fecundum
capitis actiones & opera. Tantum nimium fle-
tere, huic proprium correctio.*

Lotio-

Lotiones refrigerantes, ieiunæ, corpore prius quo- *Correctio*
 dianis excrementis vacuato, atque exercitato, ac *capitis co-*
 lum lotiones: ac post eas, vnctiones refrigerantes: *lidi.*
 Odoramenta frigida, & inodora, naribus sæpius ad-
 nota ex frigidis. A cibo, fructus frigidi, & austeri.
 itent soles, maxime a cibo, & a vini vel cereuisiæ
 ortis potu. Potio esto diluta Cogitatio post cenam
 mixta, a qua ambulatio sub testro sit. His oculi ma-
 ne, vel die, sæpius frigida multa fouendi.

Cerebrum calidum humidum.

Frictiones capitis ieiunæ multæ, lotio tepens, ex *Cerebrum*
 frigidorum, siccorumq; decocto: vt rosæ, violarum *calidum*
 foliis, foliis salicis, vitis capreolis, ac foliis cynosbati, *humidum.*
 mentinodii, aranciorum, limonum, &c. pauco aceto
 decoctis infuso.

Vnctiones fiant ex rosaceo, myrtino, melino, &c.

Odoramenta frigida sicca: Ex santalis, rosæ, ligno
 Rhodino, camphora, &c. ex quibus atque similibus
 pomum odoratum confari poterit, frequenter o-
 dorandum.

A cibo malum Cydonium, vel pyrum furno co-
 ctum, & induratum, atq; fructus astringentes. Ca-
 ueant austros, nec vnquã post cibum progrediantur.

Calidum siccum.

Calidis & siccis cerebro, conueniunt irrigationes *Calidum*
 ex aqua frigida, vel frigidorum decoctis, vt lactucæ, *siccum.*
 solani portulacæ, lentis palustris, papaueris, hordei,
 &c. Ex oleis, violaceo, nenupharino, &c. Nunquam,
 vel raro caput veste velent, &c. per æstatem, (corpo-
 re alias robusto) bene largo canali quotidie aliquan-
 diu aquæ frigidæ effluenti caput subiciant.

Hi vigiliis fatigantur, & præpropere calui fiunt.

Ad vigilias lactuca edēda, & papaueris viridia fo-
 lia obsoniis miscenda, & dormituris caput oleo vio-

laceo, vel rosaceo, refrigerante aliquo succo admisto, vngendū, vel oleo cui capita papaueris incoxerint, & vna pedes decocto refrigerantium fouendi.

Ad caluiciem, vngentum ex ladano, oleo myrtino, vinoque astringente confectum, vel ex ladano, & oleo lentiscino.

Item polytrici herba pars vna, ladani partes duæ, vino astringente, oleoque myrteo excepta inungantur, & effricentur.

Cerebrum ad frigidum flectens.

Ad frigidum flectens.

Irrigationes, vnctiones, ex calidis, & suffitus aromatici. Caput bene tegatur, luna vitetur, maxime ante ipsum lunæ solisque cōgressum. Multum ambulent mane, horum oculi interdum stillatitia fœniculi fouendi, & ex melle ac tenui liquidoq; fœniculi succo ad oculorum claritatem, illinendi: vel etiam melle, ac butyro salis experte vngendi, &c. His aduersus surditatem vrile erit, (maxime hyeme & diebus aquilonaribus,) aliquid olei amygdalarum dulcium auribus instillare, & lana nigra oleo imbuta leniter obturatas tenere.

Frigidum humidum.

Frigidum humidum.

Fricationes multæ, pannis asperis, & thuris, styracis, vel electri, atq; similium fumo suffitis. Lotiones ex herbis calidis siccis: vt, lauro, sampsuocho, saluia, batonica, chamæmelo, ruta, &c. sale vel alumine vel vtroque adiecto.

Meatus omnes in cerebrum ferentes, purgatissimi reddantur per nares, errhinis vt betæ succo, belididis, anagallidis vtriusque.

Odoramenta sint ex aromaticis, styrace, musco, ladano, caryophyllis, nuce moscata, ciueta.

Sternutatoria ex betonica, attrita, & naribus inserta, vel festuca indita, omnia ieiuna.

Per

Per palatum mastichatoriis, ex mastiche, herba
ediculari, pyrethro, &c.

Gargarismatis, ex sapa, & oxymelite, cum sinapi,
c.

Diachristo, ex sapa cum betæ succo, palati, & co-
mellæ regionibus illita.

His vtilia sunt tragemata cal. sicca, saccharata post
bum, vt anisi, cinamomi anthos, &c.

Vitent pernoctationes sub dio, & aquarum au-
s caueant, matutinum ac vespertinum frigus fu-
ant.

Coelo nubilo, soli aperiendi se minime commit-
nt. Aurium sordes his diligenter linteo dropace
ncto immisso, & vbi apprimitur extracto tergēda,
guttula vna olei laurini auris meatus illinendus,
el exiguu fells bubuli cum pingui anserino.

Hic cito senescunt, & somno nimis grauantur. Er-
o ad caniciem, Capperis cortex aqua, vel lacte asi-
ino, vel bubulo coquēdus, dum tabuerit: atq; tum
capiti raso) illinendus similiter & cortex radicis ili-
is coquitur, & vsurpatur.

Item pix liquida oleo mista vtiliter illini poterit
didem.

In nimiam in somnum procliuatatem, iuuerit pu-
gium, vel nepetam, vel hyssopum intritum aceto
cerrimo, vel aqua vitæ intritum odorati, &c.

Cerebrum frig siccum.

Irrigationes ex calidis, humidis, etiam post pran- *Frigidum*
ium: vnctiones ex oleis: liliaceo, chamæmelino, & *siccum.*
erbis cephalicis cal. incoctis & oleis mistis. Odora-
menta calida, ex liquorum conuenientium vaporibus
elatis: quibus & aurium meatus, aduersus gra-
uem auditum irroratur salubriter: & post oleo
dulci ac mentulo, illinuntur.

Hi si vigiliis premantur a sumtis iurulentis som-

num tentare debent, & a cibo humefcente: atque anethinum oleum, non vetus, fronti, temporibus atque capiti toti illinere.

Hac de cerebro flectente.

Ventriculus flectens ad calidum.

Ventriculus flectens ad calidum.

Cibus validus, & satis copiosus, actu frigidus fructus ante cibum potus dilutior.

Cal. humidus.

Calidus humidus.

Cibi astringentibus succis macerati, & intinctibus aceti aranciorum, limonum, &c. preparati.

Potio parcior, & refrigerantior: ventriculus oleo rosaceo, vel myrtino vngendus.

Cal. siccus.

Cal siccus

Potio liberalior: aquæ potio, corpore satis robusto nec obstructionibus obnoxio & fructus lubrici: ut mora, pruna, persica, cerasa, ante cibum, & olera frig. humida. Cucurbita, cucumis, & reliqua cocta. Edulia præcedenti duriora viribus ferentibus conveniunt, & materiæ valentioris.

Hi ubi crudum sine præcordiorum dolore ructet, ex intervallo aquam frigidam bibant, & se contineant. Si propter ardorem aliquem noctu sitiant, antequam quiescant, duos, tresve cyathos, per tenuem fistulam frigida bibant: vel portionis dilutæ, atque bene frigida. Hos item iuvat ventriculum oleo myrtino inungere.

Ventriculus frigidus.

Frigidus.

Omnia calefacientia, & calidorum inunctiones: ut costini mastichini, &c. Nunquam surgant, nisi bene coxerint: & si surrexerint, iterum dormiant. Per hyemem, totis noctibus quiescant, etiam primo somno, ventri incumbentes. Et palmulæ, amygdalæ, pistachia, &c. sumenda ante alios cibos.

Frigidus

Frigidus humidus.

Aëria omnia, & sine frigiditate astringentia: po- *Frig. hu-*
 exigua, eaque vini meraci, ac generosi: vel cere- *midus.*
 ia Martia, vel mullæ generosa.

Habitatio sit ædificio lucido: æstium flatum ha-
 nte, & hybernum solem.

Legant clare, post ambulent, tum pila, vel armis,
 alio genere superiores partes mouente, se exer-
 ant: & ieiuni vinum bibant calidum, vinum illud
 to austeriusculum, & cum cibis tale: qui cibi ma-
 mam partem sunt omnes assi, aromaticis pulue-
 ribus aspersi, cū quibus & certa piperis grana crassi-
 cule confecta edant.

Longis diebus his meridiandum ante prandium,
 n minus postea, & omnes potiones aqua frigida
 bibita includendæ.

Frigidus siccus.

Laccum melle, vinum meracius, cibi, ac nutri- *Frig. sic-*
 menta calida, tam actu quam potentia. *cus.*

Nardino, vel mastichino, venter vngendus assi-
 due: & bene carnosus puer dormienti assidue accu-
 bet, vt semper abdomen contingat: vel catellus e
 regione ventriculi assidue gestetur: iuscula fiant
 thymo, rosmarino, mentha, &c. incoctis, & piperis
 quod satis est asperso.

*Hæc de ventriculo flectente.**Cor flectens ad calidum.*

Aer inspiratus frigidus, eatenus, dum temperetur *Cor flectes*
 cor, ore potius quam naribus exceptus, frigidorum *ad calidum.*
 cardiacorum vsus creber, epithemata frigida car-
 diaca.

Cal. siccum.

Aura aduersa, & cardiaca frigida, humida: vt vio-

Cal. siccu. la, nymphææ flores, etiam temperatæ: vt buglossa, borago, & cardiaca epithemata frigida humida.

Calidum humidum.

Cal. humidum. Aer frigidus & siccus, ote potius quam naribus inspiratus. Cardiaca frigida, sicca, tam sumta quam foris applicata.

Cor frigidum flectens.

Flectens ad frigidum. Aer calidus, cardiaca calida, & epithemata ex iisdem cordis regioni applicata.

Frigidum humidum.

Frig. humidum. Aer calidus, siccus, cardiaca calida, sicca: anthos, sampsuchus, puluis ochymi.

Frigidum siccum.

Frig. siccum. Cardiaca sumta, & applicata, calida humida: borago, buglossa, etiam calida iusculis incocta, vt sampsuchus, citrargo. &c.

Hæc de corde flectente.

Pulmo flectens.

Pulmo flectens.

Conuenit cum corde.

Flectente aeris qualitatibus.

Pulmo si frigidus sit, vox exercenda, & multum vociferandum, maxime, si humidus item sit, & pectus totum, oleo vel vngvine calefaciente fricandum: vt costino, amygdalino amaro, vel dulci, croco, admisto, &c. si calidus sit, resistendum vnguentis refrigerantibus, & oleis: vt rosaceo, violaceo, nenupharino, &c.

Iecur flectens ad calidum.

Iecur deflectens ad calidum.

Refrigerantia liquida, & epithemata maxime ex hepaticis e regione admota.

Calidum humidum.

Cal. humidum. Epithemata ex rosis, carnalis, plantagine, violis, rosarum stillatitia, &c. Vfus creber cichorei, endi-

uiz

cremoris hordei, oxalidis, feri lactis. Vere, san-
is ex vena hepatica vacuetur pro usu ac viribus
ligentis. His alæ graues odore esse solent Quod si
plestum sit, radicem scolymi bibant, in vino co-
am, & aluminis liquidi partibus duabus & myrrhe
rte vna dissolutis alæ vngendæ: vel aluminis li-
idi drach. 8. amomi, myrrhæ, spicæ nardi, cum dr.
vino tritis.

Calidum siccum.

Decocta plantaginis, portulacæ, atriplicis, liche- *Cal. siccæ.*
a: & hæc ipsa iusculis incocta: iuscula crebra, ex a-
malium partibus nervosis, & membraneis con-
cta, fomenta, & vnctiones frigida humidæ. Incu-
tio in latus sinistrum, dum dormiunt.

Frigidum humidum.

Agrimonia, steches, herbæ capillares, scabiosa ci- *Frigidum*
s incocta, & inde iuscula: piper in tenuem pulue- *humidū.*
m quassatum cum opsonis, malsa salis meraca:
unctiones, & epithemata ex calidis & siccis, sym-
atheticis plurimis.

Frigidum siccum.

Vinum satis generosum: iuscula crebra: & his in- *Frigidum*
octa thymus, mentha, rosmarinus, sampsuchus, &c. *siccum.*
inzibere item paucò asperso, si opus est.

Lactis recentis potus, per se & longe ab aliis cibis:
unctiones, epithemata calida humida ex sympathet-
icis maxime, incubatio in latus dextrum.

Hæc de iecore flectente.

Lieni eadem conueniunt quæ iecori, cui propria *Lien.*
tamen sympathetica sunt plurimum applicanda, su-
mendaq; vt cal. lupulus, scolopendrium, cortex ta-
marisci, cappares, &c. Frigid. viola, buglossa, borago,
succus malorū fragrantium, &c. eaq; frigida & sicca.

Renes calidi.

E regione renum, vestimenta minus densa sint decubitus supinus vitetur, & stratum molle: dorso rosæ recentes, vel vetustæ aceto rosaceo macerati dormituris substernantur, vel violæ, salicis folia, vitis frondes & capreoli.

Calid. humid.

Calid. humid.

Frige facientia sicca eligantur, & applicentur.

Calid. sicc.

Cal. sicci.

Frigida, humida, his applicanda: & substernenda & plumbi lamellas tenues, & perforatas, hydrargyri quoque oblitæ gestare his vtile.

Frigidi Renes.

Frigidi.

Hi calefaciendi vnguentis & fomentis calidis, humidis item, si sicci: sin ad humidum flectant, sicci

Testes flectentes.

Testes flectentes.

Eadem applicanda quæ rebus flectentibus: qui ad frigidum flectant, redduntur ad coitum impotentes: propterea pingui vngendi frequenter: cupyethri, aut herbe pediculariæ aliquid adiectum sin aut seminis vrticæ, & ante venerem, his præbendum aut satyrion, aut erucam, aut piper, aut medicamentum diasatyrion dictum: infernas corporis partes exerceant: & oleum euphorbiæ affricent inguini, & naturalibus: & in cibis sumant cicer, fabas bulbos, pastinacam, horminum, conchilia omnia squillas, polypodes, ostrea cum pipere, passeris, perdicis, coturnices, porphyrones.

Vterus flectens ad cal.

Vterus flectens ad calid.

Inseffus, fomenta, & vntiones frige facientes: etiam humiditate & siccitate pugnantes si opus est.

Ad frigidum.

Ad frigidum.

Inseffus, vntiones, epithemata: etiam in nuptis pessus omnia calefacientia, maxime ex proprietate substantiæ hysterici.

Ad

Ad Frigidum humidum.

Artemisia, matricaria, laurus, sampsuchus, nepeta, pulgium, &c. *Ad frig. humidum.*

Ad Frigidum siccum.

Eadem simplicia incocta, atque oleo, & mucilagine lini, seminis fanigræci, &c. & pinguibus adhibitis. *Ad frig. siccum.*

Ad articulos imbecilles & arthritidi obnoxios.

Vita sobria esto, & abstemia: inprimis Venus fufcenda. Quidam toto anno a vino, potuque genero, ac venere abstinentes, totius vitæ securitatem sifecerunt. *Articuli imbecilles & arthritici.*

Equitare podagræ opportunis alienum: & si scies sint, crura motibus exercere, quin potius his excendæ partes superiores.

Conuenit ex interuallo, vomitus, atque alui subductio, & nisi quid impediât, phlebotomia per initia & veris initio: horum aliqua, vel omnia, nisi vi admodum sobria sit.

Vomendum autem ex vario cibi genere, copioso, pingui, acri, dulci, ex vetustis falfamentis, oleribus, fructibus: raphano, cepa, allio, porro, eruca, quæ omnia assiuscule mansa deglutienda, & vinum dulce subbibendum satis copiose: & mora trium horarum interposita, aqua tepida cum melle satis largiter potus, digito, vel penna gutturi inserta, & prius oleo iri-
o vncta vomere conandum: atque toties vomendum, ex aqua tepida, dum ea sola exierit.

A vomitu, os vino vetere abluendum, & dentes soluendi: & per loca aprica ambulandum: deinde quiescendum. Noctu vero panem cum vino oligo-
oro vel potione diluta cœnatus, somnus captan-
s. Postridie, sobrie comedendum, atque nimium
gidis abstinendum.

Si ob arthritici naturam, vomitus haud cœueniat,

menſibus ſingulis, vel maiore interuallo ex pilul
hermodactyleis purgandum.

Articuli frequenter fricentur ex oleis astringen
tibus, & quibus galla immatura, nuces cupreſſi, c
pula glandium, verbaſci flores, enula campana
chamaepytis, incoxerint: adieſto ſale, & alumine:
pellis canina, aut vulpina ex eiſdem, arte coriar
præparata, & bene macerata, geſtetur.

Iſchiæ ſi metus ſit clyſtere acri alius irritanda
interuallo, & aſſiduum ſedile fugiendum.

*Haſtenus de Prophylactica ubi pars aliqua ſeſtat, ſe-
quitur ubi totum corpus ſeſtat.*

*Correctio
corporis
ad cal. hu
mid. ſe-
ſentis.*

Totius corporis ad calidum humidum ſeſtenu
correctio.

Laboribus his incumbendum, ac ſtudiis: mot
veloces, ſudores: ſomni ieiuni, & a matutinis d
ambulationibus.

Calida balnea, ieiunia plurima: coena conten
eſſe poterunt: vigilia, ſtratum durum, venus mult

Nutrimētum: carnes aſſæ, & piſces ſale, aceto,
muria conditi: carnes animalium robuſtorum. Su
ſylueſtris, bonis, leporis, cuniculi vetuſti, cicurium
ſylueſtria, agreſtia omnia. crudiuora, ſyluarum m
terie paſta, nec voracia, fœniuora, frugiuora, ſa
guinea parcibiba, vigentia, maſcula, nigra: ex loc
ſiccis, inaquoſis, aſtuoſis, petita, volucrum genu
palumbis, columbæ, perdicis, galli, turtures, vol
cres ſeminileges. Ex piſcibus, draco, ſcorpious, calli
nymus, cuculus, glaucus, perca, thryſſa, cōchilioru
omne genus, ſaſſamenta, maxime marina, mox ſi
uiatilia, tum paluſtria ex ſaſſamentis, perca ſiccis
mæ. Panis ex tota farina, clybano coctus, & ſubcin
riceus, hordei polenta: ac farina vetuſta, holera
ceto cocta.

Potio, vinum auſterum, nigrum, vel cereuiſia
eſcens.

Ad

Ædes ad septentrionem, loco edito.

Vestis renues, & rara.

Hos iuuat sub veris finem, sanguinem deplere:
 to redundantia modo, ac viribus indigentis.

Cal. siccum.

Vehementibus abstineant tam animi, quam cor- *Ad cal.*
 oris motibus, hilariter degant, umbratilem vitam *siccum.*
 estentur, & lentis motibus gaudeant: exerceant se
 arce, pane prius sumto, eoq. in corpus ante exerci-
 tionem initam digesto. Si vehementer calidi &
 cci sint, exercitatione abstinendum, & ambulatio
 natutina multa, & balneum tepētis aquæ ieiunum
 xercitationis loco esse poterunt:

Si valde sicci sunt, etiam secundum cibum balneū
 gredi iusabit, item secundum cibum somnus & à
 randio breuem somnum captare conuenit: & fri-
 ari interdum ex aqua, & oleo his vrile: à cœna sur-
 ant tantum: somno indulgeāt liberali, strato mol-
 usculo. Venus rara.

Alimenta sint consistentia molli, interdum astu-
 rigida: & ex his pisces & piscium capita ac ventres,
 x carnibus: domestica, herbiuora, multibiba, tenel-
 i, ex sanguia, femella, castrata, alba, nuda, minus ex-
 rcitata, ex locis humidis, nec æstuosis petita. Iuscu-
 crebra, cibi pauci & frequentes. Suum petunculi,
 rriculi, rostra, alæ, & partes omnes extrema. Sug-
 orum acidorum intinctus.

Panis hordeaceus, vel auenaceus, aut ex vetustis
 irinis, maza oxygala, fructus cum aliis cibis.

Lac tenuissimum, olera insipida, acida.

Potus dilutus, & satis largus, etiam frigida pota-
 io interdum.

Ædes ad aquilonem & occidentem: loco humili,
 & depresso etiam fluuiis vicino.

His conuenit purgatio, maxime æstatis initio, ex
 holagogis, & æstate media vomitum irritare: radi-

D.

cum raphani succo & poto drach. 3. ex oxymelite: vel
seminum drach. 3. ex hordei decocto: si ad vomē-
dum sit aptus, id est, nec collo lōgo sit, nec angusto,
nec scapulis alatum instar exstantibus, nec thorace
angusto: tū namq. purgare foret tutius per sedem.

Deflectens ad frigidum humidum.

*Ad frigi-
dum hu-
midum.*

Matutinz deambulationes multæ, ac labores
multi.

Balneum calidius, frictio ex oleo chamæmelino,
anethino, &c. Sudores: somnus à matutina deambu-
latione, cœna cōtenti sint tantum, & à cœna deambu-
lacio, sitientes dormiant, deambulatio acuta, ab
exercitatione à cœna tarda, in tempore, nocturna iti-
nera. Purum se frigori exhibeat frigidus, humidus,
præterquam à cibis & exercitationibus Sol, ignis,
coitus, somni longi, ieiunii: item, vigilie ieiunæ: &
stratum durum horum corpora emendant.

Nutritum calidum, carnes succi boni, etiam
vino conditæ & sale, suis sylvestris caro, omne volu-
crum genus ex locis æstuosis & ædus: palumbis, co-
lumbæ, perdicis, galli, turturis, semineleges omnes,
sylvestria omnia, parcibiba, exercitata, vigentia, pi-
sces sicci, draco, scorpius, callionymus, perca &c. Fri-
xa, tosta, assa potius quam elixa, & pipere, vel caryo-
phyllis & vino aspersa, piscium partes supernæ, &
caudæ proximæ. Conchilia omnia; salsamenta, panis
purus, & bene fermentatus, & sale conditus: Sorbi-
tiones nullæ, & si quæ sint, incoquantur thymus, ros-
marinus, salvia, &c. Portiones parvæ, & meratæ: vina
generosa, & verusta.

Olera actia: allium, cepa, porrum, &c.

Ædes ad Orientem.

Vestres vulpinis pellibus suffarctæ.

Hi purgandi phlegmagogo, autumno, aut veris
initio, vel vomitu si ad vomitum apti sint, & humor
pituitosus eo obrepserit: vomitus, ex raphano, vel
iuglandis

iuglandis iulis citetur etiam bis mēse, per hyemem totam, duobus diebus continuis.

Deflectens ad frigidum siccum.

Exercitatio modica, labores sensim adhibiti, le- *Ad frigi-*
niter calefacientes: citra sudorem balnea calida. & à *dum sic-*
cibo vnctiones & frictiones ex oleo, visceribus vita- *cum.*
tis. Somnus prolixus, strato molli, item à cibo: um-
bra tepens, otium, mora in lecto multa, venus nul-
la, vita læta, & hilaris.

Alimēta mollia, coctu facilia, domestica, nec cru-
diuora, nec voracia, herbiuora, haud frugiuora, mul-
tibibā, tenella, minime exercitata: ex locis depressis:
piscēs cartilaginosi vino, & aromate cōditi: anserum
carnes, anatis, & palustrium reliquorum: prius pul-
ticula ex lacte aliquandiu nutritorum. Piscium ca-
pita ac ventres, & ex his mollissimi carne, & saxati-
les. Nutrimentum omne actu calidum, sapius sum-
tum, iuscula crebra: lac asininum & caprinum, cum
melle. Ex oleribus, rapum; ex fructibus, ficus viri-
des, botri vuarum, passulæ, pira matura, vinum satis
generosum, ætatis mediæ, tennæ & diureticum.

Ædes ad Austrum.

Vestimenta satis densa, & corpori proxima, per
frigora, oleo calefaciente delibuta.

Sub autumnum, hi ex melanagogo purgādi sunt;
leniter, & ex interuallo.

*Hactenus de Trophylactica flectentis secundum crasim;
sequitur secundum conformationem.*

Estq. ad nimis raros corpore, vel densos: reliquus *Conforma-*
conformationis flexus, quoad fieri queat, iam re- *tione fle-*
cens nato puero ab obstetrice, ac deinceps à nutrice *ctens.*
dirigendus.

Rari corpore.

Rari corpore, vestibus se bene muniant, ex densa *Rari cor-*
textura, vel pellibus, nec nisi vncti in frigus prode- *pore.*
ant: hos iuuat balneū bene calidū, & cubile durum,

& frictio dura, manu oleo myrtino, vel rosaceo dilibuta.

Rari corpore cum fere graciles esse solent, si impediatur (hos namque tabes, deiectiones, destillationes, item viscerum, atq. laterum dolores fatigare solent) conandum ut impleantur vino crasso, ac dulcibus cibis crassi succi pro natura ac robore corporis. Exercitatio esto brevis, nec celer, & frictio mediocris ad carinum tumorem, nec ultra. His etiam commodum erit pice diebus tribus, quatuorve, interpositis oblini. Porro gracili ante balneum, ieiuno, corpus infricandum leuiter linteis, donec rubescat: deinde manu, frictione dura, non tamen multa.

Balneum sit aquarum dulcium, in quibus nec sudent, nec diutius immorentur, & à tepida exeuntes, in frigidam ingrediamur.

Corpore densi.

Densi corpore.

His conuenit balneum temperatum, ex herbis aperientibus, & mollientibus conflatum: chamamello, nepeta, malua, pulegio, &c.

Exercitatio satis valida, & ex oleo anethino vel calefaciente, & attenuante alio; inunctio & frictio molliuscula.

Densi corpore obesi esse solent, & obstructionibus opportuni.

Obesi.

Obesi plerunque acutis morbis capiuntur: & difficultate spirandi strangulantur: subitoq; sæpe moriuntur.

Densi, victu attenuante ad mediocritatem perducendi: pane furfuraceo, sale multo, cum cibis, capparibus frequentibus, & vini albi ac tenuis, vel cereuisiæ similis portione. Ex cibis, conueniunt pisces saxatiles, ac alii molli carne, friabili, ac alba præditi. Ex auibus, auicula montanæ, passerres, turdi, merula, perdices, auicula turricola, & in vineis degentes, columbi agrestes, & ex eodē genere agrestia omnia, potius.

potius quam domestica. Panis hordeaceus. Ex oleribus, acris: ut eruca, nasturtium, &c.

Cibus non statim à balneo his dandus, sed prius somnus indicendus: & ab exercitatione ac labore, somnus ieiunus, & balneis iniciantur sal, alumen, sulphur, &c. & frictionibus ieiunis his studendum, siccis linteis, crassioribus, atq; duris, frictione item dura ac multa ex oleo digerente manibus vinctis, anethino, chamamelino, costino, & sale ac nitro corpus frequenter fricetur. Cibi minus sumantur quam pro exercitiorum ratione. Insolatus his confert, & semel in die (id est) prandio, cibum sumere: & interdum piper bibant ieiunus cum decocto radicum ac seminum apii, feniculi, anisi, &c.

Cum obstructionū metus sit, utantur salsamentis, & oxymelitis potione: & si à iecore metus sit, agrimonia, asparagus, plantago, capillares, usurpentur: radices feniculi & apii, &c. Si lien: cappares, cortices radicum capparum, cortices tamarissi, & ipsa tamarissi coma, & cetera iecori sympathetica.

Si pulmo, innula, passula, carica, ficus, pulmonaria, angelica, &c. huic sympathetica, usurpanda:

Si renes, radices apii, feniculi, petroselini, asparagi, eryngii rusci, & cetera renes deobstruentia omnia. vino albo macerata, vel leuiter incocta.

Haftenus de prophylactica sanitatis nimis stentis; sequitur quae diata erroribus debetur: estq; secundum diata partes, vel gestorum, vel fomētorum. Atq; ex gestis, primum erroribus quae circa motus sui ipsius tantum gratia suscipiuntur: deinceps de ceteris.

Ad aluum adstrictam.

Aluus si adstricta est, sollicitanda arte: videlicet terebinthina oliuæ magnitudine deglutita cum saccharo: ceterum adstrictam iuuabūt oua sorbilia, cochlearum ius cū beta, ac malua, serum lactis, cū sale,

*Aluus
adstricta.*

aut melle, ad tres heminas: item herba mercurialis decoctum iuuabit, & glande interdum naturam irritare, ex melle & sale tosto, vel ex ficu cum nitro.

Pueris & infantulis: betæ vel malæ, vel mercurialis cauliculus satis erit, hæc nisi profint, clystere tentandum (non tamen continue ne natura spontaneæ excretionis obliuiscatur) ex decocto caricarum, betæ, malæ, quantitas ad corporis magnitudinem comparata, cum melle, ac oleo: vel oleum per se ad heminæ dimidium iniiciendum, omnia tepida.

Ad aluum fluentem.

*Aluus
fluens.*

Aluus si nimium fluxerit, ut molesta sit, & imbecillius inde corpus euadat, sistenda. Lacte bubulo, recenti, ad tertias cocto ac sumto: vel lacte candentibus chalybis laminis iniectis cocto, vel eodem è maris littore calculis candentibus extinctis: aut quarta aquæ parte ad lac iniecta, atque ita lacte ipso ad dimidium cocto.

Item sacculus salis tosti ad ventrem applicatus, & ad dorsum hordei tosti aluo profluenti proderunt. Hæc si parum successerint, infusus fiant ex herbis adstringentibus, vel alia adstringente materia: polygonato, galla, quercus foliis, bistortæ radicibus, alumine, &c.

Fercula ex oriza, sorba, mespilla, mala cydonia ante alios cibos sumta, vel puluis baccarum oxyacanthæ cibus aspersis, &c.

Vrina nisi fluxerit satis, smyrnii, apii, foeniculi, rufci radicibus decoctis, & horum iusculo sumto, hau-
stu satis largo, ieiuno, proficienda.

*Defati-
gatio.*

Exercitationem, vel laborem, si defatigatio consequatur: refouendum corpus, ac recreandum: atque ubi quis insuetus laborauerit, aut multo plus quam solet etiam assuetus, huic ieiuno dormiendum est: multo magis si os amarum, & caligent oculi, & perturbatur, venter, tum non tantum dormiendum
ieiuno.

uno, sed in posterum diem permanendum, nisi
id quies sustulerit, quod si factum sit, surgere o-
rret & leuiter ambulare.

Leuat item lassitudinem, interdum laboris mu- *Leuantia*
tio: insueti, consueto: & cū hesternis pares hodie *lassitudi-*
l paulo minores exercitationes adhibere cōuenit *nem am-*
Qui ambulando defatigatur, hunc reficit in ipso *bulan-*
nere frequens frictio; atq. post iter, primum sedi- *tium.*
deinde vnctio: tum aqua calida in balneo, magis
periores partes quam inferiores fouēdo: atq. quo
proficiscens minus lēdatur: profectio ipsa ita suscipi-
nda: inunctus proficiscens nec fortiter incedat, &
er astatem fascia mollis, digitos sex, aut septem la-
i, quinq; autem cubitos nec minus longa, lumbos
dilia vsq. complexa, obuinciatur: & baculo innita-
ar. Cumq. ab itinere cessatio sit; post vnctionē, pau-
alum cibi astitui, potioq. modica satis erunt: atq; a
randio, antequam iter arripiatur conquiescēdum.
st: si vero abeundi necessitas fuerit, & sitis urgeat,
enuis polenta ex aqua cum salis momento bibatur,
& corpus à sole bene regatur.

Hyeme si profectio suscipitur, vnctione prius ad-
hibita ex oleo calefaciēte, hyemales cibi, copiose su-
nendi, & potio modica: ceterū fascia longior esto,
quam astate, nō solum lumbos, sed & spinam & ge-
tus etiam complexa. requiescenti autem, (si vehe-
mens interea frigus vrat) neq. vngi, neq. cibum po-
rumve assumere præstat, neq. alio quodam modo
refici, si mansurus ibi sis: & ad hospitium veniens,
cauendus ad ignem subitus accessus, sed primum
deambulet in loco egelido, & manus fricet, vt sen-
sim corpus calefiat.

Equitantes præter prædictas partes, valide ventrē *Equitantes*
inferiorem, & inguina apprehendant fascia: & in *tingunt.*
anteriori sedis parte, puluinar apponant cui inni-
tantur, ad firmandum brachia & manus.

Secundum longas profectiões, aliosque validos labores, etsi lassitudinem quis non sentiat, haud aliter quam si lassus esset, curetur.

Atque labores, si corpore inani suscipiantur, minus laedunt.

Naugantium.

Qui nauigat, & nausea premitur, si multum bilis euomuerit, vel abstinere a cibo debet; vel paululū sumere. Si pituitam acidam effudit, cibum consueto leuiorem sumat, sin absq. vomitu nauseet tantum, vel abstineat: vel a cibo vomat: & a vomitu, panis vino aquoso, & odoro maceratus ingerendus, & naribus grati odoris ad mouenda, inter quæ acetum rosaceum, & stillatitia rosarum mirifice recreabunt.

Rauitas.

Si cui ex vocis contentione rauitas oboriatur, arteria glycyrrhiza, & potiuncula dulci recreāda. Sin vero loquendo fessis, defatigatio sequatur, succurrendum vociferatione. Qui vociferaturus est, debet cum aluū deiecerit fricari leniter ac præcipue partes inferiores: faciemq. spongia madefacere, aut abluere; & prius sensim loqui, ac per interualla media & vociferando memoriter dicat, quorum meminert, quæque multas habere lenitatis, & asperitatis mutationes videantur. In primis autem vociferandum est, vocem quā grauissimis fieri potest tonis producendo: tum ad acutissimos eandem redigendo deinde cum non multum in acuto sono permansum sit, retro vicissim paulatim reflectendum, vocem diminuendo, donec ad grauissimam, à qua ductum initium est, reuertatur.

Correctio vocis.

Vociferationis modus.

Modus vociferationis est pro viribus animi alacritate, & vociferantis consuetudine.

Dieta a quantitate laboris.

Si quis tempore æstiuo, ex labore æstuat & defatigatur, ita vt corpus siccius, & calidissimum euadat, is fructibus vesci debet: pomis, prunis, cerasis, persicis, cucumere, pepone, &c atq. à balneo aqua primū detur potui, deinde viuum modice dilutum, tum

vomitur

omitus citetur, post offerenda lactuca, deinde pedes suilli probe cocti, ex aceto & garo, tū gallorum, & anserum ventres, atque piscis aliquis carnis teneræ, in sartagine coctus. gustet, etiam si velit oleum haud mali succi & cucurbitam. his transactis, vinum aqua frigida valde dilutum bibat.

Qui vitam ex instituto suo degat, si ab exercitatione æstuet, aquam frigidam fontanam potet.

Qui exercitatione, & balneis à cibo laeduntur, hi ambulare debent ante cibum. cōtentione aliquantulum maiore, à cibo tardissime & iecori ne obstruatur oxymelite consulendum, & omnibus attenuantibus vitandum, dum mali metus cessauerit.

Vbi quis vehementer lassus fuerit, motibus moderatis moueatur, ac tardis: & quies frequens interponenda, qua quiete lassus oleo dulci atq; copioso fricandus, pluribus contrectantibus; ac deinceps libus solito parcior esto, & nutrimenti facilis.

Lassitudo duplex est, vel musculis puris: vel inquit *Lassitudo duplex.*
 atis Musculis puris, lassitudinis sensus tensius esse solet. *Musculis*

Lassum tensiuo iuuat pauca & mollis, ex oleo *puris.*
 elido frictio, cum somno & quiete: aut lotio medii temperamenti, atque incalida pluscula mora, bis vel ter lauando, ac post inungi debet antequam vestiatur, etiam die postero, cum è lecto surgat.

Inquinatis musculis est vlcerosa vel phlegmono *Musculis*
 a. Vlcerosa accidit malis succis & acribus præditis: *inquina-*
 succedit recentibus cruditatibus, cum aut exercen- *ris.*
 tur immoderatus, aut in sole sunt morati: etiam sa- *Vlcerosa.*
 ubri corpori accidit si multo nimis se exercuerit.

Iuuat hos frictio mollis multa, & plus frictionis, quibus sub cute tantum; motuum plus, quibus profundius in musculis sentitur lassitudo. Alantur vberius tensius, & nutrimento solito humidior. *Phlegmo-*

Phlegmonosa, ex vehementibus motibus nasci- *nosa.*

tur: & eos maxime inuadit qui exercitationibus minus sunt assueti.

Cura: oleum tepidum, cum frictione mollissima, & longissima in medi temperamenti aquis mora; & si aqua paulo tepidior fuerit, iuuerit magis: multa quies, nutrimentum humidissimum, & refrigerans, parcius quam in reliquis: his etiam sanguis vacuari salubriter poterit, vsu cum viribus collato.

Hæc de lassitudine.

Sin vero labor tantus sit, vt corpus inaniatur, & squalidius multo euadat, est obstandum arte maiore.

Inaniti

corporis

ex labore.

Huius inanitionis gradus sunt duo.

Signa communia sunt: horrores à deambulationibus matutinis, & exercitiis, capitis vna grauedo.

Cura communis: calida lauari, molliter cubare, laboribus & ambulationibus moderari; vngi & fricari modice: cibus copiosior esto, solito humectior, & succi boni, & sensum appositus: potus mollis.

Primi gradus inanitionis ac leuioris cura.

Cura primi gra-
dius ina-
nitionis.

Vnctio & frictiones ante prandium adhibeantur, & die primo largius solito prandeant, & vini mollis quod satis est, bibant: & à prandio, somno vtantur moderato: ad vesperam, vbi exercitiis leuibus vsi sint, & calida loti fuerint, cœnent more consueto, atque à cœna ambulationibus abstineant, sed aliquanto post tempore decumbant. Postridie in aqua lauentur, & somnis mollibus tempus transigant, & deinceps ad diem quintum, ad cibos & labores consuetos reducantur.

Gradus alter inanitionis.

Cura alterius
gradus.

Signa. Ab exercitio mox, postquam corpus refrigeratur, horret: & stridor dentes, tremorque corpus occupat; somnoque grauantur; & expergefati, sæpe oscitant, à cœna item palpebræ ipsis graue sunt.

Cura

Cura.

xercitationum dimidium auferatur, (cibus in-
a magis refrigerantibus atque humectantibus
in priore) ad dies quinque, & die sexto, tertia
laborum ablatorū apponatur, post alios quin-
dies, dimidium reliquorum laborum, id est, vna
ia restituatur, & post quinque alios, rursus ad
suetos labores redeant, qui tamen solito leuio-
sint.

in balneo si quis æstuet, hunc acerum reficit; ore
entum vel aceri penuria aqua frigida.

*Æstuant
in balneo.*

Qui otiosam vitam degunt, boni succi cibis vtan-
& concoctu facilibus: nec tamen valde nutrien-
us & alui subductio diligenter curanda, & vrinx
lectio: & frictiones ieiunæ moderatæ manibus
enuante oleo quopiam delibutis: potio tenuis
ac diluta. Venus his utilis,

*Otiosam
vitam de-
gens.*

Qui toto die sedit, nihil huic currendum, sed len-
ambulandum est, lenta quoque in balneo mora,
inde coena exigua huic prodest. Qui ex segniore
a, ad exercitationes se traducere volūt: & ad bal-
a: vacuentur prius veris initio sanguinis detra-
one, vel venæ sectione, vel malleolis scarificatis:
od si recusent, medicamento vacuandi sunt quod
flauam bilem & pituitam, & serosos humores de-
here queat.

*Toto die
sedens.
Ex otio ad
exercita-
nes detra-
dusens.*

Si cui fatigatio ex animi motibus ac laboribus
intigerit: (obiecto murato) alio animus ac sensus
cipiantur, in quo haud ita laboret: ac tum modus
tam teneatur.

*Fatigatio
ex moti-
bus ani-
mi.*

Si interna meditatio, & contentio sit; à difficili-
is ad faciliora, atq. iucunda.

Si externorum sensuum defatigatio sit, ab extre-
is obiectis, ad media sensus traducantur; atque si
ehementer laborauerint, imperanda omnimoda
statio, somnoq. si opus est, indulgendum.

*Defatiga-
tio extero-
rum sen-
suum.*

I. Visus.

Tum si visus ab obiecto nimis excellenti offendi-
datur, prorsus aduersus color est adhibendus: ut si
solum splendore laedatur, niger adhibeatur. Reficiuntur autem
tem oculi colore cœruleo ac fusco: & superficie pel-
lucida: ut speculu, aqua preslenti, &c.

Perturbationes oculorum a fumo factas, vel a
dore, vel puluere, (mali causis externis prius vici-
tis) oculi aqua dulci tepida lauentur primum, tū f-
gida splendorem auersentur, & oculos claudant,
si necesse est, victu solito parciori interea vtantur.

II. Gustus

Gustui amici saporibus sunt, ex succis dulcibus,
pinguibus: sin vero gustus ex aliquo offendatur
maxime pingues saporibus conueniunt.

*Stupor
dentium.*

Dentium stupori ex alimentis, vel alio quolibet
orto, portulaca mansa medebitur.

Thymoses

Thymoses in tempore sunt alio traducendæ: se-
sim, idque per media, maxime quæ corpus grauius
procellunt: ut amor, ira, tristitia, &c.

*Signa a-
more ca-
ptorum.*

Amore præter modum capti, oculis tandem ca-
fiunt, nec tamen lacrymantur: verum apparent v-
uti voluptate repleti: palpebræ ipsis frequenter mu-
uentur; & cum reliquæ corporis partes non colla-
buntur, soli oculi his contrahuntur & concidunt.
Pulsus (vbi vel audiunt vel vident amasium) subi-
turbantur; nec æqualitatem, nec ordinem seruant.
tristes sunt & peruigiles.

Cura.

Cura: hi ad balnea moderata, vini potionem, g-
stationesque, ac spectacula, & ad fabulas audiend-
animis sunt abducendi; interdum obiurgandi, & m-
nis terror his incutiendus: & contentiones adue-
sus aliquos excitandæ, & ad alias curas ratio tran-
ferenda.

Amasium, quouis modo in odium pertrahe-
dum; & ipse amore captus in omnem amœnit-
tem perducendus, & alio amorem flectere tenta-
dum.

ira in aliquibus veneris vsu mitigatur, eodemq; ira.
illis tristitia.

Tristitia

Præter modum tristes vinum bibant, boragina-
m, buglossatum, & in quo citrigo, & radices gei
coluerint: & musicæ aliquo genere permulceantur.

Qui intemperanter venere abusi sunt.

Si densandi, calefaciendi, humectandi, confir- *Intempe-*
mandi sunt: ac primum vestimentis operiti conqui- *rantia*
rant: somnoque satis indulgeant, donec corporis *Veneria.*
trentio subsederit: atq. post, cibus liquidus sit, &
olis coctus, & succi boni, potus aliquanto mera-
tus, & cibus solito parcius, dum se recollegerint.
Si quis à prandio ad res venereas irritetur, quie-
re oportet, donec cibus resideat: sin autem à cœ-
ne necesse est paululum ante dormire. Error circa
venereas, minor est in calefacto, quam refrige-
to: in pleno, quam in vacuo: in humido, quam in
siccato.

Menstrua si resisterint, tempore naturali, in sessi- *Menstruo*
bus, fomentis ac potionibus ex matricaria, nepeta, *rum ob-*
regio, maluis, artemisia proliciantur. Et conserue *structio.*
rum boraginis drach. 6. vel drach. 1. ex haustu satis
cythari vini albi calefacti, ventre ieiuno.

Si nuptæ sint, in sinum inferendum rutam, cum
melle tritam: aut porri succum, aut leporis coagulum
adhibendum.

Exercendum autem his secundum partes inferio-
res, & frictiones cruribus adhibendæ, & per arenam
in terram mollem ambulandum, & Lacunarum

mulierum more ad nates, saltandum, atque si opus *Menstruo*
malleoli, vel incidendi, vel poplites. *rum flu-*

Si nimis fluxerint, in sessibus, potionibus, &c. ad- *xus nic*
tingentibus, vtendum: & quiete, & partium supe- *mius.*

rum frictionibus. *Prophy-*

Gestationis Trophylactica.

lactica

Grægnans si pica laboret, omphacomeli bibat, & *gestationis*

portulacæ cremorem, & ipsam portulacam in cit
sumat: item cucumeris semen decorticatū ex aqua

Sin vero stomachus ex acri, acido, aut salso h
more mordeat: ex aqua calida copiose hausta v
mendum: & vinum fuluum, odoratum, antiquum
adstringens, bibat.

Potus esto moderatus, & præcordia stomachi
vngvine fricentur; & molli lana contegantur.

Pedes si forte his tumuerint, malorum citriorum
decoctis lauentur; & brassicæ folia imponantur,
obligentur: vel rosaceo aceto, & sale fricentur
piusculè.

Quinetiam si prægnans humentes valde loc
habuerit, & ad humidum præter modum flecten
retentricem vteri vim imbecillem habeat: erina
terrestris pellem vstam, ex aqua, aut vino, sumat:
que pudendi osculo eundem puluerem illinat: v
myrti baccas cum vino, aut oleo lentiscino vsurp
atque myrti, rubi, camrubi, rosarum, & similium a
stringentium, & siccantium decoctis, locos hume
tes irriget. Si austri, pluuiæq. occuparunt hyeme
ver autem & frigidum, atque siccum, existat: tum
maxime gravidis ne abortiant cauendum.

Partus prophylact. ad difficilem partum.

*Trophy-
lactica
partus.*

Partus si difficilis sit, iuuanda parturiens mal
rum foliis substratis, quæ protinus à partu auferen
da: & dictamnus quouis modo adhibendus: & ca
cri fluuiatiles vsti sumendi & oleum dulce, deco
ctum maluæ; foenigræci, seminum lini, mucilaginis
infundendi: & in primis oleum potum summo
præsidio.

Si feruor vrget, oua cruda, mucilaginis misc
tur: atq. si vires deficient, pane tosto, odorato, &
cumere olfacto, vel citreis malis sectis, & olfacto
vel deniq. iusculis analepticis recreentur.

Qui vigiliis squalēt. & curis exhausti sunt, hi quie-
re & somno tradendi, leni aquæ murmure, vel alia
suavis ratione conciliato: & balneis vespertinis his
utendum; vbi bene prius coxerint, & cibo hume-
ante, & concoctu facili, vino largiore, tenui, nec
crasso. Caput oleo rosaceo, papauerino, vel ane-
thino, ad somnum & spiritus componēdos perfun-
dendum. item musica lenis & suavis, & tanquam
simul suspendens his utilis.

Cibi omnes euchymi sint, & concoctu faciles: vi-
am quod non admodum corpus feriat. Postea (vi-
bus recreatis) membra squalentia balneis hume-
anda: verum his non est immorandum, sed cor-
pus & caput leuiter perfundendum, & inde in so-
mum descendendum; frictionibus & vnctionibus o-
mnibus.

Pinguedo parturientis si impedimento fuerit, in
stulo resupinā figurare oportet: vt ad femina ge-
na succlinet inflectatque: quo vulua ad abdomen
adens, è directo ostioli habeatur: q̃ digito pingue-
dine delibuto, illinere oportet, & sensim aperire.

Alui durities si impediāt, succurrendum clystere,
vesicæ calculus, eo depulso vrina emittatur.

Si præter naturam figuratus sit foetus, naturalis
figura reddenda: partim pellendo, partim adducen-
do, partim flectendo, partim in rectum agendo.

Si manum, pedem ve, præmiserit; non attrahere
membrum prehensum oportet, verum digitis hu-
mero infantis, vel coxæ affixis, rursus in locum con-
ueniētem id quod præmissum est, diducere: & si fir-
ma adhaesione totius infantis, indecora fuerit figu-
ra: sursum prius ipsum ab vteri ore sublime trude-
re, & deinde prehensum rursus ad os dirigere.

Si partus inflexus sit, componatur corpus sicut con-
trario: vt in contrarium. reuoluatur: & quascun-
que partes obiterit ore facio propiores habuerit;

(modo ea figura exire foetus poterit) easdem teneat: & sic adducat: ita tamen, vt maxime caput infantis quærat, & ipsum teneat, & foris adducat. Sed si pedes propiores fuerint: ipsos teneat & adducere tentet.

Si hac arte embryon duci nequit, ad embryulciam est perfugiendū. Administratur aut hoc pactor:

Duriusculo moderate strato iaceat parturiens: & curuatis pedibus suis & tepefactis, spondis etiam lecti plantis affixis, & scapulis vel ministris firmatis, vel fascia ad reclinatorium alligatis, qui facturus est contra inferius paulo sedere debet & apprehensum embryulcum abscondere: & digitis tepefactis, & oleo perunctis, atque in vnum conductis, embryulci curuedine manus sinistra in orificium matris iniiciatur. Et tentandum & quærendum, in quem locum embryulcum defigat. Atq; si partus in caput descendat; oculi, occipitium, & os aptissimæ partes erunt: si in latus, inter inguina, & coxas, defigi poterit: si per pedes descenderit, super pectinem recte infigetur.

Si ex prædictis locis nullus inueniri poterit: vbi cunq. loco vulnerato, embryulcum infigat: & erecta manu foras ministro tradat: Et eodem modo etiam alterum immissum alteri parti infigat, quem & ministro tradat. Ita autem æquabiliter infigi debent, vt cum conari cœperit parturiens, æquabiliter adduci possit.

Dein iube vt leuiter conari incipiat: ita vt cum matricem perceperit ad partem inferiorem, tunc & ipsa conetur: quoties vero matrix sursum ascenderit, ne conetur. Ipse vero digitus index ceroti inunctus, orificio matricis circumagatur vt illud aperiat, & strictura soluatur, & si quid ibi corrigendum sit, id ipsum corrigatur. Interea frequenter loci oleo calido, & mucilaginibus irrigandi.

Sin vero

Sin vero infans foras prodire aliquantulum visus
erit partibus superioribus: iterum embryulci infi-
endi, quod tamdiu ac toties faciendum: dum to-
m corpus infantis prodierit.

Sin autem partes foras emissæ, nec embryulcum
mittant: nec reliquū corpus exire sinant: vel pars
antis aliqua præter modum, grandis fuerit: aut
tus mortuus (id quod ex frigiditate percipietur,
quod nil mouetur nec quid pulsant arteriæ) Em-
yotomia curanda, atque tum, partes quæ foris
nt, primum secandæ, si intro detrudi nullo modo
eant.

Si infans hydrocephalia laboret, vulnerato occi-
pio humor primum effundendus, vt vastitas suc-
bat. Si natura grande sit, prius est manu constri-
ndum, vel occipitio vulnerato cerebrum effun-
ndum.

Si autem in diuexum iaceat; & humeros lateri-
s vuluæ infixarit: & adhuc super vixerit, eius iugu-
ferramentum infigendum: vt effuso abundanti
guine, corpus foetus attenuetur. Sin venter hy-
poticus sit, & ipse vulnerandus. Manus & pedes et-
m intus præcidimus ab articulis. Si vero magnitu-
ne sua caput in interiore vuluæ parte absconsum-
erit, à gutture præcisum corpus, dextra manu ad-
ucimus.

Exsecto tandem foetu, omnes partes in mēsa col-
candæ, vt nil remansisse cōperiatur. Hoc toto ne-
otio perfectio, vterus oleo calente, & mucilagini-
us fouendus: & si sanguis fluxerit plurimus, restrin-
endus: bolo, rosarum pediculis, &c.

Si à partu puerpera non satis purgata fuerit, sub-
ce costum, pulegium, nepetam, satureiam, hysso-
m, & in cibo sumat nepetam, porrum, cuminum,
napi & olera acra, &c.

Hac de Prophylactica parte qua gestorum erroribus

E

debetur; sequitur quoq; fomentum.

Atq; primum aeris Prophylactica.

*Trophy-
lactica
aeris.*

Aeris grauitas luculento foco ex sua uolentib; corrigatur, & suffitibus ædium frequētibus, vel fouitetur: atq; (nisi pestilentia cogat maturare) à graui in salubrem migrandi, prima ætas commodissimum tempus erit. Sin vero ex anni tempore aeris temperatus existat: vel alias periculum minetur, tunc li Prophylactica obstandū, maxime ubi corpus, eum temperatis excessibus consentiat.

Atq; hyeme (que saluberrima est ut plurimum in ni uento vacans) semel in die cibus sumendus, multus, nisi quis valde siccum & adstrictum vētre habeat, & consueuerit sapius, tum modicum praesteat, & ipsum siccū, sine carne, sine potione sumat. Victus totus esto siccus, austerus, calefaciens, merendus, panis multus; obsonia assa, potius quam elixa: potiones parca, meracæ: olera sicca atq; acria: sorbitiones parca admodum, vel nullæ, ac tum potus tanto parcior.

Labores multi: cuiuslibet curuis, sensim accessione crescente: lucta in oleo, longa: & ab exercitio, deambulationes acuta atq; celeres: à coena in tepore tardæ, & matutina admodum multa, tum nocturna itinera suscipi poterunt. Cum palastra quis se plenè exercuerit, ac lauare velit, frigida lauet: ubi alio exercitio, calida utatur: & humidiores, ter in mense sicciores, bis vomant à cibus omnis generis, post vomitum, sensim redeundum ad cibum consuetum, per tres dies: ac tum laboribus leuioribus ac parciorebus utendum: plurimis tamen, maxime diebus æquilonaribus, atque tum plus esse conuenit, diebus austrinis labores pares: cibus atq; potus parciores, stratum durum.

Sicuti ex frigore raucitas contigerit, hanc voci contentione arceat studeat: tullim vero inde ortam sanat spiritus cohibitio.

Si quis nimis refrigeratus sit decumbat locis calidioribus, perunctus oleo irino, chamamelino, &c. Post, ubi modice incaluerit piper & myrrham, cum no dulci, odorato, ac veteri assumat: vestibus bene lectus sit, & sudet: potus sint meraciores. Per maxima frigora iter captantes; oleo euphorbii articulis, & partibus extremis, illinantur; & vinum bene aromaticum prius hauriant: nec nō aromaticum quid odorantur, atq ore contineant.

Veris Prophylactica.

Senū ab hyemali dicta, ad ver accedendum: ac *Prophylactica veris.* labores detrahendi, & cibis mollioribus & a-

nosioribus utendum: & lūta cum oleo in sole. Deambulationes à cœna detrahendę plures: pauciores mane.

Maza pro pane offerenda, & olera cocta sumēda, & opsonia elixa assis adæquanda, & balneis utendū, & prandendum parum, vel parcius quam hyeme & vomitibus utendum primum quarto quoque die, & deinde per longius tempus. Atq; vere, alius vomitu, alius sanguine, alius aluo, vacuandus pro natura & necessitate.

Paulatim cibo detrahendum, ut ad æstatem acceditur: ac potio dilutior, caro elixa, atque olerum minus, venustum tutissima.

Æstatis Prophylactica.

Æstas saluberrima, cui multum Fauonius spirat. *Prophylactica æstatis.*

Etq; tempestate cibis mollioribus ac paucioribus utendum: & maza magis quam pane: potibus mollioribus, & aquosis utendum & pluribus: atq. prandio modico, etiam ientaculo, & merenda, fructibus, vel cibis

frigidiore, euchymis, & liquidis: & fructus cum cibo.

Potui inter edendum utendum satis largo: & somnus à prandio levis, huic tempori aptus. Per diem minime bibendum: nisi corpus siccitate laboret,

olera acida, apoia, cocta, vomitio tantum, vbi repletio coegerit, venus admodum rara.

Laboribus ac cursibus leuibus vtendum, & exercitiis: cursibus circularibus, & rectis reuertentibus modicis, multo tempore. deambulatio esto in vmbra, & lucta in puluere, ac volutationes in puluere: coena deambulandum non est, sed saltem surgendum. Soles vitadi, item frigora, tum mane, tum vespere, quæ à fluminibus, aut stagnis, aut niuibus exhalant. Hoc tempore iuuenibus, bene carnosus, & calidis, die sereno, sub meridiem, & oleo vnctis, utile est totos vel mari, vel flumini insilire, & natand se exercere.

Hæc ad solstitium æstiuum gerenda, quo tempore omnia sicca adimenda & calida: etiam panes, nil voluptatis gratia concedantur: nam sequenti tempore vtendum mollibus ac humidis, refrigerantibus ac albis vsque ad æquinoctium per dies 90. quies, & laborum diminutio.

Si quis fortassis sole adustus sit: locis aeri expositis decumbat: atq. facies, manus & crura, frigida perfundantur. Si siti conficiatur, qui assueuerit, frigida aquam bibat: sensim hæc omnia: interea cibus esto modicus atq. humidus. Quibus per soles necessitas incumbit proficisci, his caput & corpus reliquum, solis radiis bene tectum sit: & si oleo violaceo prius inuncti fuerint, æstum facilius ferent. Si ex sole valde squaleat, & siccus euadat: huic in balneum protinus eundem, perfundendumque oleo corpus & caput, deinde in dolium bene calidum descendendum est, tum multa aqua per caput infundenda: primum calida, deinde frigida.

Prophylactica autumn.

Autumni Prophylactica.

Ab æquinoctio per autumnum ad hyemem lente accedendum: quo tempore mutationes frigorum ac teporis, vestitu crasso vitandæ. Item in veste tum exercen.

ercendum: frictione ac luſta in oleo, vt ſenſim
eſſio creſcat; & deambulationes in tepore fiant,
alidis lauacris vtendum.

Somni diurni detrahendi: ac cibus vtendum cali-
oribus, ac minus humidis: & iſſis puris & potibus
rioribus, verum mollioribus, non tamen aquo-

Oleribus quam æſtate minus. Venus parca, aut
illa: frigida potus tum fugiendus: maxime frigus
oræ, ac meridianus ardor cauendus: atque tunc
vere) vacuationum aliqua molienda. Neq; ſine
te, nec ſine calceis prodeundum: præcipue die-
bus frigidioribus. Neq. ſub dio pernoſtandum, niſi
ne teſtus ſis.

Cibus paulo plenior, & potus parciſor. Atque hæc
prophylactica eſto: aere elemētaribus qualitatibus
temperato.

Teſtis Prophylactica.

Sin autem aer venenatus peſtilētia ſit, vel immi- *Trophy-*
at peſtis metus: ac fugere datur, cito ac longe fu- *lactica*
ndum ac redeundum tarde: cito, i. quamprimum *peſtis.*
na peſtis aſſuturæ apparuerint: quod ex ſignis ſe-
entibus percipietur.

Anni tempora ſuam temperiem non ſeruarunt:
ime ſi ver frigidiusculum ac ſiccum; æſtas poſt
idior & humidior fuerit: & totus añus ſit auſtri-
s, nec auſtris vehemētibus, peſtis futura metuen-
item ſi à vētis omnino aer ſiluerit, aut turbidus,
nebroſusq; magna ex parte fuerit: cumq. pluuiam
pe minetur, nec tamen pluat: & ſi eodē die, modo
gus, modo calor alternauerint: aerq. nunc turbi-
s, nūc clarus exiſtit: & ſequentē die mane ſol in-
nebulas puluerulentus apparet; item quando æ-
te à pluuiā ſubito, magna ranarum diuerſi coloris
pia viſitur: & numeroſa inſectorum copia ſcater:
mq. ranarum caudatarum, ſerpētum & ſimilium
oles vbiq. occurrens. Cumq. lumbrici popularites

grassentur, morbilli, & variolæ frequētes. Porro an-
nonæ caritas præcedens, & abundantia sequens, o-
mnisq. fames populariter grassans, pestis causâ esse
solet.

Si superne aer infectus fuerit, aues relinquunt ni-
dos, aeris color subluteus esse solet: & sol sæpe palle-
scit, certe planetarum cōgressiones: vt Saturni con-
iunctio cum Marte, vt tradunt Astrologi & come-
tarum ortus, aliaq. impressiones igneæ locis immi-
nentes, his pestem de cœlo minantur, tum montes
abrepti, conuallium habitatoribus portendunt. Ad
hæc si volucres volando intereant & altum volari
soliti, humiliter volent.

Sin vero à terra pestis sit, agri & fontes fumantes
grauē olent: & terræ fructus cito putrescunt: & fun-
gorum atque herbarum foetidarum copia scatet, &
quadrupedes maxime omnium oues, tum primæ
intereunt, & volucres prope terram volare solitæ
sublime petunt, & in cauernis latitantia prodire so-
lēt: mures, scorpiones, talpæ atq. troglodyta reliquæ

Ab aqua si pestis sit, pisces mali odoris, atq. sapo-
ris sunt, & commoriantur.

Atque his pestis signis apparentibus, vel horum
aliquibus, cito fugiendum, & longinqua regio sit, in
quam fugias: etiam si fieri potest, altos montes in-
fectis locis habeat oppositos: & loca in ascendente
& eius horoscopo conuenientia vnde fuga fit, vi-
tentur.

Et antequam totum solum contaminetur, ma-
turandum gradu lento, cautione summa, ne per lo-
ca infecta iter fiat.

Reditus tardus admodum sit, domo prius igni-
bus, & suffitibus purgata.

Quibus vero non datur fugere, neque aer corre-
ctionem facile admittat: secundum Deum, Prophe-
tasticis his fidendum.

A

Ac primum purgamenta omnia vicorum, atque
 um depurgentur: feles omnes & canes interfi-
 untur: & diebus singulis, in publico, ad vespem
 res accendantur, quamplurimis in locis, ex mate-
 ria odorifera, pura, sicca: ut iunipero lauro, cortici-
 aranciorum adiectis, absinthio, libanotide, la-
 ndula, salvia, &c.

Conuentus frequentiores interdicendi, & ne
 od edule putridum venale sit curandum.

Aer vitetur nimis patens & angustus nimis.

Aer.

Raro, idq. tantum cœlo sereno prodeundum, &
 ium fenestras semper diligenter occludantur. Aer
 estuet temperandus, semperq. siccandus est.

Qui domo egredi coguntur, haud prius exeant,
 am sol vaporem nocturnum, & nubium obscuri-
 tem prorsus discussit, vitent hominum turbam,
 arctius consortium, præsertim ubi adhuc sunt ie-
 ni, nam tutius est semper pransum domo egredi
 am ieiunum, etiam optimis præfidiis munitum.

Faciem ab eis vertant quos alloquuntur, & ven-
 m si quis afflauerit, à tergo accipiant.

Ædes sint speciosæ, & plurimis cubiculis instru-
 g, in quæ frequens fiat mutatio, dū reliqua interea
 ro ac mane, igni ex odorata materia purgentur:
 maxime tempestate pluua ac nubila.

Ædes.

Ad ignem minime accedendum, nisi ubi frigus
 get: aere æstuante parcendum igni, post quem
 ccensum aer denuo est refrigerandus: & semper
 eris qualitati excedenti (nisi ea siccitas est) resi-
 endum.

Cubicula, ædes, lecti, ac vestimenta materia odo-
 fera, ac aromatica suffiantur: & odoramenta con-
 aria tempestate vsurpentur, nisi caput graue sit aut
 duxionibus opportunum. tum his abstinendū, ma-
 xime admodum odoratis, & caput ferientibus.

Ex locis infectis allata chorecæ tractanda omnia:

& si edenda fuerint, abluantur, excorticentur, vel etiam coquantur atque ab infectis locis omnia diligenter cauenda.

Vestimenta nec valde calida, nec graua ex materia fiant spissa, textaq. pressius, nec vitiosa: maxime ex coriis puris hircinis, & ex serico omnes, holoserico excepto, item ex camelorum pilis confecta.

Sæpius mutantur vestimenta & suffiantur, præcipue indusia & corpori proxima, indusia lota prius, & munda stillatitia rosarum madefiant, in qua camphoram, & sandalū dilueris: Si tempestas fuerit calidior; sin frigidior, ex materia calida, ex decocto reos vel aquæ angelicæ, &c.

Vestibus reliquis quæ madefactionē non ferunt, adhibeantur suffitus pro anni tempestate, & corporis temperamento.

Dieta.

Dieta reliqua in his tribus consistat: vt nec calorē reddat auctiorem, nec corpus immodice humectet, nec multum cogat respirare.

Exercitia.

Plus quieti quam exercitiis dandum, & exercitia vehementem & crebram respirationē ne reddant. Ambulatio lenta sit, & loco temperato, & igne, vel suffitu purgato. Si locus salubris sit, sub dio: sin suspectus, sub tecto amplo, & maior ratio habenda loci in quo exercemur, quam in quo quiescimus. Hora exercitio esto matutina, postquam sol vaporem nocturnum plane discussit.

Qui per loca infecta peregrinari coguntur, nocturne se committant itineri, nisi plenilunium sit.

Alimenta moderata sint, & quantitate & qualitate nisi tempus, aut proprium temperamentum aliud suadeant.

Arida edulia sint omnia, & locis altioribus & odoriferis nata, nonnihil item acerba vel acida, facilia coctu omnia, & euchyma.

Panis sit ex tritico locis soli patentibus nato, & simile

le ad cereuifiam frumentū, ſolo non ſtercorato,
rna ſint aut bima, ante peſtilētem aerē collecta.
Huic pani iniiciatur hordei, aut ſpelte pars aliqua,
time ſit fermentatus, & ſale conditus: furno pri-
to coctus, & ligno puro, vel alia materia pura ca-
cto, & coctus biduum, iam molliuſculus edatur.
Interdum & biſcocto veſci iuuabit, azyma omnia
cruiſtis incocta fugienda.

Carnes ſint ex ſicciffimis, vel arte ſiccatis, vt ſuilla
ſa & macrior prius frixa ex aqua & vino partibus
uis, mox craticula toſta, tum incifa & condita, a-
ro & ſaccharo, demum aſperſis Vitulina aſſa, ex
omphacio eſa Veruecina aſſa, & prius modice ſalita.
uniculus tenellus, lepuſculus, volucres ſi peſtis
aſſa eſt ſuperior altiffime volantes, & nidulantes.
ſi vero aer ſuperne infectus ſit, propius terrā vo-
ntes & commorantes, vt perdices, phafiani, & aui-
la nemorales, item gallinæ iuuenes, quæ oua par-
riunt, & ex his nigræ, capi iuuenes. Et pulli galli-
acei, omnium carnes recentes ſint, hepata gallina-
um, caponum, & iuniorum gallorum, teſticuli, re-
quorum præterea viſcera nulla, aſſa potius quam
frixæ omnia, humore proprio, ac ſuo turgentia.

Æſtate à carnibus abſtinendum niſi conſuetudo
iud ſuadeat, & etiam reliquis temporibus piſcium
lubrium vſus eſto frequentior. Ex marinis ſaxati-
s & ſquamoſi. Aſelli recentes, mulli erythrini, bu-
oſſi, paſſeres, rhombi, lupi, mugiles, auratæ phyci-
es, coracini, gobiones, merulæ, paguri, turdi, pſitta-
trachuri. Ex fluuialibus trutta, ſalmo, vmbra, lu-
us, mullus barbatus, carpio, aſtacus. Ex amnibus
uris, atq; hi magis æſtate conueniunt, pelagii ceto-
s temporibus.

Hyeme aſſi aut frixi in craticula, ex pipere pauco
el cinnamomo, vel cepa, vel aceto vel omphacio
medantur.

Æstate elixi ex petroselino, sale pauco, & oxalides, vel aranciorum succo. Oua gallinarum recentium, sorbilia condita agrestia vel omphacio, vel aranciorum succo. Ex fructibus dulcibus carica tantum ac passula. Hortarii corrigantur cepa, porro, pipere, croco, &c.

Sumantur fructus & olera cocta prius, sub meridiem.

Ex fructibus acidi sunt aptissimi, vt mala punica acida, vel acido dulcia, & medicorum genus omne. Calidioribus tamen, mensa prima, & ante cibum, frigidioribus mensa secunda, pruna acida, poma curtipedula, sorba, mespilla, cydonia, pira hyberna. Secundis mensis, item iuglandes recentes, auellanae, amygdala & fructus duriores: ex leguminibus, faba, fresa & pyreta, ex ciceribus, pis, lentibus addita oxalide, petroselino, croco, cinnamomo, atq. cremore in ceruicula traiecto & iterum cocto.

Ex oleribus acida conueniunt maxime, vel aliquatenus amara & oxypara, ex lactuca, cichorio, endiuia, oxalide, portulaca, & similibus coctis, & asperso sale.

Quouis anni tempore conueniunt, borago, buglossum, cichorium, endiuia, oxalis, pimpinella parua. Olera acra hyeme, æstate frigida humida. Sic in iusculis hyeme salua, mentha, thymus, &c. Olera tepant quater lauentur, aqua tepidiore priusquam versurpentur: asparagi, & lupulus, rapus, napus, pastinaca, cepa, raphanus, omnia conueniunt.

Æstate conueniunt iuscula glaciata tam ex pulpis carnum quam piscium, condita saccharo: vino albo, vel aceto, croco, cinnamomo, santalis.

Cappares sale conditi, & aceto prius leuiter cocti oliuz, condimenta fere omnia acida, vel austera, nisi ventriculi frigiditas impediat: atq. tum aromatati aliquo, vel mentha corrigantur.

Pingui

lingua vitentur omnia.

Aqua ad omnes vsus esto saluberrima : ex coelesti
isterna pura: superne fluitans, si causa pestis sit
erior: sin superne aduenerit corruptio, ex puteo
fundissime hauriatur aut ex amne, vel fonte.

Fontana vel putealis, non prius hauriatur, quam
radiis, atq; calore puriorem effecerit. Sin insalu-
sit, coquatur cum pauco aceto & hordeo, vel
missa panis medulla.

Purgabitur optime, si chalybs, argentum, vel au-
m candens, ea frequenter exstinguatur.

Vinum ac potus omnis, esto aquosum, ac tenue:
num album, vel subrubrum, odoriferum, modice
sterum, nisi senectus, quidve aliud meracius po-
let. Hydromeli ad acidum vergēs, cereuisia mul-
præstat.

A pastu sitientes, bibant ex aqua frigida syrupum
etosum simplicem, aut iulepum rosaceum.

Potus ac cibus; solito parcior sit: & quibus est de-
ficta appetentia, condimentis excitanda.

Prandium coena lautius esto: coena parca, inter-
am nulla: iurulenta fugienda, vel tanto parcius bi-
endum.

Cibus saluberrime in tria tempora partietur vel
iura; ientaculum, prandium, merendam, coenam.

Cibus esto bene masticatus, & potu aliquanto v-
erior.

Si aluus adstricta sit, (inter alia) catapotia alexi-
harmaca sumi poterunt, horula ante coenam.

Sudor spontaneus nec inhibendus, nec prouo-
candus.

Mane corpus manibus propriis leuiter fricandum
oculis, ac mūdīs: vel chamæmelino, &c. vinctis, si cor-
pus densum sit, sin rarum, myrtino, aqua rosacea
auca mista.

Caput consuetis, eluendum semel hebdomade

lixiuio ex odoratis, libanotide, lauro, lauendula, &c.

Pedes lauentur decocto rosarum, foliorum vitis salicis, arundinis, chamæmeli, & pauco salis adiecto.

Venere raro vtendum, forte septimo quoq. die vel rarius, pro corporis natura.

Somnus esto satis prolixus, nocturnus, longissimus à coena cubiculo prius suffito.

Ex pathematis, mediocris hilaritas, cum eximii animi securitate tantum iuuant.

Si sanguis redundat, vena secanda consuetis & ferentibus, quibus non conuenit, inedia, & frictio adhibenda.

Simulatq. suspicio est aeris corrupti, sanguis mittatur luna plena (si fieri potest) primum à dextro mox à sinistro. Modus vt corpus onere, & mole liberetur.

Si corpus cacochymia particeps sit, leuibus medicamentis purgandum; & endiuia, cichorii, fumaria, lupuli, boraginis, scabiosa, marrubii, angelica, tormentilla, pentaphylli (quæ item solutiuis incoquantur) frequens vsus esto, & partibus sympatheticorum vsus esto frequentissimus; & pillularum communium: vt, Rec. aloes optimæ drach. 2. myrrhæ electissima drach. 1. Croci orientalis drach. s. redacta in puluerem excipiantur syrupo absynthii, vel acetosi simplicis, vino albo, aqua scabiosa, &c.

Sumantur in crepusculo diei aut noctis, ventriculo inani, singulis hebdomadis drach. vna in nouē pillulas partita; primo die vna sumatur; tertio tres; quinto quinq. vel contra.

Aluo valde adstrictis, clystere vtendum, & vrinae secretiones fiant ex diureticis leuibus, corpore puro, aut prius purgato.

Admodum cacochymicis, tibiae vel brachia, ferro inurantur candenti, aut vlcera caustico potentiali irritentur.

Cutis

Cutis si adstricta sit: corrigetur frictione & bal-
&c.

retiosi lapides tum gestentur: granatus, carbun-
us amici cordi, smaragdus cerebro, sapphyrus he-
corallus, ventriculo, hyacinthus, topazius, acha-
& vniones omnes aduersus pestem. Item cor-
nicornis, vel cerui, sumatur frequenter.

Hydrargyrus auellanae testa inclusus, & collo ap-
sus: item arsenicum rubrum, & crystallinum,
ta mucilagineque excepta, & rubeta puluere
nisto, colloque appensa pro magnis amyletis ge-
ntur.

Sedoaria, angelica, cortices aranciorum & ci-
rum, masticeantur frequentissime: & gingina, ac-
ites, omni sorde careant: & panno aspero, vel
stifricio, fricentur: & paululum decocti folio-
n lauri, vel corticum mali citrei, naribus hauri-
ur.

Sæpe facies & os lauanda frigida, tantillo aceti
nixo, olfaciant mala arancia, citria, rutam, &c.
oma aromatica, & suaueolentia, gestentur ap-
nsa collo.

Cum frigidus est aer mane, panis assi modicum
natur, vino odorifero intinctum: interdum cari-
yna, nucis iuglandis minime rancida dimidium,
ia rutæ quinque, salis momentum, in bolum con-
a sumatur. Vel puluis hyperici pondere drachma
ius, vel 2. ex aqua buglossi, vel pulueris scordii ve-
antundem.

Sin æstus fuerit, iuuabit micam panis sumere suc-
limonum, vel aranciorum maceratam: item oxa-
is certa folia in aqua & aceto prius mersa, & pro
ntaculo sumta.

Sin hyems sit, theriaca: ætate, à quarto ad duode-
nū, adultis drach. i pueris drach. s. aut d. i. sex ho-
ante cibū ex sacchari puluere deuorata, magno

erit praesidio. Calidioribus tempestatibus electuaria frigida, ut diatrion santalon, diarsrhodon abbatum &c. Alexiteria haec in quotidiano usu esse debent, v diebus singulis, mane, eorum aliquid sumatur: modo pillula, modo theriaca, atq; in nouiluniis, & pleniluniis, maxime cura gerenda.

Hac de pestilentis aeris Prophylactica.

Sequitur errorum circa cibum ac potionem.

Prophylactica errorum circa cibum ac potionem,

Si quis se nimium impleuerit: (quod secundum in ediam precipue fugiendum) pro impletionis modo, vacuandus: atque si ventriculus crapula laboret, haec ipsa est eicienda, si recenter ingesta, euomenda, sin vero a cibo satis multum temporis elapsum fuerit, clysteribus potius est aluus irritanda & tepidis epithematis mitiganda: si cibus corrumperetur, (quod ex nidore rufus apparet) ex vini dulcis potu, vel alia qualibet arte, pro viribus corporis vomendum.

Repletio.

Si ex repletione singultus oboriatur: spiritus compressio, vociferatio cum multo clamore, sternutatio, concitata deambulatio, vel triste quid inopinanti nuntiarum, singultum soluent.

Atque cum quis satur est, nihil ei tum agendum: & si post aquam frigidam parca biberit, tum paulisper vigilet, deinde bene dormiat, multo facilius coxerit.

Si interdiu repletio fiat, post cibum, nec frigore nec aestui, nec labori, se debet committere, & si satietas ex cibus tenuis succi sit, minus tædet quam ex crassis & valentis materiae.

Si puer nimis expletus fuerit somniculosior statim euadet, & torpidus: venter intumescet, & inflabitur: & vrinae reddentur aquosiores: atque tum ei nihil exhibendum antequam prius ingestos cibos consumserit.

Crapula.

Si crapula sit, eaq; ex potu, vel potando quis excesserit

erit, nihil fere edendum ei: si ebrius ex eo eua-
rit, continuo vomere studeat, ex aqua mulsa pota-
giter, dum plurima iecerit, & morsus obtulerit:
si vomitus solio vtendum cum larga vnctione,
aliquo vero tempore quiescendum, ita vt sub re-
tine dormiat longissimo tempore, donec temu-
ria soluantur.

Et quis aduersus ebrietatē muniatur, vel potando
veneris ladatur, brassicam edat, & amygdala, & ab-
sinthii comam ante potationes bibat, & si ex vino
morsus percipiat, aqua frigida bibenda est, & po-
terit die rursus absinthii cremor sumendus.

Qui autem vehementer crapuloso, & assidua cruditate
toranti, incubus (id est, suffocationis in somno in-
ingratiatio, & velut ingruente aliquo oppressio cum
clamandi impotētia, aut vociferatione nil signi-
ficante) huic vena secanda, purganda aluus, & corpus
vacuandum. Purgationes autem fiant cum
scilla, aut veratro nigro, vel confusione hamech: vel
diacolocynthidos, &c. victus tenuis sit, & fla-
uorum cautio esto maxima. Cruditate diminu-
labores plus solito inualescant. His conuenit &
minum pronia quindecim grana nigra, cū aqua
affidue bibere.

Hæc de crapula.

in consuetudine ingurgitandi corpore repletus, *Repletio*
quod cibis labores superauerit, quis plenitudi *particu-*
laboret: hæc sensim est diminuenda. *laris.*

Repletio autem illa est vel secundum partes ali-
as repletas, vel corpus totum.

Secundum aliquas, est vel secundum partes pu-
as vel corporis habitum.

ut ubitas, vel secundū caput, thoracem, ventrem,
scam.

Capitis repleti signa sunt: vertigo, capitis dolor, *Capitis*
perichorismus, grauitas, aures sonant, tempora gna. *repleti s.*

faliunt, oculi mane illacrymantur, caligantque, res oppletæ odorem non sentiunt, dentium gingivæ attolluntur.

Prophylactica.

Prophylactica: summitates hyssopi, vel origanum terantur, & in ollula cum musto aut sape dimid heminæ deferuiant: & iusculum ieiuno absorbitur, ad os colluendum, & gargarizandum, vel si multa dilutum calida, eodem modo gargarizet, pite prius operimentis calefacto.

Thoracis repleti signa.

Thoracis repleti signa: totum corpus incipit dare, lingua fit crassior, sputum salsum, aut amarum aut biliosum exsistit, dolor costas & scapulas, sine occasione occupat: oscitatio frequens, vigilia, suffocatio, sitis ex somno, animus tristior, pectus frigidum, brachia & manus tremiscunt.

Prophylactica.

Prophylactica: vomitus post cœnam, sine repetitione & vomitiones ante cibum: vomiturus autem radiculos tenues præsumat, nasturtium, erucam, napi & portulacam, & mox aqua tepida super bilis, contendat vomere.

Ventris repleti Prophylactica signa.

Ventris repleti signa.

Venter cruciatur, turbaturque, cibis & potione maræ videntur, genua grauantur, lumbi nequeunt flecti, crura torpent, & totum corpus sine occasione laborat.

Cura.

Cura: venter his molliendus betis, mulsæ incis, alliis elixis, malua, læparho, mercuriali herba, ex melle confectionibus, cnici succo iniecto, si necesse est.

Si hepar, ac venæ sanguine turgeant, vel vires sanguinis copia premantur: alius molliter prius suducenda, tum sanguis pro redundantia, semel v partile, pro viribus redundantis mittendus, atque ad hoc vernum tempus est commodissimum: mox autumnale, si differre licet.

Si plenæ sunt venæ, ex hæmorrhoidibus vel me-

fin

his tardantibus, vena circum malleolos vel appendz: vel loca illa scarificanda: prius ex vena he-
rica satis copioso sanguine pro viribus exhausto,
in tempore, repletionis modo & consuetudine.
Si circum vesicam plenitudo grauet, pleni ex ci-
modico esse videntur, inflationes ventris virget,
pallor totius corporis, somni graues, vrina li-
, & vix erumpens, naturalia tument. Prophyla-
: vrinam cientibus opus est, videlicet, radicibus
iculi, apii, rusci, asparagi, in vino albo odorato
teratis, & diluto ex his, duobus cyathis poto, ma-
liebus singulis: vel aqua helenii, smyrnii, dauci,
mista.

*Repletio
vesicae.*

*Hac de plenitudine partium publicarum eiusq;
Prophylactica.*

in corporis habitus tantum repleatur, exercita-
es, frictiones, vnctiones, balnea repletionem
debunt.

*Hactenus de particulari repletionem, sequitur
corpora totius.*

corpus totum repletum fuerit, predicta omnia *Repletio
totius cor-
poris.*
benda, a ventre sumto initio.
plenitudo totius est duplex, vel qualitatibus tem-
ata, vel intemperata. Temperata quantitate tan-
molesta est, & vacuationem tantum postulat.
emperata duplex est, vel tanta vr in ventrem *Tempera-
ta.*
urgitet, vel constans. Regurgitantis signa: Somno
, grauitas capitis, & palpebrarum.
egurgitans est duplex: doloris immunis, vel do- *Regurgi-
tans.*
lassi particeps.
doloris immunis gradus habet duos: Primi gra- *Doloris
immunis,*
signa: nares citra manifestam causam imple-
a coena: & quamuis repletae videntur, nihil ta-
emungunt, aut spuunt: & progressu temporis,
febras graues habent, & pruritus frontem occu-

pat, & a cibis abstinere, & bibere minus possunt, & habitus tandem fit decolor: atque hæc signa gradus primi sunt. Gradus secundi, somni longi ac dulces, interdum etiam dormiunt: post, somni accidunt iniucundi, & perturbantur, & cum aliquo videntur rixari.

Cura utriusque communis.

Exercitatum consuetis exercitiis citra lassitudinem, calidæ lotum, cibis omnigenis expleto: & vomere facito: a vomitu os, & fauces vino austero abluant, & postquam quieverint, loco tepido deambulent, atque hæc die primo.

Postridie, deambulationibus utatur, & exercitiis reliquis detrahatur aliquid. Sin æstas sit, ne prandeat, reliquis anni temporibus parum quid in prandio in coena dimidium consueti cibi detrahatur.

Tertio & quarto, exerceat se more consueto: & alimenta sint liberaliora quam die secundo.

Quinto vomat, & cibo utatur consueto: reliquis diebus cibis parcius, labor atque exercitatio copiosior, atque nisi hac arte repletio cessauerit, cum diebus duobus se largiter inuitauerit, repetatur, etiam si opus est tertietur.

Gradus secundus postulat longius tempus, & faciem maiorem.

Sequitur doloris lassitudinis plenitudo particeps.

*Doloris
lassitudinis
particeps.*

Plenitudo doloris lassitudinis particeps duplex est: vna toto corpore æquabiliter dolente, vel capite præter partes ceteras.

Cura communis.

Mollibus fomentis utendum & vntionibus, vnde multa aquæ calidæ lotionem, vomendum & his, & bi sensim adhibendi, leues ac molles: etiam matutina deambulationes crescentes.

Cura propria æquabiliter lassitudinis: A multis ingratissimis cibis, primum acerbis, deinde salis, probe vomere

maior

ant: quo facto exsurgant: & modice deambulent
tempore: deinde dormiant. Mane sensim crescant
ambulationes, & deinceps multę sint, & attenua-
sit multa.

Vbi caput præter ceteras partes dolet, palpebrę a
ena concidunt, & in somnis turbantur: videntur
terdum calidiores: alius aliquando sistitur: a ve-
ris vsu statim leuiiores videntur sibi, postque ma-
grauantur.

Cura duplex: Celerior & tardior.

Celerior: ex veratro vomat, deinde sensim exhi-
endi cibi leues, molles, ac aluum mouentes, ad di-
decem: & cursibus tardis ac matutinis, & deam-
bulationibus citra defatigationem vtendum.

Prandeat, & a prandio somnus leuis: a cœna ex-
ergere satis erit, venere abstineat: atque hæc cele-
rior cura est.

Tardior quatuor fere hebdomadis absoluitur.
prima hebdomade, ante diem septimum multa ca-
lotus & cibis dulcibus, ac salsis expletus, vome-
re contendat, statim quiescat, sequentibus diebus
ne, tam deambulationes, quam exercitia reli-
qua, paulatim augeantur atq; etiam cibi.

Secundę septimanę die primo, vomat vt prius,
m quiescat, postremo sensim exerceatur, & dein-
ps ad quatuor septimanas sensim, & laborum &
porum, adiectio fiat: atque tum, (expletis qua-
or hebdomadis) dięta ad consuetum morem pau-
tim redigenda.

Sequitur repletio in ventrem regurgitans.

Hic venter grauatur, estque duplex: vel recepta
reliquum corpus regurgitat, vel nunquã recepta.
Receptę signa ructus acidus, receptę gradus sunt
quo: Primo gradu ructus acidus a cibo, color im-
mutatus.

*Repletio
in ventrē
regurgi-
tans.
Recepta.*

Secundo gradu, rufus acidus die sequente.

Cura communis est utrique, nisi quod in secundo gradu pluribus est opus exercitiis. Cura duplex: velocior, tardior. Velocior fit hellebori pharmaco modo prædicto. Tardior, calida totus die primo, secundo vomat, septimis diebus sequentibus victu consueto vtatur.

Tertio die vigesimo denuo vomat, deinde cibi vtatur cōsuetis ad diem trigesimum, ac nisi tum curatur, eadem ratio quarto repetatur. Cursibus vtatur circularibus, paucis ac velocibus motibus parum calefaciētibus, frictione copiosa ac diuturna, & post exercitium vnctio: Deambulatio multa mane at exercitiis reliquis & a cœna. Omnis laboriosa, balneum calidum ieiunus, & cœnam exspectet.

Hac de cura plenitudinis regurgitantis admissæ, sequitur nunquam admissa.

*Nunquam
recepta.*

Estque duplex: in prima flatus ieiunum infestat magis magisque, & a cibo meliuscule habere videtur, ac tandem diarrhœæ, ac dysenterix metus inuadit.

Prima.

Cura: die primo, ad decimum cibo detrahendū prandium intermittendo, & cœnæ partem tertiam demendo, labores augendi, cursus, iusta, deambulatio ante exercitia, reliqua mane, & post exercitia gymnastica.

Die decimo, ad decimum quartum: dimidium cibi in cœna ablati, addatur, vomat: atque hac diata quadriduum vtatur.

Decimoquarto, ad vigesimum: reliquum cibi, quod ablatum fuerat, restituatur: iterum vomat, ac pluribus laboribus, & exercitiis vtatur.

Secunda.

Secunda.

Signa: vomitus, dolor tamen ventris nullo: decoloratur: suffocatur: & inualefcit malum donec euomuerit, atque huic repletionis generi maxime densi corporibus obnoxii sunt.

Cura:

Cura: cibis utatur acerbis, ac siccis, austere, & oratis: & per urinam ducentibus: atque prandio nitus abstineat: & exercitatio adhibeatur multa in superiores, quam inferiores partes exercens: &icans.

Deambulatio esto multa ab exercitio, pomeriana, item a cœna, & matutina, vocis exercitatio una.

Decem primis diebus tertia cibi pars subtrahatur: quatuor tantum partes dentur: & duæ auferantur. A decimo, ad decimum sextum, addatur dimidium subtracti cibi, vna sexta, ut quinque partes consueti prius cibi sumat, ac die decimo sexto, vomat, a 16. post vomitum, usque ad vigesimum, quatuor tantum partes adhibeantur. Die tandem vigesimo (qui decimus est a vomitu) redeat ad consuetam vivendi rationem, exercitiis tamen multis & duribus quam pro ciborum ratione. Hactenus de pletione temperata: sequitur intemperata.

Hic qualitatis pariter alteratione opus est, cum quantitatis diminutione.

Intemperata est duplex: frigida vel calida, frigida signa: egestio alui cruda: Cura: acria salsa.

Intemperata.

Frigida est duplex: simplex, composita. Frigida simplex signa, ructus die sequente a sumto cibo

Frigida.

oparent: Parcior est egestio, quam pro ingestorum

Simplex.

opia: venter doloris expers tamen. Cura: panis synomistus, fermentatus, intritus in vino nigro, aut

re carnis suillæ, pisces cocti in acri muria: carnes

suillæ bene coctæ, porcellorum, catulorum, hædom parcius. Ficus cum cibis reliquis, & vini meraci

o ipsis potio, olera acria, vel reliqua correpta minus

acria.

Somni longi dieb. primis, ante exercitia gymnastica: ante meridiem, & prandio abstineant, & post

meridiem ubi se gymnastica exercuerint, ante cœnam indormiant.

Exercitationes autem siue cursus reflexus, sensim increfcens.

Lucta vncta: mollis, vnctio multa. Deambulatio matutina multa, ante coenam pauca.

*Hac de simplici, sequuntur composita,
frigida, humida.*

Composita.

Signa: Corpus attenuatur tandem, digestio frigida, humida, liquidaque, nec venter dolens.

Cura. Alimenti pars tertia auferatur, id est, quatuor partes edat, duas omittat. Prandio abstineat prorsus, panis ex tota farina, clybano coctus, calidus in vino astringente, & meraco tinctus. Pisces elixentur cum muria: assentur cum aceto: & ex horum partibus, dorsum, & cauda, sunt aptissima. Carnes omnes condiantur sale, vel aceto, ex quadrupedibus, canina assa: ex volatilibus: palumbes, & similes, tam assa quā elixa: Vinum nigrum, astringens. Exercitationes, deambulationes matutinæ, & vespertinæ, & vtrisque super dormiat. Cursus sint curui, sensim augescentes, frictio & vnctio multa.

Frigida sicca.

Primis decem diebus cibi pars quarta auferatur, reliquis diebus sensim ad consuetum reducat. Panis purus, furnarius, obsonia dulcia, pisces cocti cum intritis, carnes suillæ coctæ, extremitates bene coctæ: pleraque assa, vux, & ficus copiosæ cum reliquis cibis, vinum mustum, expers austeritatis. Prandeat parce: Exercitiis vtatur frequentibus, sint autem cursus curui, sensim crescentes, ad extremum item circulares post cursum, lucta cum oleo matutina. Deambulatio copiosa, post exercitia non multa, a coena, tantum exsurgat: ab exercitiis, balnea calida, somnus multus, stragulis mollibus, veneri his interdum indulgendum.

*Hac de frigida intemperata, sequitur intemperata.
Calida.*

Hic

Hic frigefaciendum, pariter ac vacuandum. *Ca Calida.*
a est, vel calida humida, vel calida sicca.

Calidæ humidæ signa: alius excernit liquida, & *Cal hu-*
mida cocta sine dolore: si conuenientibus exercitiis *mida.*
antur, sin vero his abstineant, dolor, labor, & cibi
ridium. Dixta frigida humida sit.

Primis decem diebus exercitiorum dimidium au-
tatur, & alimentorum dematur pars tertia, maza
tatur non recenti vino dulci emollita, pisces esto
cissimi: cocti absque oleo, & sale. Carnesque vo-
rum assæ: perdicis, & galli, absque condimento,
porina esto reliquarum ferarum in aqua cocta, o-
ta refrigerantia, beta cocta cum aceto potus, ac
um nigrum, austerum. Exercitia: cursus circula-
s concitati, frictio pauca, lucta pauca, acrocheris-
us, chironomia, corychoniachia, volutatio in pul-
re quatuor hæc moderate: Deambulatio ab exer-
tio moderato, vt respondeat laboribus, maiore a-
ena quā cibus postulat vtatur, matutina, quæ cor-
oris habitui conueniat. Balneum tepidum, & post
sum, quies, post dies decem, vomere studeat, cor-
ore prius sequenti ratione præparato.

Alimentorum prius ablatorum dimidia, exerci-
orum pars tertia: vtrobiq; vna sexta eius qua sa-
us vti consueuerat addatur.

Cibi autem sint sicci, & austeri, ac primis statim
ebus quibus talibus cibis vti cœperit, vomat: post
omitum per dies quatuor, cibo, & exercitio parti-
o, vtatur parcior.

Vigesimo die aduentante, cibo ac potui, addatur
quod ablatum fuerat, sed exercitiis non item, vini
quantum cum sanus esset, bibere consueuerat: inde
omat, post vomitum, cœna contentus sit, dum
onualuerit.

*Hæc de repletionē calida humida, sequitur
calida sicca.*

Cal. sicca.

Signa: dum incipit: fæces alui sicca, vtræ, os siccū, ac tandem amarum, alui, & vrinae supprimuntur.

Cura: refrigerandum, & humectandum: cœna, prandioque vitatur. Cibi, maza non recepta, respersa, panis ex tritico trimestri, sive furfurum fermentatus. Potus: vinum aquosum ac lenē, olera quæuis cocta præter æria: pisces lenissimi, omnis generis cocti, carnes suillæ, & earundem extremitates anteriores coctæ, hœdina, agnina, vitulina coctæ: fructus humectantes post reliquos cibos, ex leguminibus: ciceres virides, aut aqua macerati. Labores sint pauci & quieti, deambulatio mane ab exercitio, balneis vratur. Somnus nocturnus esto levis, diurnus a prandio brevis. Primis diebus dimidia pars exercitiorum dematur, atq; corpore prius cibis dulcibus, pinguibus, salis, copiosis preparato plurimis diebus, vomat post vomitum sensim per dies tres cibus exhibeatur, moderatus, decimo die, exercitia augeantur, & si adhuc signa adfuerint repletionis, vomitum repetat: sin minus, in præscripta victus ratione pergat dum confirmatur.

Hac de repletionē.

Inedia.

Si quibus de causis inedia futura sit, labor omnis tum est vitandus.

Qui fame laborant, refouendi pulegio odorato, & pane recenti naribus admoto, & admota carne suilla affata, aut elixa, & panis vino diluto intinctus offerendus, & oua sorbilia, ac iuscula liquida paulatim, & crebro offerenda: & cibi omnes liquidi, euechymi, & concoctu faciles.

Si quis aquam frigidam vel vinum, aut potum consuetum, a balneo, vel cursu, aut vehementi exercitatione liberalius, & confertim potauerit, huic sanguis protinus mittendus est.

Cui aquam corruptam bibendi necessitas incumbit, huic coquenda est cum feniculo, aut pulegio:
vasis

vasis figlinis & sub dio tenenda ac frigefacienda, & tum denuo calefacta sumenda.

In peregrinationibus aut exercitu, fossæ faciendæ sunt, ab altissimis locis ad declives, per quas duenda est aqua in totas fossas: terra dulci immissa, & pingui, si aqua nitrosa sit: ibi hebetantes sumendi, & pinguiore. Aluminolum vinum tenue: crassum, allium, cepe, & omnia urinam ducentia corrigunt.

Hirudo si forte pota fuerit, quod exsuctione peripitur) muria absorpta excutietur, si faucibus hæreat, lupinorum farina iniiciatur, & aqua frigida ore contineatur.

Si qua suspicio veneni cibus admisti fuerit, vitetur condita omnia, & intenso sapore dulcia, salsa, *Suspicio veneni sumti.* vel acida, vel quouis alio sapore, insignia, nec sitibundi affatim bibere, aut esurientes voraciter comesse conuenit: & semper ad omnium saporem est attendendum, & maxime potu frigida aqua præsumenda, vel optimum erit alexipharmacorum aliquid præsumere, cuiusmodi sunt caricæ cum iuglandium nucleis & seminis napi cum vino drachma vna, vel rutæ folia cum iuglandibus, & præter cetera omnia, Andromachi theriaca ex vino.

Vbi vero quis degere cogatur locis venenatis animalculis obnoxiiis: culina apparetur sub dio, & sub dio cibi, ac potus condantur.

Si sub tecto apparetur: laquearia diligenter animaduertenda, præcipue vasa vinaria, & lactis omnia. Vbi suspicio fuerit sumti iam veneni: sine mora cadidum oleum ex aqua, aut seorsim sumatur, & vomere conetur: vel olei loco butyrumumat ex aqua calida cum malua, semine lini, vrticæ, fœnigræci, &c. Cumque vomitus diligenter citatus fuerit, ne quid restet in ventre, intestinis hæretes reliquiæ elysere acri deuocentur, iuuat & nitrum tritum su-

90 DE SANIT. TVENDA PARS I.

mere cum hydromelite, & vina vetera liberalius pota, siciuscula gallinacea, pingues pisces, & carnes vetustæ, & pingues, adipe aut butyro, recenti paratæ. Quinetiam dentur abrotanum, eryngii radix, semen pastinacæ, succus marrubii, betonica, & cetera quæ communi dote aduersus venena profunt: drachmæ pondere ex vino.


*Suspicio
cacochy-
mia.*


Ex cibis corruptis, vel alia ratione qualibet, in cacochymiam si quis inciderit, atque humor crassus, ac lentus sit: incidendus ac tergendus, & corpus totum laxandum, ac faciendum fluidum, & nisi coqui possit humor purgandus. Coquetur autem quod coctioni paret, quiete pro cruditatis ratione ac somno, & cibis, potionibusq; , moderati nutrimenti, & qualitatibus moderatis: vt, ptisanæ cremore, atque ipsa ptisana: mulsa, oxymelite, apomelite, zinzibere, pipere, & similibus cibis inspersis. Ex carnibus: aues montosæ. Ex piscibus, saxatiles. Ex oleribus, lactuca. Panis clybano coctus, fermentatus, modice purus. Potio: oxymeli, mulsa, vinum tenue & album. Deinde (cruditate ablata) sensim ad consuetudinem redeundum.


Sin autem humor coctioni ineptus sit, præparatus (si opus est) prius, purgandus. Bilis, cholagogo vt rhabarbaro, thamarindis, rosarum pallidarum succo, &c.


Pituita, agarico, turbetho, colocynthide, &c. Melancholia, fumaria, senna, helleboro nigro: secundum cacochymici vires, & cacochymix mensuram & diæta tota in contrarium mutanda, dum cacochymia prorsus cessauerit: omnia per quietem, acotium.


F I N I S.















THERAPEVTICA;
Hoc est,
DE SANITATE
RESTITVENDA,
MEDICINÆ
PARS ALTERA:

Auctore
TIMOTHEO BRIGHTO CANTA-
brigiensi, Medicinæ doctore.
*OMNIBVS cuiusvis facultatis studiosis per-
utilis, ac prope necessaria.*



FRANCOFVRTI
Ex Officina Paltheniana, sumtibus hered.
Petri Fischeri & Ionæ Rhodii.


28.





HONORATISSIMO

VIRO DN. GVLIELMO CECILIO,
 Ratlan ordinis, quem vocant, Garterii militi, Ba-
 roni de Burghley, summo Angliæ Thesaurario, &
 Cantabrigiæ Academia Cancellario dignis-
 simo, Thomas Brigthes, Cantabri
 giensis, S. P. D.

 Unum primum in animo haberem (honoratissi-
 me Cecili) Medicinæ artem methodo explica-
 tam in vulgus edere; & quæ apud me priua-
 tim commentatus sum, cum aliis communica-
 re; id simul occurrebat, cuius nomini imprimis
 seruos literarios labores consecrarem: qui & eruditione
 tanta esset, ut de suscepto instituto recte iudicaret; & aucto-
 ritate tantus, ut maledicentium vocibus imperaret. quorum
 alterum pergenti mihi animum daret; alterum, securitatem:
 ut labores mei, ob virtutem, & sapientiam (cui cui nuncu-
 rentur) eidem cultus atq; amoris testimonium exstarent:
 a eadem sapientia, & virtute scripta mea comprobata, ab
 illis avidius expeteretur. Si quid noui, ipso nouitatis nomine
 continuo apud imperitos quorum pars longe maxima existit,
 liosum est, & suspectum habetur: sin vero recte explicatum
 quid sit, id non illi simplices, sed periti ad inuidiam rapiunt,
 dunt, & liuore insectantur. Ergo tu occurrebas (honoratiss-
 im) ex omni nobilitate unus, cui & Mæsa nostra debet istud
 testimonium: & à quo comprobata studia nostra, (quia tanta
 sapientia ei) & presentibus, & posteris, per te futura sint gra-
 ra: tuo nomini cedit nouitatis odium; cedit inuidia calu-
 nia. Atque inuicem tum ex rumore tantum atque homi-
 num vocibus de te existimaram. Cum vero aliunde ex cer-
 ti relatione accepissem, te haud scripturientium libi-

A. 2

4
 dinem probare, librum antequam prae loquatur petere, ve-
 le ante cedere; magnum idcirco testimonium prudentiae tuae
 mihi sperem feci, quod postea coram firmiter cognovi, te vi-
 rum esse cuius iudicio permultum ad scriptorum veterum lau-
 dem, & auctoritatem accedere, ut qui nautarum civilibus
 causis atque reipublicae negotiis, aequitate, ac iustitia praesens,
 omni Philosophia pariter successibus horum aliquid tibi impor-
 tatur: Medicina autem & ad valetudinis curam, & honestum
 animi oblectamentum (magnorum Regum atque Imperatorum
 exemplo, Tiberii, Hadriani, Iuliani, Lyfimachi, Gentii) in-
 stituitur, ut huius facultatis scientia, vel cum ipsius artis Pro-
 fessoribus fere sis comparandus. Quid te solum dico (Clarissi-
 me Cecili) literarum scientia, atque omni Philosophia rerum
 multarum cognitione excellentem? Cuius familia tota docti-
 est, & in ea communis Graecarum literarum (ut olim Cornelia
 Latinarum) & omni humanitatis scientia celeberrima, a
 honorem & amplitudinem tuam praeferquam ex virtute a
 pietate, magnum vita solatium; summum accedit ornamen-
 tum: ut domus Ceciliniana cum ipsis Academicis literarum
 laude contendat. Ecce ergo tibi Medicina nostra incremen-
 tum, honoratiss. Domine, quantum id si requiras, certe omni-
 um morborum communem, dyscrasiam autem, propriam com-
 plexum Therapeiam. Cum vero dyscrasia omnis, vel ex ele-
 mentari qualitate ametra; vel ex venenata contaminata
 riat; utraque a summis ad infima persequi sumus. E.
 Hygieina tenes institutum, quod cum probas (probas autem
 & auctoritate & iudicio) alacrius pergitur, & in eo toti su-
 mus quantum per negotia, reique familiaris curam liceat. U-
 niuersum medicina corpus, & ad sanitatem, & ad pulcri-
 tudinem omnibus membris conformatum, & ex cultum, Ce-
 ciliani auspiciis in lucem, atque hominum conspectum produ-
 catur. Quod autem concisis partibus edimus, hanc fabrica to-
 ta, dabis occupationibus. Interea dum totum absoverimus
 tibi magni voti reos nosmet habemus. In Therapeutica hac
 quemadmodum in Hygieina fecimus, a magni nominis au-
 thoribus cogimur dissentire; atque adeo in reliquis dissentie-
 mus

ut: diffensionis autem causas Scholii quas in hac, & in ce-
 a meditatur, aliquando dicemus. Interea leges illa ma-
 ie, atq; forma artium omnium; veritatis, iustitia, sapien-
 , methodi, in es erimen (si quod commissum sit) id omne in
 er recipient. Proponimus nobis artem secundum illas leges
 cribendam; hanc si minus assequimur, saltem sequimur;
 alio persequendi auctores sumus. Mihi autem vel operis
 um esse satis erit. Superfunt adhuc morbi conformationis
 nes, & omniū composita Therapeia. Conformationis mor-
 certis obstructionibus acceptis) fere (chirurgici sunt. Ex-
 etabis ergo a nobis in posterum (sapientissime Cecile) The-
 eiam Chirurgicam, cum illarum obstructionum morbis,
 e Physicis remediis parent, atq; reliquorum omnium cons-
 itam Therapeiam. Interea conatus hosce nostros, & tam-
 am solidi corporis umbram (ut facis) boni consule. Addo-
 us aliquando soliditatem, nervos, succum, sanguinem &
 rem Alii vero nec ipsi occupati, nec honesti otiosi (si tan-
 a seipsis impetrare queant) probis aliquando abstineāt,
 , desinant maledicere. Deus Ecclesia sua, & Reipub. An-
 ana bono, amplitudinem tuam in vita tueatur, & labo-
 us exantlatis, fatig; perfunctum in aeternas beatorum se-
 suscipiat. Cantabrigia, ex aedibus meis 14. Martii, 1582.

Amplitudinis tuæ
 studiosissimus,

TIMOTHEVS
 BRIGHTVS.

A 1

In secundam Medicinæ par-
tem D. TIMOTHEI
BRIGHTI. •

*Nuper adumbratos Medicinæ vidimus
artus,*

*Qualis Apellea pingitur arte Venus:
At deerat pectus; pectus quoq; BRIGHTI
dedisti,*

*Cultaq; cincinnis est Θεραπεία tuis.
Adde pedes reliquis supremæque robor
membris,*

Principiis fines; & Dea qualis erit?

ΕΙΣ ΟΝΟΜΑ ΤΟ ΤΟΥ ΕΥΜΕΘΟΥ
δικαστή του Ἰατροῦ τῆ Τιμωθεου Βείχτου,
Ἐτ' ἐπὶ λαμπροῦ δίσκῳ.

Οὐ τὸδε μαψιδίως λάχες ὄνομα· ἐστὶ
γὰρ αὐτὸς
Λαμπρὸν ἐν Ἰησοῖς φῶς μετ' ὁδοῦ
φέρων.


MEDI.

MEDICINÆ THE-
RAPEVTICÆ PARS, DE
DYSCRASIA CORPORIS
humani;

Auctore

TIMOTHEO BRIGHTO D.
Medico Cantabrigiensi.

Therapeutica.



Therapeutica, est secunda pars Medicinæ de sanitate restituenda.

*Therapen-
tices defi-
nitio.*

Sanitatis restitutio fit ametriarum correctione.

Ametria, est vitium partium sanitatem constituentium.

Ametria.

Ametriæ corriguntur remediis.

Remedium est therapæiæ opus ametriam expu-
nare affectum. Excipe quibus vires prorsus succu-
unt; nec ad integram therapæiæ historiam recrea-
queant.

Remediū.

His manus abstinenda, atq. mors ipsa prædicēda.

Virium

Signum vero huius imbecillitatis est pulsuum ad
phygmiā præceps declinatio.

*prostrata-
rum signa*

Deficiunt autem vires prostratæ duobus modis:
el Dissipatæ, vel Suffocatæ.

*Prostratæ
vires duo-*

Si vires dissipantur, pulsus declinantes eduntur
intra inæqualitatem.

*bus modis
deficiunt.*

Dissipantur vires dupliciter: vel sensim, vel repēte.

Dissipatæ.

Sensim.

Sensim dissipata hanc pulsum seriem, edunt
languidum, paruum, rarum, tardum, si nullus a
subsit; si quis autem sit, crebrum, atq. vehementem
deinde myurum reciprocum, reciprocum deficientem,
myurum non reciprocum, formicantem, abo-
litum apparentem, atq. tandem vere abolitum.

Repente.

Sin vero repente vires deficient, talem pulsum
seriem obtinent: languidum, paruum, crebrum, ce-
lerem, vndosum, vermiculantē: formicantem, abo-
litum apparentem, atq. tandem vere abolitum.

*Atq. virium dissipatarum pulsus ita habent: suffoca-
ta sequentem seriem ostendunt.*

*Vel suffo-
cata.*

Languidum, tardum, rarum, & continuo inequa-
lem; nunc languidū, nunc vehementem, nunc par-
uum, nunc magnum, nunc celerem, illico tardum
crebrum statim autem rarum: & quo plures sunt
magni, vehementes, &c. eo minus vires pressas os-
tendunt. Vbi autem magis adhuc pressæ suffocantur
intercurrentem, intermittentem in pulsum mul-
titudine (quæq. intermissio diuturnior, eo pericu-
losior existit. Diuturna autem est, quæ duos pulsus
excedit. Iuuenibus periculosissima pulsum inter-
missio; minus pueris, minime senibus; nec iuueni-
bus admodum, quibus ea intermissio familiaris. At-
que intermissio si diu perseueret, repentina mors
expectanda.)

(intermittenti vicina est quies externa diutur-
na, in qua pulsus citra inæqualitatem existit: inter-
mittens inæqualitatem obtinet) tum intermitten-
tem in vno pulsu (ex quo genere sunt capricans &
dicrotus) tum vndosum, vermiculātem, formican-
tem, (atque si arteria dura est, nec vndosus, nec ver-
miculans esse queunt) tum myurum in vna disten-
sione reciprocum, tum non reciprocum, ultimo de-
ficientem, non reciprocum.

Pulsus

MEDICINÆ, PARS II.

9

Pulsus omnes hi, si ordinati etiā sint, certissimum
crimen minantur.

Atq; hac virium desperatarum signa sunt:

atq; Anomalia communis:

Remedii partes sunt duæ: Agendi vis contraria: *Remedii*
huius recta committendi ratio. *partes*

Agendi vis contraria ex duobus cōsistit: Ex qua- *dua.*

te contraria: Et copię, siue quantitatis paritate. *I. Agendi*

Agendi vis cōtraria duplex existit: Homoiome- *vis cōtra-*
rel Anomoiomera. *ria ex qua*

Homoiomera est item duplex: Phsyica, vel Chi- *litate con-*
gica. *traria.*

Phsyica est, quæ naturæ viribus infertur. *Homoi-*

Phsyica est vel Diætetica; vel Pharmaceutica. *mera.*

Diætetica est, quæ ex diætā petitur.

Pharmaceutica est, quæ pharmaco infertur.

Pharmacum est natura, extra diætā posita. *Pharma-*

Pharmacum ad partes internas, qualitatem de- *cum.*

teriam haud obtineat, & ad omnes partes quibus
operetur, quantum eius natura ferat, esto sympathet-
icum: ad viscera autem adhibitum, roborans, &
restrictionis particeps, maxime ventriculo labo-
rante.

Porro consistentiam habeat proprias vires tuen-
dam, quoad partis affectū conformatio id ferat: &
cum fieri potest gratum id esto, vel saltem haud
nimis ingratum. Medendo autem, in eodem
manere, per varia pharmaca euagari licet; atq; quod
maxime convenire compertum est, id sedulo vsur-
pandum.

Pharmacum est duplex: Naturale vel Artificiale. *Natura-*

Naturale est tale, quale natura editur vsurpatum: vt *ls.*

Opauca, bolus armena, rosa, &c.

Artificiale, est arte confectum, vt Syrupus, Empla- *Artifi-*

stium, Cataplasma, &c.

cialē.

Hactenus vis physica.

Chirurgica est, quæ manus opera fit, vel instrumento chirurgico: vt trepano, glasscomto, nouacula, &c.

Vu homoiomera ita habet: sequitur

Anomoiomera.

Anomoiomera. Anomoiomera, est ex homoiometis inter se mixtis.

Anomoiomera est duplex: vel ex physica mixta physicis; vel physica chirurgica.

Physica physicis, vt diata & pharmaco.

Physica mixta chirurgica, est vel alterutra principalis, vel subsidiaria.

Physica mixta chirurgica, est porro duplex: alterutra Physica, vel vtraque.

*Hactenus qualitas contraria; sequitur
quantitatis paritas.*

Agendi vis ex quantitate paritate. Quantitas par, est a metrix vehementiæ æqualis. Vehementia percipitur ex symptomatum magnitudine: hæc autem, ex ipsis cum pistrinis actionibus operibus, & corporis qualitatibus comparatis.

Atq; hic, morbus corpori, vel corporis parti valde dissentiens, remedii vim eo fortiolem postulat, & quantitate auctiorem.

*Vu contraria ita se habet: sequitur recta
committendi ratio.*

II. Recta committendi ratio. Recta committendi ratio in duobus consistit: in aditus commodi delectu; & virium dosi.

Aditus commodus. Aditus commodus est in ametriam directus: quoniam nisi natura detur, neque res aliter expediri queat arte paretur, siue pharmaco, siue instrumento Chirurgico.

Aditus si longus sit, medicamenti consistentia eo liquidior esto: atque si opus est, adiunctum habeat vehiculum, naturæ tenuitate præditum: vt vinum, acetum, &c.

Aditus autem in partes natura directi, tales sunt in ce-

tebrum, sinciput, coronalis sutura, aures, nares.
Pulmones, latera, interna & thoracem : Ore
autem hausta, vel sensim lambendo deglutita.

ventriculum, iecur, lientem, adnota e regio-
in ventrem sumta.

renes : extrinsecus adhibita, sumta, & subdita
eodem.

intestina superna, os, inferna, sedes.

vesicam, & uterum : e regione applicato, assum-
missa.

Aditus delectus talis esto : sequitur

Dosis.

Dosis est quatum semel agrotus, vel pars agrota *Dosis vi-*
ficari sustineat : siue loco, siue viribus ; siue quod *rium.*
estum est.

icurationis atque creationis ametriarum, pa-
tempora sunt nisi admodum leues eę sint : tum
q. cito tolli poterunt.

Dosis duplex est : Conferta, vel partita.

Conferta dosis omnem ametriam, vel maximam *Conferta.*
partem tollit : Estque ametria acuta : & virium
mistarum.

Partita dosis, partem tantum ametria tollit. est- *Partita.*

ametriatum, viriumque contrario sese modo
sentium : atque initio maior : dosis, atque validior
Et prior dosis, ubi partes suas egerit, altera ap-
anda : eaque toties repetenda, dum tota ame-
cuanuerit.

Hec de Dosi.

ametria, si vel sede vel natura obscura sint, pri- *Ametria*
in exploranda. *exploran-*

sedes ex propria functione laesa deprehenditur. *da.*

ametria natura ex functionis specie laesa & hu-
ad dendi ratione. Hæc tamen si adhuc obscura
res permittenda naturæ, quæ recta diata adhibita

rem prodet tandem: sin minus; ad experientiam analogismum est perfugiendum.

Ametria, est vel simplex; vel composita.

*Ametria
simplex.*

Simplex Ametria, simplici remedio expugnabitur.

Ametria simplex duas obtinet species: Solitaria vel caussis forata.

*Eaq; Soli-
ria vel
Causa
forata.*

Solitaria ametria, remedio solitario est expugnanda.

Causis forata, remedium postulat, & has foveas extirpans: atque in foris, à causis foveantibus extirpandis therapie initium esto; & qua sese intulerint serie (si plures eæ sint) eadem auferantur. Excipit quid gravius urgeat; tum huic prorsus (ceteris inter ea haud neglectis) studendum.

Urget autem gravissime primum quod egrotum in maximum vite discrimen perducit: cuiusmodi virium iactura, & harum labentium causæ: ut *visus: functio præstans laesa*. Tum de quo maxime ægrotus quaeritur: ut *dolor, aestus, &c.*

*Ametri-
arum au-
ctores ex-
pugnanda,
qua
sunt*

Ametriarum auctores expugnandæ: sunt vel primæ; vel à primis.

Primæ, aliarum auctores existunt. Atq; hæc primæ quoquo tempore sunt auferendæ.

Prima causa est vel diæta error; vel temere corpori irruens.

Prima

vel

*A primis
orta.*

A primis sunt internæ, atque corpori inherentes. Hæ, quatenus ametriarum auctores sunt, catenim emendandæ, viribus ægroti prospectis, & minimè molestia.

*A primis
artarū di-
visio in o-
pera pra-*

A primis sunt vel opera prava: vel temere irruentium partes, & reliquæ corpori inhærentes: ut *spicula, ramenta, &c.* Opera prava sunt vel ratione tantum vel toto genere.

*na:
Ratione
tantum.*

Ratione tantum prava sunt vel qualitate, vel quantitate.

Quali-

Qualitate praua, secundum hanc ipsam sunt e-
 menda. Qualita-
te.

Qualitate praua, sunt vel elementari talia, vel ve-
 mentari.

Elementari praua, sunt elementaribus corri-
 tari. Elemen-
tari.

Sunt autem praua vel primis qualitatibus: vel à
 is ortis.

Calido,	{ Calida, frigidis Frigida, cal- du Humida, siccu Sicca, humidu	{ sunt corrig. vi:	Viola, Rosis, &c.
Frigido,			Chamamelo, &c.
Humi- do,			Brassica Beta, etc.
Sicco,			Bugloss. Malua, &c.

primis peccant tenuitate, crassitie, duritie, len-
 acrimonia.

tenuie, in crassantibus corrigatur: cuiusmodi sunt
 da, vel temperata, citra acrimoniam: vt lactuca,

um, tragacantha, &c. Crassum attenuantibus, cu-
 modi sunt secundo, aut tertio recessu calida, vel

da tenuis materiæ: Calida, vt apium, feniculum, Elemen-
tariis vitij
emenda-
tio.

celinum; Frigida: acetum, succus aranciorum, limo-
 &c. Durum molliatur ex naturis moderate,

supra secundum gradum calidis, & humore ac-
 refertis: vt oleo maturo, adipe temperati animalis,

entum tergeatur siccis naturis mediæ substan-
 cuiusmodi detergentia fere amara sunt omnia,

Calida, siue frigida, siue calida. Frigida, vt cichori-
 amne intybi genus, &c. Calida, absinthium, aristolo-
 centaurium, &c.

cre mitigetur frigidis mediæ substantiæ, & au-
 tate præditis: vel aciditatis; vt ribibus, oxyacantha

, mal' granati succo, &c.

Elementaris vitij emendatio ita habet; se-
 quitur venenati correctio.

Venenata qualitas alexiteriis, & alexipharmacis Venenata.

est corrigenda: ut succo mali punici, medici, citrei, & nono, siordio, gentiana, &c.

Atque operis qualitate peccantia ita corrigenda.

Quantitate. Quantitate peccantia, eadem fere aucta tantum peccant: excepto sanguine, qui etiam defectu care queat.

Sanguinis defectus. Sanguinis autem defectus cibis euchymis, iulis, vini potione, moderata exercitatione, & hiis tate reparandus.

Redundantia. Redundantia est vel succorum, vel excrementorum.

Succorum Succorum vniuersalis est.

Hæc valde lacerans, quo tempore natura con-
insurgit, quod vigore ametrix fit, minime tenenda; sed naturæ permittenda, nisi imperfecte moritur: tum namq. eius conatibus est succurrendum.

Excipe cum præceps admodum redundantia tum minime cunctandum, neq. naturæ motus spectandus, sed ipso initio redundantia vis frenanda.

Crisis. In ipso naturæ congressu, & summo certamine quæ *Crisis* dicitur, vehementissime corpus turbatur solet, & ægrotus multo peius sibi videtur habere pulsus inæquales, delirium, vigilia, inquietudo, difficultas anhelitus, difficilis sensus, &c. inuadunt inopina actionum multarum deprauatio, quæ tamen ipso vigore concoctionis signis apparentibus terroris plus habent quam periculi.

Hanc naturæ luctam excretio manifesta, vel accessus solent excipere: sine quibus virium imbecillitas, causæ vim lethalem monstrat.

Excretionis futura signum. Excretionis autem futuræ, rigor præcedens est, & penitus, argumentum est.

Excretio si vomitu futura est, præcedit oris ventriculi morsus, capitis dolor vertiginosus, & renobrosa oculis obuersantia, saliuæ multa, & iam ad saliuam

vomitu, labri inferioris tremor, & agitatio.

Si autem sudore, (vrina, atq; aluo, à rigore sup-
erficis) calidus vapor repente exhalans, pulsu inter-
mittendo, atq; molli.

Si vero nec vomitus, nec sudores succedant, al-
loluta expectanda.

Si crisi vero, si ægrotus melius sese habet, vrinis
non nec multis, nec copiosam hypostasim habentibus,
nec morbo sensim declinante, abscessus ex-
tendendus.

Abscessus

Si autem abscessus vel in partes superiores, vel
inferiores.

*Abscessus
in parti-*

abscessum in partibus superioribus futurum spi-
ritus difficultas incipiens; mox autem definens, ar-
gumento est.

*bus supe-
rioribus*

circum caput autem fieri, huius dolor, grauitas,
tor, surditas, argumenta sunt.

*et inferio-
ribus si-
gna.*

Si autem horum nihil apparuerit, sed grauitas,
tor, tensio, vel inflammatio circa infernas corpe-
partes apparuerint, partibus imis abscessus ex-
tendendi.

Adouere autem critice solet natura, dierum qua-
ternionibus. Validissime & optimis ægroti rebus in
quaternione, qui ab antecedente quarto nume-
ro septimum attingit; præsertim tum ametria in
re existente. Atque tum quarti velitatio, talis
q. huius motus est ante septimum, illius index
ex coctionis signa manifesta præbet.

*Natura
critice
mouet di-
erum qua-
ternioni-
bus.*

quaterniones certis periodis continentur.

Periodus est tempus sex quaternionum.

Periodus.

Periodi primus atque tertius quaternio, perfecti
reliqui, imperfecti; & ex præcedenti sumentes
in nem.

Periodi partes sunt duæ.

Periodi

prima pars est à primo quaternione ad quartum.

*partes
duæ.*

secunda est à quarto ad sextum.

Prima. Prima pars in duo membra diffunditur: prima pars intra primum quaternionem: secunda, intra secundum.

Secunda. Periodi secunda pars, duo item membra habet: prima pars est intra secundum & quartum quaternionem: secunda est intra quartum quaternionem & sextum.

Periodorum dua Periodorum duæ sunt species:

species. Prima est ad diem vigesimum.

Prima. Secunda est à vigesima ad quadragesimam.

Prima. Prima periodo mota natura quaternionibus acutissime stimuletur: idque dupliciter.

Peracute: vel remissius.

Peracute dupliciter: Exquisite, vel haud ita.

Exquisite intra primum quaternionem.

Haud exquisite intra secundum quaternionem.

Remissius stimuletur duos gradus obtinet.

Primo gradu stimuletur inter secundum & quartum quaternionem.

Secundo gradu inter quartum & sextum.

Prima periodi index. Primæ periodi index optimus est vndecimus, decimus septimus, ultimo quartus.

Prima periodi index. Critici optimi sunt: primum septimus, tum decimus quartus, ultimo vigesimus.

Secunda. Secunda periodo, lente admodum stimuletur indicat natura.

Huius vero quaterniones sunt; 24. 27. 31. 34. 37. 40.

Huius ordinis anomalia oritur ex humoris accessibus: & vehementia. Atque tum naturæ motus in alios dies confertur: nisi accessus dies cum quaternione conspiret.

Hic crises fiunt difficiliore: præsertim si alii accessus die contingant.

Accessus. Accessus fiunt, vel diebus paribus, vel imparibus.

Pate

Pares dies extra consuetum naturæ motum sunt. *Pares dies*
 cuius hic index quartus esse poterit) 8. 10. 12. 16.
 28. 30.

Inter pares dies 18 saluberrime fiunt crises: Infe-
 ter autem hac serie. 6. 8. 10. 12. 16.

Impares dies sunt. 3. 5. 9. (qui & *intercalares* nomi- *Impare*
 tur) 13. 19. 21. *dies.*

Ex imparibus felicissimi sunt. 9. 5. 3.

Infelicissimus 19 minus 13.

Hac de Criticis.

Uniuersalis redundantia, ex fontibus hauriatur: *Redundā-*
 initia; quo tempore melius sese habet ægrotus: *tia uni-*
 piose, præsertim pruriente, turgenteq. materia. *uersalis.*

Utamen in raris, macilentis, valde obesis, ætate
 illa, temperamentis, calidis & humidis, prægnā-
 tis præsertim octauo aut nono mense tempesta-
 gerente, vel nimium corpus densante, res tem-
 anda.

Uniuersalis plenitudo est æquabilis: vel inæqua-

quabilis plenitudo (natura meatibus confe- *Æqua-*
 te) vnde libet vacuari poterit. *bilis.*

Æquabilis vacuetur ex parte dissitissima ei, in *Inæqua-*
 in inæquabiliter redundat. *bilis.*

Æquabilis est vel mouens, vel quieta.

Mouens ipsius motus initio refrænetur.

Quieta est vel libera, vel impacta.

Libera, a parte vicina est vacuanda: atq; talis ra- *Libera.*

tio deriuatio dicitur.

Impacta sit, eodem loci est liberanda:

Impacta.

Uniuersalis redundantia duplex est: plethora, vel
 thymia.

Plethora est uniuersalis redundantia sanguinis. *Plethora.*

Thymiam (ubi ametriam committit) paribus

vis natura vacuare solet: idq; naribus, vel men-

te, vel hæmorrhoides.

Si nares affectat, oculis splendores obuersantur, hebetescunt, lacrymantur, rubent, malæ rubicundæ fiunt, & nares rubræ: hypochondria tendunt absq; dolore, spirandi difficultas premit; caput dolor distendens, atque pulsans afficit: & iam fluxus procinctu, narium pruritus.

Menstruis fluxuris præcedit lumborum tensio, grauitas, dolor, in mulieribus præsertim, si alia nulla signa dederit: & consueto tempore menstrua hæc fiant.

Si loca circum anum tumuerint, cum dolore, & que alia signa sese proderint, & certis temporibus consuetæ sint, hæmorrhoides expectandæ.

Sanguini deplendo commodissimum tempus optio datur) Luna in Ariete, Sagittario, Cancro, Bra, Scorpione, Aquario, Piscibus: nisi si Luna in aliquo signorum parti dominetur, vt in Ariete, capiti: Tauro, ceruicibus: Geminis, humeris & brachijs: Cancro pectori, stomacho, costis: Leone cordi, atque dorso: Virgine ventri, atque intestinis: Libra, rebus, vmbilici regioni, atque natibus: Scorpione pedibus: Sagittario, femoribus: Capricorno, genibus: Aquario, tibiis: Piscibus, pedibus.

A lunæ coitu, ad quadrangulum, incrementi ætate: A quadrangulo ad diametrum, mediæ ætatis hominibus: A diametro ad alterum quadrangulum, declinantibus: Ab eo quadrangulo ad extremum, senibus aptissimum tempus sanguinem mittere. Si ignauus sit egrotus, recreetur frigida aspersione, vel aromate naribus adinoto. Si sanguinis cursu deficiat, in dorsum decumbat, vel vomitu excitetur, hora vna, qui altera a sanguine misso, & boni succi aliquid sumat, & promte alentis, morbus sinat.

Plethoræ vacationem (si morbus dat induci) præcedat lenis alui subductio, vel clystere, vel phlegmaceo blando.

Plethora omnis commodissime ex basilica va-
tur.

Plethora duplex est: { ad vasa, vel
ad vires.

*Plethora
duplex.
Ad vasa.*

Si sanguis ad vasa redundet, corporis atque faciei,
color rubicundior apparet: ab exercitatione, venæ
modum turgent, & arteriæ valde pulsant: sudor
facile erumpit: Lassitudo tensiva premit, atque
corpus, & artus præ pondere mouentur: ma-
in pugnum haud facile adducitur: respiratio
cilior, atque crebrior, præsertim ab exercitatio-
atque si redundantia sanguinis ametriam com-
erit, eiusmodi signa præcesserunt.

Si sanguis ad vasa redundat, copiose profundi
erit, & quantum vires ferant fortasse nostratibus
locri mensurâ, ab vnc. 6. ad vnc. 10. Maxima, ab
12. ad 18.

Ad vires plethora est, vbi vires premantur. Hic *Ad vires.*

corpus, & artus ingrauescunt, & motus pigrior eua-
somnus grauis est, profundus, & interturbatus.
torans per insomnia grauitè premi se, aut onus
are, aut loco moueri se non posse putat: atq. hæc
nia ne venis plenis, neque distentis ametriam
eiusmodi plethora commissam præcedunt. In
sanguinis vacuatio parcior esto: atq; dum ple-
dinis metus cesset, sinatur fluere.

sanguis inæquabiliter redundans, mobilis sit, at-
iam mouens: (secta prius basilica) alia distan-
na secetur: rectitudine venarum semper obser-
foramine exiguo, nisi præceps fluxus sit, & par-
bili minetur. Tum namq; ampla vena, loco fi-
ono secetur. Atq; vbi ob virium imbecillitatem,
ita missio vsui fuerit, eodem die festinanter ite-
la vacuatio.

euellit autem vena humeraria a partibus supra *Reuulsio*
es: celerius in cubito: tardius in ramo inter pol- *phlogist.*

licem, & indicem. Interior vena reuellit a partibus intra claues, & renes: tardius in vena inter annularem, & minimum digitum.

Vna media ex vtriusque reuellit.

Poplitis vena reuellit ex partibus subter renes lentius secta malleoli vena.

Renes ancipites sunt.

Atque sanguinis reuulsio, phlebotomia ita habet.

Phlebotomia.

A capite vero deriuant scapularum atque humerorum scarificatus: iniecit cucurbitulæ, sanguinis fluxus è naribus, arteriæ pone aures: secta iugulares.

Priores capitis partes, frontis vena deriuat: posteriores, cucurbitulæ ceruici iniecit, atque humeris, vel incisa puppis vena.

Oculos, venæ in alterutrum angulum latæ.

Aures, vena sub aures.

Os, ea quæ sub labiis.

Fauces, quæ sub lingua.

Pulmonem, interior cubiti sinistri vena: eadem quæ a corde deriuat.

A thorace, interior vena cubiti, lateris eiusdem.

A iecore, interior dextera.

A liene, interior sinistra.

Ab utero, vena poplitis.

Atque sanguinis deriuatio ita fit.

Sanguinis in pus mutatio.

Si impactus sanguis sit, primum in pus immutatus, eodem loci vacuetur: suppurato (nisi sponte fiat) vel ferro, vel igni, vel medicamento rupto: vel diaphoretica exsucto. In pus autem mutabitur modice, atque temperate calidis applicatis, & humidis emplasticis: ut pulle ex farina triticea, addito butyro, & ouo vitello, &c.

Sanguine in pus cōuerso sine scalpello. Sue canaliculum

um, siue pharmacum causticum, ei parti appli-
ur, quæ mollior digito cedit, magis acuminatur,
ua commodius sanies effluat.

Scalpro res tranſigenda, & pars pro libidine cõ. *Scalprũ.*
anti nequit, etiam aduersa parte vulnus inferen-
Vulnus simplex aliquando ſufficit parte decli-
uplici aliquando, & trigono opus est.

cauterio vtendum ex ſubere, mollibus corpo- *Cauteriũ.*
is conueniet. Ex metallicis, aurum est clemen-
tissimum.

erro, vel igni vtendo, vasa insignia, neruus, ten-
vinculum, vel neruosum quid, cuiusmodi est, la-
tendo, cauenda, nec vnquam articulus vrendus.
cutis cui eiusmodi subiecta sunt, prius est ap-
mendenda, ne subiecta conuulnerentur.

um in profundo sanies refederit in musculis, ſi-
um interstitia cultello ligneo, vel digito didu-
da, ne fibræ præcidantur. Et locis quibus plurime
currunt arteriæ, paruo vulnere contentus ſis.

orro partes acuti ſensus nec ferrum, nec ignem
inent; præſertim autẽ oculi cauteria refugiunt.
occipitio, temporibus, & vbicunque caluaria
ellior est, & vbi vel exitus neruorum, vel aditus
orum est, cauteria periculosa.

exteriore humeri parte tendo, ignem, ferrum ve
id ſuſtinet.

in cranii fracturis, vbi modioli, cycliſcis, terebel-
ria puri ſit: a ſuturis, neruorum radicibus, mol-
li oſſe, ferrum declinandum.

bi ad colli latera aperiendum: a carotide arte-
vena ſphagitide, neruo vocali abſtinendum.

in empyicis, & deploratis pleuriticis, ſcalprum,
cauterium, inferiore parte meſopleuri collo-
ndum.

in extremis ilibus, tendines, atque vaſorum coi-
cauendi: item quod in podice neruaceum, &

partes genitales: Inprimis autem nerui (maxime qui sub natibus) ne nudari frigore violentur, prouidendum.

Rectum autem, transuersum, vel obliquum, vulnus esse debeat, partis figura, flexus, rugæ, fibrae indicant.

In collo, qua parte progrediuntur vena, arteria, neruus, rectum magis quam aduersum adigatur: reliqui melius transuersum.

In fronte e rugis transuersum sit, nec ita profundum.

In inguinibus, e flexu transuerso ducitur, duplex interim, angustum, & in myrti folium oblongum.

In ventre, nisi prohibeant flexus secundum fibrae musculorum, vt etiam in reliquis.

Atque si vel ferro, vel igni opus est, ita res transigenda.

Ferro vel igne quo modores transigenda.

Sin vero patiens mollis vtrumque refugiat, caustico, vel septico pharmaco res expedienda: a quibus minus doloris percipitur, si pars ante laxante remedio foueatur. Ab eis autem applicatis continuo folium ex lenientibus superponendum, vel splenium epiceraustico illitum.

Sin vero dolor ingens ex pharmaco oriatur, statim eodem reuulso, dolor liniendus, & mitius agendum.

Ruptoria.

Ruptoria autem eadem quantitate applicentur, qua vulneris magnitudinem esse cupis.

Petantur ruptoria ex naturis summo excessu calidis, vel naturæ proprietate talibus: vt Theriaca, urtica semen, e vino tritum, caulium radices vsta, trita, & arungia vetere excepta: arsenicum, mercurius sublimatus, quibus habita ratione corporum, & vomicarum prudenter vtendum: excipiantur autem butyro, arungia, terebinthina, visco, &c.

Hallernus

Hactenus Plethora. sequitur Cacoehymia.

Cacoehymia est redundantia ex alio humore *Cacoehy-*
im ex sanguine. *mia.*

Cacoehymia est pharmaco cathartico expur-
anda.

In cacoehymia purganda minus virium requiri-
quam in sanguinis missione.

Cacoehymia purgatur pharmaco, vel vomitorio, *Pharma-*
deiectionario. Pharmaco vomitorio, *cum vo-*
ut seminibus ra- *miterum.*
nis, a drach. 3 ad unc. 3 pulvere radicum asari a drach. 3.

Scrup. 4. Hellebori albi fibris raphano transfixo maceratis, a
p. 1. ad scrup. 2. arboris uglandis iulis a dr. 3 ad dr. 1 & o.

Vomitorium esto mellitum & haustu liquoris sa-
largo ebibitum, & calore tepidum.

Vomitorium autem imperetur materia ad sto-
machum obrepente, & egroto ad vomendum apto.
perreptare solet humor astate.

Ad vomendum apti sunt, quibus nec pres- *Ad vomē*
sio, nec angustum pectus, nec cervix gracilis, aut *dum qui*
longa, nec tabidi sunt, nec asthmatici, neque pri- *sint apti.*
viorum dolore laborant.

Vomiturus si agere vomat, cibum præsumat, &
et cibum pharmacum vomitorium.

Post haustum pharmacum corpus agitatione at-
que motu turbet: & ubi nausea vrget, prono se situ
loquet. firmato capite & ventriculo manu circum-
datus: & vomitorii imperu sedato, aceto odorato, vel
dulcolente grato recreetur.

Ex iecore, aut liene cursus in aluum vomitione
cellitur.

Atque vomitus ita instituitur.

Purgando autem humor noxius, nunquam in af- *Vomitur*
fectam sedem est deriuandus. *instituen-*

Circa ventrem imum extenuatis macilentis, a- *di ratio.*
liore sensu præditis, vehementer purgationes ca-
venda.

Purgandus, loco temperato contineatur.

Pharmaco deiectorio (si optio datur) aptissimum tempus, Luna in Geminis: in Cancro: in Scorpio: ne: in Piscibus: Hora vero commodissima matutina.

Ante pharmacum, (si dura sit alvus) clyster inieciatur molliens. Austrino statu felices succedunt purgationes.

Vbi incognita sit laborantis natura, blando pharmaco sensim exploranda.

Cacochymia interdum præparationem postulat: ergo vbi ametria accelerare haud postulat; quæ crassitie impedit, incidendum atque tenuandum. Quod lentum, tergendum, quod acre, atq. feruens mitigandum, denique pori, atque meatus laxandi circum viscera foci adhibendi, & corpus fluidum habendum.

Quibus deiectorio purgandis ventriculus imbecillior, nausea abundans existit, pharmacum consistens in terra solidum esto.

Vbi pharmaco valido opus est, detur ieiuno: ventriculo tamen adhuc ciborum reliquiis madente.

Si pharmacum imbecillius sit: purum inueniatur ventriculo.

Si cui cõsuetudine est matutina vomitio, ea ante sumtum pharmacum cienda.

Hausto medicamento, vel aqua hordei, vel succo punici, vel vino austero, vel saccharo, reliquæ fauces, & gulæ sunt deiciendæ: præsertim si sapor in gratus offendant.

Corpus autem post surrectum, semihoræ spatio in quiete tenendum.

Si post sumtum pharmacum, inexpugnabilis sompnus sit, vtile foret medicamento indormire: cum autem purgare cõperit, dum compleuerit est vigilandum.

Cum prorsus e ventriculo exierit, vt nullus eius

ne odor, nec sapor, nec ructus, aut nausea, aut eructatio, sublit, cibus offerri poterit: excidit autem ventriculo quatuor post horis; cibus vero offerendus est sorbitio detergens. Vomitionem deiectio re-
sistit.

Cacochymia est vel simplex, vel composita.

Simplex est, cum vnus aliquis humor præter san-
guinem redundat.

*Cacochy-
mia sim-
plex.*

Cacochymia simplex, est vel ex calido humore
frigido Calido ex bile.

Bilis redundantis signa sunt: faciei, oculorum, atque Bilis re-
corporis color pallidus, flauus, aut citrinus, & ictericus; dundantis
na flammea, acris, & pauci sedimenti: vigilia, vel signa
in leues.

Bilem natura solet imparibus diebus excernere.

Bilis, si acris sit, ante purgationem, epicrasticis
mitiganda. Purganda autem colaphygis; vt ex

uralibus, rhabarbaro per se a drach. 1.ß ad drach.
luto. ad drach 3. Dacrydio a granis 5. ad scrup. 2.

lia ab vnc ß ad vnc 1.ß. Manna ab vnc 1. ad vnc. 3.

phoenice, ab vnc 1. ad vnc 3, vel 4. Aloe, a drach.

drachm. 2. Ex artificialibus Syrupo rosaceo, ab

2. ad vnc. 4. Diapruno simplici, ab vnc. 1. ad vnc.

Composito a drach. 3. ad drach. 5. vel 6. Electua-

de succo rosarum a drach. 2. ad drach. 5. Pilulis

eret, & de fumaria, a scrup. 2. ad vnc 1.ß.

Atque ita bilis expurganda.

frigidi humores interdum sunt incidendi, atte-

ndi detergendi, antequam expurgentur.

rigidos humores paribus diebus natura solet

ernere, & si superent secundam periodum, fere

cessibus sese exonerare.

rigidi humores sunt vel Pituita, vel Melancho-

Pituita redundantis signa sunt.

*Pituita
redundan-
tia signa.*

Faciei atque corporis color albicans, interdum
viduus ac plumbeus, moles corporis ampla, & obel-
mollis, contactu frigida: Vrina pallida, alba, nui-
rensis, nunc crassa cum multo sedimento, somnus
profundus. Atque hæc omnia pariter aquosi humo-
ris signa esse poterunt.

Pituita phlegmaphygis est expellenda: vt ex na-
turalibus, agarico trito a drach. 1. ad drach. 2. infuso
a drach. 2. ad drach. 4. vel 5. Colocynthide a scrup.
ad scrup. 2. Turbith, a drach. 1. ad drach. 1. ̄. Lathyr-
de, a granis 4. ad 7. vel 8. Euphorbio annotino, a gra-
nis 6. ad 12. Tithymallorum foliis torrefactis, a scrup.
pul. 2. ad drach. 1.

Ex artificialibus, hiera picra Galeni putata, a drach.
3. ad drach. 5. electuarii forma: in puluere autem
drach. 2. ad vnc. ̄. Hiera Archigenis, a drach. 1. ad drach.
2. Pilulis mastichinis, de turbith, stomachicis, &c.
drach. 1. ad drach. 1. ̄.

Atq; pituita ita expurganda, sequitur Melancholia.

*Melan-
cholia re-
dundan-
tia signa.*

Huius redundantis signa sunt: faciei, atque te-
tius corporis color fuscus, obscurus aut nigricans
interdum vniuersus, & æquabilis, interdum, max-
lis quibusdam inustis Vrina tenuis, alba, atq; si omnis
melancholiæ excernitur, crassa, atque atra, liuida
aut virescens. Somnus turbulentus, & horrendis in-
somnia turbatus.

Melancholia maiorem incisionem, quam pituita
postulat, & melanophygis est exigenda: vt ex natu-
ra editis: helleboro nigro a scrup. 2. ad drach. 1. scilicet
in puluere, drach. 1. decocto, vnc. ̄. vel drach. 5. Poly-
podio, a drach. 2. ad drach. 6. maceratis, decoctis &
expressis. Epithymo, a drach. 2. ad vnc. ̄. vel drach. 4.
Lapide armenio loto drach. 1. vel drach. 2. non loto
a drach. ̄. ad drach. 1. ̄. Lapide Cyaneo, paulo minore
quantitate. Ex artificialibus, Diasenna Nicolai ab
vnc. ̄. ad drach. 6. &c.

Hallianus

Haec sunt simplex Cacochymia, sequitur composita.

*Cacochy-
mia com-
posita.*

Composita Cacochymia est, cum varii humores
undant: atq; tum ligna eduntur composita.
Composita cacochymia potissimum artificialia
pulat.

Composita duplex est: vel cum aliqui humores,
cum omnes redundant.

*Composita
duplex.*

Cum aliqui tantum redundant, fit redundantia
ile, cum pituita, vel bile cum melancholia, vel
nita cum melancholia.

*I. Cum a-
liquis hu-
mores re-
dundant.*

ilis cum pituita, redundans, vacuanda Diaphœ-
one, Indo maiore: Benedicta, a drach. 3 ad drach.

aphœnico ab vnc. β. ad dr. 6 pilulis aggregatis,
oribus, sine quibus, Cocciis, a scrup. 2. ad drac. 1.

ilis, cum melancholia redundans, expurganda
uario de psyllio, a drach. 6. ad drach. 10. &c.

pituita cum melancholia. Diasenna Rasis ab vnc.
drach. 6. Pilulis Indis: Haly a scrup. 2. ad drach. 1.

drach. 1. β.
bi omnes humores redundant, pharmaco ca-

*II. Cum
omnes re-
dundant.*

lico opus est: ut catholicone ipso, ab vnc. 1. ad
1 β. Confectione Hamech ab vnc. β. ad drach. 6.

ra Logadion, a drach. 1. ad drach. 2.
lenitudo autem cacochymica, si inæquabilis sit,

um reuellenda purgatione, (si mobilis ea sit) &
ngentibus repellenda.

excipe cum venenatum quid sit, vel si in adenes,
munctoria fluxus fiat: vel cum metus sit re-

itationis in partem nobilem: tum namque fo-
apienda.

n quieta sit, atq; libera, vicinus locus sumatur,
missa vniuersali purgatione.

n impacta sit (quod crassæ pituitæ, & melan-
æ proprium est) locus scarificandus, cucurbitu-

affigendæ, & hirudines applicandæ: vel phar-
bo digerente, atq; discutiente res transigenda.

*Hactenus redundantia, vel Plethorica vel Caco-chymica
sequitur utriusq; (& Plethora, & Caco-
chymia) particeps.*

*Redundā
tia pletho
ra & ca-
cochymia
particeps.*

Redundantia utriusque particeps signa edit ut
que propria: atque tam phlebotomiam, quam pu
gationem postulat: semper a Phlebotomia inui
vacuationis sumto: atque quo sanguis impuri
eo sanguinis vacuatio parcius esto, si humor rodē
& acris, ventriculum infestet: hic prius expurgat
us, atque tum sanguis mittendus.

Biliosam plethoram imparibus diebus natura
mouet.

Biliosa, ex dextra hauriatur: atque tutissime ve
na secta tollitur, & sectionem exilem postulat.

Pituitosam plenitudinem & melancholicam, pa
ribus natura mouet: & nisi bilis mixta quid habe
ant vel multitudine, & copia, valde lacescant, reli
quias abscessibus purgantur.

Melancholica plethora, secundum biliosam tu
tissime vena secta tollitur, & amplam sectionem
postulat. Pituitosa vero minime tuto tollitur, atque
parcam admodum vacuationem admittit.

Plethora caco-chymica laborantibus (quoniam
fere vires his infirmæ sint) phlebotomia ex modico
intervallis partienda, vel vinculo dissoluto, vel vul
neri digito indito, dum vires restaurantur: & si dum
vacuas, vires deficient (quod ex pulsu percipietur)
& si quid superuacui restet, cessandum. Interdum
hora una, interdum pluribus ad virium restauratio
nem opus est. Optimum haud ultra diem differre
atque bis die (si vires sinant) mittere conuenit, po
tiusquam in sequentem differre. Sin autem vires
ita infirmæ sint, ut sanguinis missionē haud omni
no ferant: boni succi cibis reparandæ primum, et
tum vacuandum. Vbi vero iterare phlebotomiam
conuenit, in rectum sectio fiat.

Phlebo-

phlebotomiz vicem supplere poterunt cucurbi-
feruente, vel hirudines, vbi vires phlebotomiam
sufficiant.

*Hactenus redundantia succorum, sequitur Ex-
crementorum.*

Excrementorum redundantia, particularis tan- *Redundā-*
tum est. *tia excre-*

Ex parte tantum est vacuanda. *mentis.*

Excrementum redundat, vel in propria sede, vel
aliena.

Est item vel vbi publicum excrementum redun-
det vel priuatum.

Redundantia publici excrementi, est vel ex chy- *Red. publi-*
mo excremento, vel chymico. *ci excre-*

Chyloticum excrementum est ecoproticis va- *Excreme-*
ndum: vt aloe, a drach. 1. ad dr. 2. terebinthina a *tum chy-*
ch. 2. ad vnc. 3. maluz, betz, brassica decocto, &c. *loticum.*

De hac paulo ante cibum, vel cum ipso sumi po-
tunt.

Redundantia chymici, est vel ex primario chy- *Chymicū.*
mo vel secundo.

Primarii, est feri vel bilis, vel melancholicę. Serum, *Prima-*
meticis est discernendum: vt apio, foeniculo, pe- *rium.*

linino ex naturalibus. Ex artificialibus, lithon-
io, vel puluere iustini a scrup. 2. ad drach. 2. Oxy-

re diuretico ab vnc. 2. ad vnc. 4.
his hanc detergentibus & aperientibus hepati-

tu eluenda: vt gramine, intyborum generibus,
ago, lupulis, chama dry, &c.
melancholia, splenicis de obstruentibus, vt cassū-
olopendria, corticibus tamarisci, & radicum
arum, &c. Atque nisi tergentia hac rem expe-
rent, a pharmacis catharticiis auxilium est pe-
tendum.

*Hactenus primarij excrementi redundantia, se-
quitur secundarij.*

Secundarium. Secundaria sunt ex succis secundariis: Sunt autem vel sudores, vel insensilis perspiratio.

Sudores. Sudores diaphoreticis moueantur: vt ligno facto, radice falsæ pariliæ, radice chinæ, &c. ab vno decocti, ad vnc. 10. vel amplius pro viribus patienti.

Perspiratio insensilis. Insensilis perspiratio, frictionibus discutienda.

Haftenus redundantia excrementorum ex publica nutrimenti materia, sequitur ex priuata.

Redund. priuati excrementi. Primum Cerebri excrementa, quæ vel errhina vel apophlegmatismis, vel sternutatoriis, vel gargarismatis sunt expurganda.

Errhina. Errhina sunt vel illinenda, vel inspiranda, vel inferenda, ex cyclamine, cucumere, agresti, scammonio colocynthide, &c.

Apophlegmatismata. Apophlegmatismata ad masticandum petantur ex radice pyrethri, oxymelite macerata. Ad gargazandum, ex decocto glycyrrhizæ, pyrethri, saluiæ, betonica, &c. adiecto cathartici conuenienti: vt diapnoenico, &c. Ad illinendum petantur ex aceto, sinapi, melle, &c.

Sternutatoria. Sternutatoria ex hellebori albi, vel euphorbi puluere perexigua quantitate.

Pulmonis excrementa sunt becicis elidenda, vt loch sano depnio, loch de squilla, &c.

Ventriculi, vomitu elicienda materia prius, vt prædictum est, præparata: atque hic vomitoria poterunt esse faciliora quam in cacochymia: vt raphanus ex oxymelite, a triplici decocto, mulsæ potione, &c.

Intestinorum, clysteriis ex decocto conuenienti molliente atq; detergente, adultioribus, a libr. 1. ad lib. 2. duplo cathartico quam ore acceptum (si opus est) admisto: olei vnc. 3. vel. 4. adiectis: nisi vel vermibus intestina laborēt, vel aluus nimis lubrica sit: tum namque oleo est parcendum.

Sin vero balanus satis inuerit: fiat e melle cum sale

ad duritiem cocto adiectis (si opus est) pulueri-
catharticiis. Esto autem balanus 4. vel 5. digitos
superfos longa, minimum digitum crassa.

teri, hyſtericis, clyſteriis, vel peſſis.
uterinis clyſteriis, & liquoris, & cathartico-
rum idium tantum ſumatur.

ſſarium vero eſto quam balanus mole craſſio-
re non longiore.

ſſicæ excrementa ſunt iniectis tergentibus elu-

*Haſtenus ratione quadam peccantia, ſequuntur
toto genere aliena.*

Quod toto genere alienum eſt, id penitus corpo *Peccantia*
extirpandum: & ſi qualitatibus alienum ſit, ſe- *toto gene-*
rum has alterandum. *re.*

Toto genere alienum eſt vel liquidum: vel ſoli-
quid. Quod liquidum eſt: vel ſtatus eſt, vel hu-

ſtatus eſt caleſcientibus & attenuantibus dige- *Flatus.*
ſtus: atque ſi quem habeat ſouentē humorem,
humum eſt purgandus.

Humores toto genere alieni, ſunt ex aliis natura *Humores.*
corruptis: vt atra bilis triplex ex Melancholia, pi-
ſaſa, bile.

ſis vitellina, praſina, arugiſa.

ſituita acida, ſaſa, vitrea.

Solidius quid eſt duplex: vel Animatum vel In-
animatum.

Animatum, vt vermes, dracunculus.

Inanimatum, vt pus ſanguinis grumus, calculi, arenu-
ſi, materia mel, ſeuum pulticulam referens.

*Haſtenus opera praua, ſequuntur temere irru-
entium partes.*

ſe ſi corpori inhæreant, eximantur (ſi opus eſt) *Temere ir-*
namento, eadē qua ingreſſa ſunt via, ſi fieri cō- *ruentium*
partes.

mode queat, si minus (loci natura ferente) in
uersum protrudantur, si acumine ea prædita sit
vel arte via paretur.

*Hæc de causis fouentibus, atque de ametria
causis sunt.*

Ametria Ametria simplex duas obtrinet species: Dyscrasiam, vel disdiaplasticam.

simplicis
duas speci- Dyscrasia curetur remediis contrariis qualitatibus præditis: eisq; tantum physicis.

es.
Dyscrasia Remedia, vel vis, aduersa dyscrasiiis adhibita, pati affectæ quam proxime liceat applicetur.

Dyscrasia Dyscrasia est vel partium aliquarum: vel omnium
diuisio. Est porro vel elementaris, vel venenata.

Dyscrasia causa.

Dyscrasia Causas procatharticas, vel primas, habet dixi
causa. errores, vel temere irruentia, eisdem qualitatibus prædita.

Internas, vel a primis, opera vel qualitate, vel quantitate praua: qualitate per se, quantitate per accidens, vel temere irruentium reliquæ, talibus qualitatibus præditæ.

In dyscrasia curanda, vberius adhibeantur, quæ prophylactica ad sanitatem secundum crasin florentem dicta sunt.

Dyscrasia interna (si ventriculi temperies relictetur) vel viscerum aliquod, præcipue topicis esse alteranda: atq; tum sumendorum vsus mitigandus.

Dyscrasia Dyscrasia elementaris est vel
elementa- { Calida,
ria. Frigida,
Humida,
Sicca.

Calida *Dyscrasia calida signa.*

dyscrasia Corpus solito calidius, iustoque. Si vniuersalis sit
signa. calor, pulsus celerior, & frequentior, atque respira-

tio

similis: si particularis sit, secundum illam partem
pus calidius, & rubicundius.

*Causse prima, atque procathartica dyscrasia
calida.*

Diætæ error calefaciens, vel temere irruens cali *Dyscrasia
calida*

ex diætæ erroribus, motus immoderatus, & labor *causse pri
ma.*

mensus: ut exercitationes, studia, perturbatio-
vehementes, ira, curæ, vigiliæ. Humorū cali-
um excretionēs impeditæ, vel fuliginosorum
crementorum.

ex fomentis, aer æstuans, insolatus, vel ab exerci-
tione & balneis, ambiens nimis frigidum. Cibi
portionis penuria, vel ineratiora hæc atque cali-
a. Aquæ frigida potio ab exercitatione, vel bal-

Antecedentes causse & secundaria.

si vniuersalis dyscrasia sit, cacochymia biliosa, vel *Antece-
dentes &
secundaria.*
anguinis plethorica redundantia: vel in his, quali-
um intensiões. Sin particularis sit, eadem in
tribus feruentes. Porro chyloticum excrementū
mentum, & inaspectabilis perspiratio cohibita, hu-
i causse esse poterunt.

temere irruentia sunt vstiones, vel rei irruentis *Temere
irruentia.*
micula feruida adhuc corpori inhærentes.

Remedium

causse ordine amoueantur. Bilis purgetur (quo *Remediū.*
tu maxime fertur) vomitu, vel secessu. Sin au-
te opera qualitate acrimoniæ, vel feruorem na-
sint, hæc eadem refrigerantibus sunt tempe-
ra.

metria calida est caute alteranda: præsertim v-
ars publica, & ex publicis princeps aliqua labo-
rit cum membrum natura sua frigidum sit, cau-
maxima est adhibenda.

C

Dieta frigida esto, atq; refrigerans, tota & ex liquidis, ac mollibus: ut hordeatum, insula ex pullorum gallinaceorum carne vel similem, lactuca, portulaca, exalide &c. alterata.

Somno indulgendum, nisi viscera calore laborant.

Balneum his conuenit aqua dulcis, & ab eo rationes ex oleo violaceo, vel alio refrigerante si vniuersalis ametria sit. Epithemata partibus principibus Cordi, atq; Hepati adstringentia, Cerebro nequaquam: denique vndique si vniuersalis ametria sit, medicamenta febrilia sunt applicanda: sese ex cessus gradibus. & quantia Viola hordeo, cucurbita, cucumere, nymphaea, portulaca, cicuta, papauere, &c.

Febris.

Ex aliquarum partium calidis dyscrasiis, quae cordis est, Febris dicitur.

Febres inter se complicari solent.

Febris signa.

Febris signa.

Calor molestus, pulsus crebrior, atque celerior, urinae coloratiores; spiritus frequentior atque totius corporis condolentia, nec tamen protaethia subsistens, quae horum symptomatum causa esse poterit.

Causae.

Causae.

Ametria calida auctores vehementiores, corpus petentes.

Therapia omnium febrium communis.

Therapia.

In omnibus febribus dieta esto solito parcius, & tenuans, & ex nutrimentis concoctu facilibus.

In ipsa morbi exacerbatione nullum alimentum praebendum: nisi media vel insignis aliqua vacatio ametriam intulerit: tum namque etiam ipso morbo inuadente aegroti sunt cibandi.

Tenuis autem nutrimenti ordo talis existit: Tenuissimum

simam aqua saccharata, secundum hanc amy-
dalogala, pistina cremor, vel succus mali punici,
cydoni. Tum integri fructus æstivi deuorati,
idem decorticatum, & accurate coctum. *Quarto*
piscis purus, pilces saxatiles, & ex his qui dura carne
præditi. *Ultimo* pulli gallinacei, & agni exte-
rius vinum oligophorum. Nutriendi tempus aptis-
simum, est febris initium, quo & plenius febricitans
pari potest: versus incrementum parcior cibus
est: in statu omnino nullus, nisi vires succumbant;
namque ex tenuissimo sunt reparanda.

Ceterum quacumque hora melius se habuerit ægro-
(quod fere mane est) cibus ei offerendus: atque v-
terius tantum esto ad vires sustentandas: & ho-
rae sanæ cibari erant assueti (modo ægritudo per-
tat) sumatur.

Quo febris vehementior, eo parcior ægroti sunt
cibus, atque celerius: multo magis corio dige-
re, & astate puerili: si tamen vires ferant in sa-
tis vehementibus, cibus per initia omnino cir-
cūcidi potest: a quo initio, tenuis admodum sit,
nim ad statum diminuendo.

Corus in ipso accessus vigore, esto vnus vel alter
stus satis largus.

Febricitantes in luce habendi sunt omnes, (nisi
valde infirmi) & quam maximo concludi cuba-
debent.

quando vires febricitantibus deficient, aere
dulce inspirato, & lullatio aliquo analeptico
teentur.

si febres inter se complicantur, & remedium
applicandum: vrgentioris maxima habita ra-
te.

Atq; hæc febrium communia sunt.

Februm dua sunt species: Sæctica, & Hectica.

Februm

species

dua.

Schetica.

Schetica febris est, quæ extra solidas corporis partes causas fouentes habet.

Scheticam pariunt causas leuiores.

Schetica febris duplex est: vel spiritibus accensis, vel humoribus.

Ephmera.

Spiritus accensi Ephemeram pariunt 24. horarum febrem: quæ interdum diem secundum attingit.

Ephmera signa.

Eius signa.

His suavis adest calor, rara, aut nulla in vno pulsu inæqualitas, eaque admodum obscura. Pulsus magni. Urina haud valde ab similibus sanorum, rufa tamen, facile ægritudinem ferunt, nec vlla tenues vires succumbunt. Vel sudore, vel madore, vel transpirata halituoso solet desinere.

Causa.

Causa.

Procatharticas tantum solent Ephemeræ habere causas, eas tamen (quod solæ sint) tanto vehementiores, frequentius tristitiam, curam, vigilias, lassitudinem, cutem attritam, ex frigore, vel alio quolibet diætæ errore: ut suppressa excrementorum vacuatione.

Remedium.

Remedit.

Aer omnibus Ephemeris, inspiretur frigidiusculus, corpore reliquo operimentis bene contexto, atque haud supra primum gradum refrigerationis tam pharmaceutica, quam diætetica hic usus esto.

In Ephemeræ declinatione, antequam cibis concedatur, corpus molliter fricandum, manibus oleo violaceo recenti, vel loto, perunctis: & nisi inaniro febrem intulerit, & corpus calidum atque licum natura sit, prorsus abstinere satius foret: utque potest die, cum tempus accessionis ita transiit, ut non mouerit, cibis dari poterit. Sin autem ex alto calor

alor venerit, & granitas vel capitis, vel præcordio-
rum sequuta est, quia febris humoralis timeri po-
test, expectandus dies tertius: atque ubi accessio-
nis tempus præterierit, (quia adhuc timor superesse
debet febris humoralis) cibus exiguus dandus: at-
que die quarto (si corpus integrum sit) cum fiducia
ari poterit.

In Ephemerarum statu, largus potus esse poterit
ni oligophori.

Hic Ephemerarum varietas ex causarum proca *Epheme-
rarum va-*
articularum vbertate distinguitur. *rietat quo*

Si fames, vigilia, coitus nimius, vel alia quælibet *modo di-*
nitio febrem intulerit: his pallet facies, & oculi *singua-*
ui fiunt, proprie autem quibus vigilia intulerit, *tur.*

ies subtumida existit, & vix oculorum palpebras *I.*
ollunt, humore quodam imbutas. Atque omnes,

iliis, curis, cogitationibus febricantes, pulsum

gnitudine destituantur: & qui ex tristitia fe-

bricant, his acrimonia potius quam abundantia
oris percipitur.

Remedium.

Statim ipso accessu, ægroti sunt cibandi: maxime
bus corporis temperies, ad calidum, atque sic-
ca vergit: aliter abstinere præstat: & ubi accessio
miserit, in balneum continuo sunt perducendi, &
te oleo largissime perfundi debent: tum mol-
li manu fricari; atque diutissime in calidi solii aqua
curari; & frequentius lauari. Nisi caput dolet, his
tum utile.

Qui ex labore ac lassitudine febricant, cutem *II.*
siccior.

Remedium.

Si sunt multum oleo tepido manu molli frican-

His etiam convenit satis largiter vinum bibere:

ratione virium, ætatis, consuetudinis.

C 3

III.

Qui ex cute astricta febricitant, cutem densam obtinent: & primum tangenti, mitior percipitur calor; post actor: absq; vniuis rufis, absque morborum corporis concidente, vel oculis cauis, aut aridis: & que pulsi hic minores.

Remedium.

Frictio rarefaciens, a balneo aquæ dulcis reperiato adhibeatur: & nisi supra modum refrigerant sint, & corpore pleno: Vinum his conuenit. Sin frigore oriat, & pariter accesserit capitis graues & distillatio, lotiones, & balnea sub finem tantum fiant, his prius concoctis.

IV.

Qui ex aestu febricitant, (quod ex progressu er re percipitur) quamprimum in balneum aquæ dulcis decendi, & multum lauandi, atq; post, oleo violaceo vngendi, & magis lauandi, quam vngendi, frequentius: Et caput perfundendum oleo omycino sine sale, vel rosaceo, violaceo vehementer refrigeratis, & capiti superfusus.

Si cui ex ira contigerit febris: primum ea sedatum in febris declinatione, balneum, vntio, frictio ex oleo violaceo, nenupharino, &c.

*Haec genus febris Ephemera, sequuntur humoralis.**Febris humoralis.*

Humoralis febris est, ex calore humores primus inuadente, atque per eos cordi a metum procurre ante.

*Signa.**Eius signa.*

Hæ calidiores sunt Ephemeres omnes: atque diuturni plurimum: pulsus item ex systole celeri sunt hum inaequales.

*Causæ.**Causæ.*

Causas habent humorales, præter procatharticas, & primas, succorum item vitia, fouentes intestinas, & a primis:

Humoralis

Humoralium commune.

Humoralibus initio, phlebotomia conuenit (*Humora-*
res ferant) alio prius (morbo inducias dante) *Humora-*
stere soluta, eoque horis duabus ante sanguinis *Humora-*
sionem injecto. *Humora-*

Sin autem morbus festinationem postulat, san-
is, vel praterito clystere mittatur.

In humoralibus, ubi status morbi adest, vel im-
net, (quod ex symptomatum incremento perci-
tur) nil vacationum moliendum Si quid tamen
moris expurgandi publicis viis obstat, præpara-
prius, omni morbi tempore, delici poterit.

Humoralis febris est vel sanguinea, vel biliosa.
Sanguinea est, in qua sanguis accenditur: atque Sy-
nchus dicitur.

Synochus unicam accessionem habet.

Synochus

Signa Synochi.

Urinę rubicundę, crassę, pulsus magnus, vehemēs, *Signa.*
enus, nec mollis, nec durus, celer, frequens. Caput
let, fauces rubent, venę extensione laborant: cor-
s mader: fatuitas linguę imponit, vel dulcedo.
ger intumescere se putat, & agte spirat.

Causa.

Sanguis redundans, iustoque calidior.

Causa.

Remedium.

Quantum vires ferant, tantum hic sanguinis va- *Remediū.*
andum: etiam si prius sponte fluxerit, nisi mor-
m exstinxerit, vel saltem diminuerit.

Si natura sponte sua mouerit, quod hic paribus
ebus facere solet, eius motui succurrendum, siue
hæmorrhoidæ, siue a nare siue ab utero, nec nisi
nuius fuerit fluxus obstandum.

Epithemata refrigerantia, in statu tantum, idq;
mcoctionis signis apparentibus, vsurpanda.

Cum evidentes concoctionis notæ apparuerint, nec principem partem inflammatio occupet, nec tumor œdematodes, aut schirrhus, nec partium ternarum imbecillitas vlla, aquam frigidam largiter & audacter propinato, præcipue si ægrotus frigida sit affluet.

*Februm
synochorū
toni.*

Synochi febres tonos obtinent.

Tonus.

Tonus est Synochi febris certa affligendi ratio.

Tonus est duplex: vel Homotonos, vel Ditonus.

*Homoto-
nos.*

Homotonos est, cum equabiliter affligit: eo quod non minus caloris exhalat, quam generatur.

Ditonus est, cum inæquabiliter affligit: eo quod vel plus vel minus exhalat.

Ditonos.

Ditonus est vel Epacmaesticus: vel Paracmaesticus.

*Epacma-
esticus.*

Epacmaesticus, est qui semper inualecendo inæquabiliter affligit: cum plus generatur, quam exhalat.

*Paracma-
esticus.*

Paracmaesticus, est qui continuo decrescendo inæquabiliter affligit, eo quod minus generatur quam exhalet.

*Synochus
mitior.*

Synochus est, vel mitior, vel vehementior.

Mitior est, cum sanguinis pars tenuior accenditur, & Ephemera extensa dicitur.

Ephemera extensa, non raro ante diem quintum indicatur.

Signa.

Signa.

Oritur potissime vere, & autumnus, adolescentibus sanguine multo refertis.

Urinæ sunt similes Ephemeris, & ægroti inflationem percipiunt: hic pulsus inæqualitas est obscura.

Remedium.

Remediū.

Diatæ erroribus cessantibus, intra primum tri-
dium,

am, ad lipothymiam sanguis mittatur: in qua ta-
m lipothymia, agrotus audit, videt, astantes a-
pseit, &c.

Cum optio datur, hora matutina (duabus horis a
phlebotomia) cibetur agrotus, cibus frigidis & hu-
milibus.

Nisi sanguinis missio febrē exstinxerit, aqua fri-
gidissima largissime hauriatur: quod si quid dissuadeat,
solidus aliquis syrupus, ut acetosus, vel violaceus
a frigida dilutus propinetur.

Parcendum hic somno: nisi ubi sanguis primum
missus fuerit: atq; tum (duabus a phlebotomia ho-
ris) somno indulgere poterit agrotus.

*Hactenus Ephemera extensa, siue Synochus mitior,
sequitur vehementior.*

Synochus vehementior est, cum sanguinis tota
massa ferueat.

*Synochus
vehemen-
tior.*

Signa.

Cruditatis nota hic adest in pulsu, ut inæquabili-
tatem manifestior. Et in urinis quæ hic rubræ, turbidæ
existunt. Exspiratio quam inspiratio hic infi-
or: lingua tandem asperior nigricat, & non ni-
maricat: Capitis dolor vehemens, & continuus
ere solet.

Signa:

lic toni sunt euidentiores: & ex tonis, paracma-
haud vacat periculo, mox consistens.

periculosa signa sunt in quiete fatigari, dyspnœa
tum infestari: ventrem inflari atq; rugire: pu-
as nigras, atque liuidas apparere: inuoluntarias
ymas perfundere: a somno laborem sentire:
etiam aere ambiente frigido, admodum vri.

Causa.

sanguis multus, calidior: atq; vehementiore pa-
massa accensus.

Causa:

*Remediū.**Remedium.*

Hic sanguinis minus quam in præcedente va-
andum: & tantum citra hypothymiam est consili-
dum.

Potest in hac & quarto, & septimo, etiam post
primum sanguis mitti.

Si sanguis valde calens sint, (materia copiosa
fuente) lenis purgatio vel clyster purgans ex-
eunt. Sumatur autem pharmacum colaphygu-
luculo post phlebotomiam. Post vero & phlebot-
miam & pharmacum humectanti, atque refrigi-
te, & diæta & medicationi incumbendum, dum di-
decimus quartus aduenerit, atq; tum (morbo a-
tura victo) sensim pleniore victu agrotus refici-
tur, eo tamen solito humidiores, frigidioresq;

*Hæc lenis febris humoralis sanguinea sequitur
biliosa.*

*Febris Bi-
liosa.*

Biliosa febris est ex accensa bile procreata.

*Signa.**Signa*

Pulsus quem in prædictis magis inæquales, & s-
stole multo citatior. Calor mordax & acris, vrin-
valde crudæ.

*Causa.**Causa.*

Biliosa febris habet tam procatharticas causas
quam internam fouentem cacochymiam. Succ-
dit item ab Ephemera, quæ ad integritatem haur-
desierit.

*Biliosa fe-
bris perio-
di.*

Biliosa febris periodos obrinet.

Periodus.

Periodus est febrilis accessus reciprocatio.

Typica.

Periodus est vel stata, ac typica, vel vaga.

Vaga.

Typica est, quæ certas & ordinatas habet recipro-
cationes.

Celer.

Vaga periodus incertas habet.

Stata periodus est vel celer, vel tarda.

Celer est, quæ quotidie affligit ex nouæ materis
generandæ facilitate.

Tarda

Tarda est, quæ extra quotidianam est: ex mate. *Tarda.*
 regeneranda difficultate.

Tarda est vel Tertiaria: vel Quartana.

Tertiaria est, quæ tertio die reciprocatur.

Tertiaria.

Quartana est, quæ quarto reciprocatur: & huius *Quarta-*
 tertio difficillime regeneratur. *na.*

Est porro febrium periodus duplex: vel Remis-

sionis: vel Intermisionis.

Ubi periodus remittit, quam integerrimo cibo *Remit-*
 offerendus. *tentes.*

Remittentes periodi sunt tantum, quib. materia

copiosa, vel crassa. Atque hic copiosior vacuatio

molienda: & victus tenuior imperandus.

Intermittentes periodi sunt ex materia parciore *Intermit-*

non tenuiore. Hic vacuandum parcius, & ipsa *tentes.*

diete, tanto ante accessionem tempore, ut ante i-

am compleri queat.

Intermittentibus periodis, antequam ex toto in-

ter sit agrotus, cibo offerendus; atque is copio-

rior quam in remittentibus. Atq; in his si tarder ac-

cessus longe ab exacerbatione id est, sex vel 8 horis

ante, cibo offerendus: quibus horis agroto vigilan-

dam: sumto autem cibo dormire permittendus.

In intermittentiâ inuasionibus, vomitiones v-

ter mouentur.

Intermittentes periodi, paroxysmum habent fri-

gidum in primo insultu.

Hæc de Periodis.

Biliofæ febres inter se complicantur: interdum

à pluribus: atq; tum accessiones haud pares sunt:

et quæ diebus morbo congruentibus accidunt, ve-

mentiores sunt: ceteræ remissiores. Atq; si am-

intermittant, nulla quies agroto accidit.

Per initia febrium biliosorum, rhabarbarum, &

gingentia, pharmaca sunt vitanda.

*Bilioſa
febris
cauſſa,*

Bilioſa febris eſt vel ex bile flaua, vel atra.
Ex bile flaua eſt, cum hæc febrem accendit.
Cauſſam habet cacochymiam bilioſam.
Hæc colaphygo ducenda.

*Febris bi-
lioſa fla-
ua.*

Febris bilioſa flaua eſt, vel cū bilis ſeſe materi-
foco præbet, vel aliam materiam accendit.
Si bilis foci materia ſit iecori inprimis eſt con-
lendum, quod potiffimum hic infirmatur.

Bilioſæ vbi aliis eiufdē generis implicantur, e-
bus imparibus plus paroxyſmos intendunt, qui
acceſſus fiunt.

Cauſos.

Bilioſæ hæ, ſi haud intermittant, ſed remitte-
tantum, febris cauſos dicitur: magna vehemen-
vrens. In cauſo frigus, rigor, aut horror vbi finitus
eſt: alias raro.

*Cauſſonis
ſigna.*

Cauſſonis ſigna.

Color acerrimus, anxietas, iactatio corporis, v-
lut contracti, lingua arida, ſcabra, citrina, vel nigra
ſitis inexplebilis, *ἀνὸς ἐξία*: circum ventricu-
lum, aut hepar mordicatio, dyspnœa: alui excremen-
ta crocea: vrina tenuis valde: & ad liuidum incli-
nans. Nonnunquam hanc præcedit (quod rarum
eſt) inſignis rigor, valde pungens. Pulſus eſt fre-
quens, velox, & quodammodo durus: Super veni-
unt vigiliæ, aut profundior ſomnus: aut vigilandi
impotentia. Delirium, & ab ea interdum vera phre-
nitis: interdum conuulſio: & cordis agitatio maxi-
ma: tuſſicula, ſudor levis in fronte, & clauiculis: alibi
cutis, valde arida.

Pefſimum ſignum æſtus cui non reſpondet ſitis
vigiliæ iuges, & delirium: color faciei inſigniter im-
mutatus: lentor circa dentes: vomitus, & deiectiones
mere bilioſæ: vrina valde tenuis, cruda, nigra, pauci-
ca, cum aluo aſtriſta: vel aluus nimis lubrica pinguis
excernens. Nares ſanguinis guttas ſillare, illacry-

matio

Spontanea: externis partibus non admodum
e, aut etiam frigere, nec facile pristino calori
ui: aut diebus paribus morbum exacerbari:
septimum diem auriginem apparere, aut suda-
hilominus febre incrementum.

Causse.

Cathartica: ex diata erroribus, quæ vehemen- *Causse.*
e calorem intenderint: in primis potus absti-
per magnos astus.
cedens: vitellina bilis sincera, & retorrída:
in causo, minus ubi tertiana continua (quæ
causo gradu deficit) affligit.

Remedium.

Proti quoad fieri potest, quietem agant. *Remediū.*
tus esto liquidissimus: ut iuscula ex pullo al-
lactuca, oxalide, plantagine, &c. Pruna acido-
Potio larga.
fanguis mox ab initio, citra moram mitta-
iam (prius iniecto clystere) die eodem quo
inuat.
guis mittatur ad euentilationem tantum: &
citra lipothymiam ad vnc. 4. vel libr. ꝑ. Si
anguinis missionem dissuadeat, cucurbitulæ
anificatione applicandæ, vel hirundines affi-
Secundo, leni cholaphygo purgandum: &
oniacis prorsus abstinendum: & modo nil
leat, aquæ frigida potus esto vberimus: Si
ssuadeat, acidus syrupus de limonibus, de a-
ate citri, &c. aqua diluendus, & propinandus,
am necessitate urgente haud negandus pa-
pus.
inante morbo, & statu transacto, epithema-
pentur ex sympatheticis partibus principi-

bus: vel potius capiti raso, thoraci, hypochondrii plantis pedum, pulmones recens macilatorum animalium, aut catelli vel pulli gallinatum aut columbarum, per spinæ longitudinem sectorum admouantur: vel lanæ haplus oleo violaceo tepente inbutus applicetur.

Die septimo peracto, si quæ morbi reliquæ subspectæ fuerint, purgatione sint delinenda: & diaphoreticis, atque diureticis prolicienda.

Si tertiana cōtinua sit, haud tanta vis urget morbi, nec feruor tantus. Ergo tum quarto die medicamentum purgans præberi poterit: & tibi hic poterunt esse frugaliores, quam in causo, tenues tamen omnes.

*In causo symptomata uehementissime assurgere solent,
& medicum poscere: secundum hanc, in
tertiana continua.*

Symptomata tertiana continua.

Sunt autem hæc: imbecillitas, oppressio, tussis, lumborum dolor, cephalalgia, vigilæ, paraplirentis, sitis inexplibilis, linguæ ariditas, nigredo, asperitas fissuræ, lentor dentium, linguæ, palati, cibi fastidium, bulimus, lipothymia, syncope, anguitus, nauæa, vomitus, alui fluxus, aluus adstricta, aurigo, sudor.

Ad imbecillitatem:

Imbecillitas.

Hæc aere frigido, & puro recreetur, & aceti rosæ cel odore.

Ad oppressionem, & hypochondriorum tensionem.

O₁ pressio.

Sedantur hæc citato vomitu, vel purgante medicamento, clystere, potius quam potione, si ex materia copia sit.

Sin vero nimio calore oppressio fiat, aer refrigeretur, & halitu, haud naribus ipsi pueri: ad cordis regionem.

gionem episthemata frigida applicentur: vel po-
s olea refrigerantia, nenupharinum, violaceum,
pauernum, &c.

Ad tussim.

Hypoglottides sub lingua teneantur, ex lenien- *Tussis.*
tibus refrigerante materia, vt ex glycyrrhiza, gum-
mi tragacantha, seminibus frigidis maioribus, &c.

Ad lumborum dolorem.

Lumborum dolor refrigerante linimento est *Lumborū*
curandus, vt refrigerante Galeni, cum succis fri- *dolor.*
dolis.

*Ad Cephalalgiam: hæc frontem & tempora oc-
cupare solet.*

Omnis motus & corporis & animi vitetur, lux & *Cephalal-*
sepius. Vnctiones frigida, atque humide vt popu- *gia.*
lon, &c adhibeantur: & embrocha atque fronta-
les frigida, humidaque materia vsurpentur: &
scurbitula cum multa flamma ad homoplatas, aut
guicis radices affigenda; & frictiones partium
extremarum curanda, & eisdem vincula dolorifica
facienda.

Ad vigilias.

Vigilantibus tenebræ inducenda, & alta quies, at- *Vigilia.*
que altum silentium imperandum: nisi aqua mur-
murante, vel musica leni, vnico sensu occupato, com-
munem consopire consilium sit. Frigida odoran-
tia, & eadem capiti, atq; temporibus capiti appli-
cenda. Si opus est a proprietate hypnotica sumenda
symplo papauerino, nenupharino, de portulaca,
&c. vel medicamentum diacodion quantitate di-
uida cochlearis ore teneatur & exsputum post, re-
tas sumatur dum somnus obrepit, atque tunc quæ

ultimo sumitur, in ventrem illabi sinendū, vel tri-
riaca duorum mensium, quod vnc. i. clysteri indi-
terit, & postea subiici. Porro in partium principu-
emunctoriis, vnctiones refrigerantes applicentur
& ad vasa maiora: item his ipsis irrigationes, & e-
themata adhibenda.

Ad Paraphrenitim.

*Paraphre-
nitim.*

Hic initio refrigerantia, & astringentia applice-
tur: oxyrhodino misto, &c. Et ab his (malo pro-
cedente) capiti raso, recens mastata animalcula app-
centur, & frictiones manuum, ac pedum, & ligat-
ur dolorifica adhibeantur, & continuus aquæ frig-
idæ odoratus esto.

Ad sitim inexplebilem.

*Sitis inex-
plebilis.*

Per nares ægrotus expiret ore clauso, somno
silentio indulgeat, (nisi quid grauius somnum d-
suadeat) & syrupus aliquis acetosus aqua frigida o-
latus propinetur: vel humectans, atque refrigeran-
s ut de portulaca, de cucurbita, &c.

Sin autem sitis mendosa tantum sit, ex pulmo-
æstuante frigidissimus aer inspiretur, & aqua frig-
ida subinde ore teneatur, & cum incaluerit, mut-
etur: vel cerasa sicca, acidula ore mandentur: & sa-
charum crystallinum ore contineatur

Nisi hac arte sitis restringatur, post duas hora-
potus satis largus, & bene refrigeratus haustu m-
gno propinetur.

*Lingua
ariditas,
nigredo,
asperitas,
fissura,*

*Ad lingue, palati, dentium ariditatem, nigredinem,
asperitatem, fissuras, &c.*

*lentor den-
tium, lin-
gua, pala-
ti, &c.*

Liniantur hæc lento, humectante, refrigerante
atque detegente aliquo: ut hordei mundati deco-
cto, cornis prunorum dulcium, cucurbitæ, cum sa-
charo crystallino, penidiis, & succo glycyrrhizæ a-
eclegmatis consistentiam.

Lingu

Lingua decocto hordei frequenter tergeatur, & periore linteo, vel cochleari, diligenter fricetur.

Si fissuræ molesta sint, glutinētur seminibus cydoniorum cum gummi arabico, tragacanthâ, ichthyolla, &c. horum mucilaginis decocto præcedentem maceratis, & dissolutis.

Porro gutturi foris olea humectantia, & refrigerantia, leniter gutturi infundenda ut violaceum, napharinum, &c. Si œsophagus lentor occupet, ex melleo gargarismate ex attenuantibus, & abstergentibus: ut glycyrrhiza, inde, hordeo integro, hysopo, &c. bolis crassioribus de oratis abrasatur: vel lotionem tergente affatim deglutita abstergeatur: ut decocto hordei cum saccharo, & aceto pauco, vel supposito acetoso, &c.

Ad cibum fastidium.

Cibi fastidium.

Acidi intinctus apponantur: & aqua frigida potetur cum titillo aceti: & malum coroneum, vel granatum acidulum edatur. Porro, vari cibi, minores, & liquores aut prædulces, apponantur, & aceto rosato, omphacio, oxalidis vel granatorum succo conantur. Præterea fastidientibus cappeæ conueniunt, salsamenta, oxypora ex lactuca, oxalide, ciclio cum aceto, atq. oleo parcellisimo.

Cibus parce, & raris intervalis sumatur. Atq. nisi ac arte cibi fastidium pelli poterit, (detergis prius intestinis) clysteres nutrientes infundantur: quantitate parca, ad vires & corporis molem, bis, vel tertio die, horis pastui dicatis.

Ad Bulum.

Bulum.

Alimentum valde tenuium partium hic esto: & frequenter acetum, pulegium, mala, pyra, & similes uctus olfiant, & cetera nidore bono plena: ut papas calidas, suillæ carnes assæ, & panis vino intinctus, mendus, vinum ipsum, & aqua sorbilia.

D

*Lypathy-
mia &
syncope.*

Ad lypothymiam, & synopen.

Alimenta omnia sint substantiæ tenuissimæ, & quæ celerrime vires reficiant: ut panis assus, & vinum generoso maceratus, multo saccharo, & vino generoso conditus, oua sorbilia, puliorum gallinæ, eorum testes, gallinæ, aut capri iuuenis decoctum, expressum; panis calentis odor frequentissime ore, & naribus excipiendus. Vinum esto oligophorum.

Corpus oleo rosaceo, myrtino, melino, mastichino, &c. ungendum, subucula rosacea, santalis, camphora, macerata, & post siccata inducenda.

Si autem syncope prehenderit, vinum fuluum subausterum, & vetus propinandum, & frictione extremorum adhibenda.

Singultus

Ad singultum.

Vomitus citetur, & pharmacum cholaphygiū propinetur, & ab eo cremor pristinæ, vel amygdalæ, gala, lac caprinum, vel asininum recens multū sumatur. Si vero ætus vehemens urgeat, quatuor minimū frigidorum maiorum emulsio ex usu erit, nec non theriaca recens, vel philonium Romanum præbenda. Cucurbitula cum multa flamma ad regionem ventriculi applicanda: vincula artubus inducenda, & frictiones dolorificæ usurpandæ.

Ad nauseam ac vomitum.

*Nausea
& vomitus.*

In nausea si quid humoris inesse suspicio fuerit, ipse vomitus est quam primum eliciendus.

Si vomitus nimium laceſſat somnus concilietur, & quies: & acetum rosaceum, vel aliud quid odoratum naribus admoveatur, atq; vomitum stimulant materia clysteriis, & artuum ligationibus reuellatur: pedes & manus in calidam aquam immittantur, & cucurbitulæ ventris regionem suspendantur, quo tempore cibus laboranti offeratur.

Quod si nec ita vomitus sedetur, venter phar-

maco

naco constringente est purgandus: vt diacydonio
axatluo, admittis myrobalanis emblicis vel citri-
is. Post huius purgatori vsum, etiam iam operante
medicamento, aliud cydonium adstringens suma-
ur: additis cornis & prunis syluestribus, vel alio ad-
stringente aliquo.

Aer esto frigidus & siccus, cibi siccantes & adstring-
entes, vt ex amylo, oriza, &c. Lac chalybeatum, &
ex eo polenta cum hordei torrefacti farina. Omnes
carnes succo malorum granatorum, limonū, aran-
corum, &c. cōdiantur. Vinum esto antiquum, sub-
uiderum, aqua chalybeata dilutum. Potus frugalis
sive cibus exiguus, & ex intervallis somnus, actus vel
rigidas, vel calidissimus. Post alios cibos, edantur
adstringentia, vt cydonium coctum, &c.

Ad alui fluxum.

Alui fluxus.

Humoris acrimonia prius epiceraisticis syrupis est
mitiganda: vt violaceo, hordei decocto, lacte amy-
gdalino, itē clysteris epiceraisticis aluus est perfun-
denda: & post catharticum adstringēs ex rhubarbari
infuso est propinandum. Corpore autem purgato,
vesicaphorericis vtendum, & ab his adstringentibus v-
tendum multus est: vt syrupi de ribibus, de cornis &c.
conuenienti liquore diluti: & abdomen oleo cydo-
niorum, myrrino, mastichino, &c. adstringentibus
admisto aceto vngendum. Si opus est clysteres ad-
stringentes iniiciantur, & cucurbitula umbilici re-
gio suspendenda. Hic primi cibi sint adstringentes,
& adstringentes fructus. In primis (aluo nimium pro-
fluente) somno & quieti est indulgendum.

Ad aluum adstrictum.

Aluus

Aluus adstricta glande irriteretur, atq. venter oleis
emollientibus foueatur. Sumantur aut iuncula, quib.
multa borrago, oxalis, portulaca, atriplex, malua in-
coxerint Pruna edatur dulcia, & fructus horarii ma-
guri: post quos aqua pura bibatur. Decubit⁹ supinus

adstricta.

vitetur. Et clyster molliens & tergens ex decocto maluarum, helxines, fursurum, admistis oleis refrigerantibus, vt violaceo, nenupharino, rosaceo, & c. iiciatur.

Antigo.

Ad auriginem.

Balneum extergente materia imperetur atque tenuante: vt, ex bryonia, enula campana, parietaria, fursure, beta, brassica, & c. A balnei egressu, corpus oleo chamamelino vngatur, vel costino, vel iunone, & c. Et frictiones fiant frequentes & molles. Sin vero in venis quid subsit humoris, nec totus in corpore habitum fusus: id primum cholaphygo purgandum, & tum cetera peragenda.

Sudor.

Ad sudorem.

Aer frigidis temperetur: & si opus est, euentilatur. Mollis culcitra detrahenda: & facies posca frequenter inspergenda: portiones sumantur viscerum roboratrices, vt decoctum borraginis, buglossae cum syrupo myrtino, & santalis, & c. vinum cito adstringens, & paucum vt & potio omnis.

Sudor finendus concrefcere nec abstergendus. pannis aqua rosacea, cum santalis, camphora, & madentibus, & gelidis inuoluendum corpus: & tum (si opus est) praesertim ad cor, iecur, thoracis, & que ventris partes, oleo rosaceo, cui pulueris myrtillorum, vel santalorum aliquid admistum sit, iungatur.

Haecenus symptomata, quae in hac febre medicum implorare solent.

*Tertianae
intermit-
tens.*

Sin autem biliosa haec intermittat, tertianam vulgo intermittentem dictam parit.

Intermittentes haec dupliciter complicantur: vt cum eodem die: vel diebus alternis binę accessiones fiunt. Est haec humoralium intermittentium breuissima: septimum accessum non praetergreditur saepe quarto desinit. Et tertio, vel quarto die, vrina incipit un-

incipiunt apparere coctæ. Accessus paroxysmi longissimus est 11 vel 12. horarum: frequentius 5.6.7. vel 8. horarum.

Signa tertianæ intermittentis.

Inuadit cum vehemēti rigore velut acri quadam *Signa eius.* pungente. A quo rigore ardor excitatur acerrimus. Pulsus euadit magnus, vehemens, celer, frequentius, æstuans, & omnis inæquabilitatis præterquã febrilis expers, quæ in vno pulsu deprehenditur.

Causæ.

Causæ.

Hæc easdem habet cum prædicta causas, remissiones tamen.

Remedium.

Remediũ.

Primo die quietis (pro ægroti viribus) ad ventitandum corpus sanguis hauriatur vnc. 6. vel vnc. 8.

Die sequente, multo ante paroxysmum (si tardior is futurus sit, & horis pomeridianis accidat) medicamentum leuiter purgans imperetur, etiam natura sua refrigerandi viribus pollens: vt electuario de psyllio, diadama sceno, cum syrupo refrigerante ex hordei decocto diluto.

Si locus nullus purganti pharmaco die tertio detur, quarto imperetur.

Ceteris diebus, extra paroxysmum, alius tenerima teneatur clysteribus refrigerantibus, humectantibus & mollientibus. Deinceps vero alterationi, & bilis temperationi, est prorsus studendum.

Manifestis signis concoctionis apparentibus, validiore pharmaco est purgandum: etiam adstringentia admittente. Atque tum postea, balneũ calidum adhibendum: videlicet eo die, qui grauissimum paroxysmum sequutus est: quo & salubriter iterari potest. Deinceps vero diureticis, & diaphoreticis sudorificis vtendum.

Eandem ægroto morbo perfuncto: hepar tria-
santalo, vel diarrhodone abbatis firmandum, atque

recreandum est. & deinceps, (certo spatio) dia-
quodam modo est febrilis.

*Hactenus febris biliosa, in qua bili flaua materiam se-
feco praeberet; sequuntur in quibus alios hu-
mores accendit.*

*Febres a-
lius humo-
ribus pra-
terquam
bile ac-
censa.*

Febres hae fere diebus paribus accessus habent
Atque ubi intermittunt, rigor hic nullus, sed potius
horror. Atque abcessibus fere potius quam excretio-
nibus finiuntur.

Longiores sunt praedictis, & ultra 40. diem: atque
accessus ultra duodecim horas habent.

Ubi sui generis febribus implicatur, die pari ma-
xime intenduntur.

Signa

Signa

Hic quam in praedictis minor serior: & pulsu
parus, rarior atque tardior quam in eis.

Causa.

Causa.

Cacochymia composita interna causa existit
vel per se vel ab aliis procathartice mota atque ir-
ritata.

Remedium.

Remedium.

In his diata paulo plenior quam in ceteris esse po-
terit: & plenior in intermittente quam in remitten-
te: & tota morbi historia, contra quam in preceden-
tibus, cibis potu copiosior esto: & ubique attenuans.

Porro in his magis humorum praeparationi, quam
alterationi est incumbendum, & attenuantia refri-
gerantibus semper misceantur; quae in his quam in
praedictis minus frigida esse debent.

Per initia attenuandum, incidendum, coquendum,
aperiendum vehementius: solutius tamen tum le-
niora sint, deinceps fortiora ut scammoniata bene
tamen retusa, quae ex interuallis sunt usurpanda.

Materia si multa sit, manifesta signa concoctionis
haud sint expectanda, sed tum per initia satis vali-
de purgandum.

Signis

Signis vero concoctionis apparentibus, oxymel iurelicum, syrupus de epithymo, oxymel squillitum vsurpentur. &c.

Sanguinis hic parum detrahendum, nec omnino binio, sed præparata materia, & cum urina ruentes, & crassa apparent.

Vena secetur satis amplo foramine, die paroxysmum præcedente. Atq. tum si sanguis tenuis sit, & aquosus, continuo est supprimendus. Quantitas detrahenda, haud iuuicium vnc. 4. excedat.

Item in hisce febribus, a initio, ad vigorem, rebus acerbis est utendum: pipere, sinapi, diatrion piperis, &c. Quarto quoque die.

Vbi signa concoctionis manifesta apparent, balnea, & thermæ vsurpanda, & vomitus pridie accessionis à cena citandus: & stomachus postea, oleo abinthii est inungendus. Postridie detur abinthii coctum decoctum: & ab illo horis duabus ante paroxysmum, drach. 1. vel scrup. 2. veteris theriacæ porrigatur. Deinceps vero diarræica, sudores, viscerum foris, sedulo curandi: nec non antidota ex intervallis danda.

Atq. prædicta communia sunt.

Bilis vel accendit vnum humorem vel plures.

Vbi vnus tantum humor accenditur, exquisita talis dici poterit.

Exquisita febris.

Signa.

Signa.

Hæc ex humoris pariter accensi signis spectanda.

Cacochymia composita duorum accensa.

Humor vnus à bile accensus, est vel Pituita, vel Melancholia.

Ex pituita accensa frequentissime fiunt accessus quotidiani, raro tertiani: quod si contingat, fit tertiana vulgo notha dicta.

Febris pituitosa.

Pituitosa, nocturna fere sunt, & hyemales.

Interdum pituitosa materiam copia, bis die irritantur: paucitate, diebus alternis.

Qui pituitosæ febribus detinentur, humidiores habitu sunt. Pituitosa continua implicata tertiana intermittenti, parit semiterianam. Hæc continua est cum horrore. Et quanquam prioris accessus inter sudores desinat, non tamen intermittebat febris: sed hos altera accessio excipit. Semiteriana hæc, gradus obtrinet. Parua 24. horarum existit; media 36. magna 48. horarum accessum obtrinet.

*Semiter-
nana.*

*Exquisi-
ta.*

*Non ex-
quisita.*

Semiteriana est vel exquisita; vel non exquisita. Exquisita est, cum amba æquipollent. Atque in hac pugna duorum existit: & excretiones febriles tertianæ, retunduntur pituitosæ febris missione; videlicet ex crasso humore genitæ.

Non exquisita est, ubi alterutra vincit: vel bilis, vel pituita.

Si febris tertiana, bilisq. vincat: tota febris fit horridior, & initio rigoris particeps.

Cito mouetur: feruidior existit, & incendii plus habet: & bilis aliquid per vomitum, aut per sedem, aut per sudores excernitur.

Si autem quotidiana vincat: vix horror percipitur, aut ne vix quidem. Pulsus & magis, & diutius comprimuntur: accessio tardius inualescit: ac post longum tempus consistit: non tamen aut sitis magna, aut incendium fatigant: neq. bilis accenditur.

Si amba intermittant, huic similis oritur missio; in qua tamen intermissio existit, & die secunda, horrida apparet quotidiana.

*Epiala
febris.*

Si vitrea pituita sit, quæ accenditur; fit febris epiala dicta.

In epialo ab ægroto continuum frigus percipitur: ab aliis calor; frigus ex fusa materia per sensiles partes corporis habitus.

Accessionem habet epialus à 4. horis ad 24.

Commouetur 3 item 4. die: raro ultra 20. dies extenditur porro quotidiana intermittens interdum tertianæ

tertianæ æmula existit: sed accessiones habet 12. horarum spatio longiores: & nō raro diem integrum perseuerantes; aut etiam excurrentes longius.

Atq. morbus nonnunquam bimestris, trimestris, tiam semestris existit.

Pituitosa signa.

Urinæ albæ, ac tenues, vel crassæ ac turbulentiæ, *Pituitosa*
vel rubicundæ. Vomitus pituitosus: nec sitis inten- *febris si-*
tæ: grauitas totum corpus occupat: soporosi, atq. ve- *gna.*
ternosi sunt.

Pulsus rarus, laxus; facies subliuida, & peponum nodo tumida.

Calor primo occurſu ad manum vaporosus sentitur: sed tandem mordacitas increſcit: atque admodum inæquabilis, ac si per cribrum excolari videatur.

Remedium.

Remediū.

Hic vacationes ultra diem septimum differri queunt.

Iniecto prius clyſtere sanguis mittatur. Tum die postero, propinetur catharticum lene, pituitam bilimistam expurgans.

Post pituita est attenuanda, & humores præparandi vique ad morbi vigorem: syrupo byzantino, acetoso simplici, & xymelite, &c. Et post septimum accessions diem absinthii coma frequenter est propinanda.

Si pituita dulcis accendatur, minor præparatio conuenit quam si acida: atque minor si acida, quam vitrea.

Sin autem sine excretionem insigni, vel abscessu morbus inclinat, medicamentum purgans paretur adstringentia admittens: velut rhabarbarum, myrobalanos, &c. atque ab illo pharmaco; sudores mouendi, ac urinæ.

Si tertianam æmulatur, alternis diebus ægrotus

cibandus; atq. intermissionis die, corpus leniter exercendum. Hic somnus convenientissimus existit: modo nil caput grauet, neq. lassitudinem inferat.

Si febris pituitosa hæc inueterauerit, à cibo interdum vomere, vrilissimum fuerit.

Symptomata hic medicum pascunt.

Symptomata. Ventriculi imbecillitas, syncope, humoralis, sopor, capitis dolor, nausea, vomitus, alui fluxus, frigus, cibi fastidium.

Ventriculi imbecillitas. *Ad ventriculi imbecillitatem.*

Ventriculo præsertim in statu est consulendum roborantibus & siccantibus sympatheticis, vt aromatico rosato, latificante Galeni, &c.

Syncope. *Ad Synopen.*

Purgatio imperetur (prius vno vel altero die materia præparata) ex leuibus phar macis. Materia autem præparanda incidentibus: vt mulla, syrupo acetoso simplici, &c. Ex decocto glycyrrhizæ, hordei integri, &c.

Tertio autem die, copiosius humor est vacuandus ex rhabatbari infuso. Deinceps autem humore magis præparato, rhabatbari substantia sumi poterit.

Porto si materia ventriculū affectat, in primis vomitus est excitandus: & quieti, ac somno multo, talibus indulgendum, loco obscure decumbendum, & frequentes acriusculi clysteres iniiciendi.

Sopor. *Ad Soporem.*

Soporosi excitandi aere calefacto & lucido, corporis agitatione vehementiore, frictione aspera, linteis asperis, & scabro asperso sale, ligaturis dolorificis, pilorum auulsione, clangore, strepitu, odoribus ingratis, & clysteribus valde acris, quibus benedicta, Indum maius, vel trochisci Alandal adiecta sint, cum oleo rutaceo, laurino, &c. Et thymus, pullegium, origanum, & similia calefaciendi & attenuandi viribus prædita, aceto coquenda, & naribus ad-

monca.

rouēda: & palatissimis acribus, ut sinapi, mithridatio, anisiaca, &c. illinēdum: tandem autē sternutatoria & piperis, helleboro albo, &c. naribus sunt inferenda. Atq; capiti prius raso, pulueres cephalici, & acriter sunt inspergendi & affricandi: ut nucis moschatae piperis, cardamomi, & si opus est, euphorbii, seronis murium, &c. Postremo (re postulante) sinapi- mus ex pari ficuum, ac sinapios quāritate adhiben- dus: a quo ad phœnigium ex thapsia, pane porci- no, foliis lepidii, &c. est accedendum: atq; ex his pu- lula excitatz pungantur; & humor sinatur efflue- re: & vlcera diu aperta teneantur.

Ad capitis dolorem.

*Cephalal-
gia.*

Hic digerentia adstringentibus mista sunt appli- canda: ut oleum rosaceum cum chamamelino, vel pannus, rosarum, chamemeli, anethi, sambuci deco- cto intinctus, postque expressus capiti applicandus: atq; tandem mere attenuatū usus esto; ut irriga- tionum ex decoctis cephalicis, saluia, betonica, liba- notide, &c. & ab eis inunctiones ex oleo anethino, costino, & similibus curentur: secundum eas frōtale ex cephalica materia, ex foliis saluiae, melissae, an- thos, betonicae, &c. Nisi his cedat remediis capitis dolor, cucurbitulæ cum multa flamma, homoplatis, aut ceruicis radicibus applicandæ: partes extremae fricandæ, & dolorificis vinculis constringendæ.

Ad nauseam atq; vomitum.

Nausea

Purgandus extra paroxysmum humor clystere: & de ventriculo in aluum provocandus medicamen- tum diaphœniconis, vel catholicum recipiente: vel eis acriora, si usus exigat. Atque post clysteris usum, ventriculus ex pilulis aloeticis purgandus.

*atq; vo-
mitus.*

Die sequente vini absinthitis dimidius cyathus sumendus: vel alia ventriculum adstringēdo robo- rantia: ut syrupus de mentha, ex triplici malogra- nato, & cydonii succo, rosas, & menthæ pulucre, aro- matizatus.

Hic ad coquendum ventriculi humores pituitosos, somnus, & inedia maxime conueniunt, neque hic omittendæ frictions, ligaturæ, & hypochondriorum per cucurbitulas suspensiones.

Præparato humore, post alias vacuationes, etiam rhabarbarum integrum commaducetur; vel in puluerem redactum syrupo rosarum laxatio ad opiatæ formam misceatur; vel mala cydonia, caryophyllis, aut cinnamomo transfixa, & saccharo condita, edenda; vel similiter præparata tenellæ nutes iuglandes.

Alui fluxus.

Ad alui fluxum.

Cucurbitulæ ad ventriculi regionem affigantur: & vomitus (si nil dissuadeat) sollicitetur: vel medicamentum catharticum adstringens imperetur. Post autem venter adstringentibus foueatur, atque illinatur, & adstringentia cibus præsumantur: vt cydonium aromate, cinnamomo, caryophyllis, cōditum; vel rosarum rubiarum ita præparata conserua.

Frigus.

Ad frigus.

Horum plantis, aliisque partibus, lateres calefacti, aqua vitæ irrorati, & linteis inuoluti admouentur: qui quam primum effectum præstiterint, semouendi. Porro spina tota oleo calefaciente, aqua vitæ admista, vel ipsa theriaca vetus infricanda.

Cibi fastidium.

Ad cibi fastidium.

Cibi fastidium præcipue post morbi statum curandum. Ergo intestinis clyster ex vino albo, vel vrina pueri impubis cum multo melle depumato, multo ante cibum iniiciatur, eidem drach. i. ß agarici adiectæ, & varii cibi apponantur. Si haud ita succedat, clysteres nutrientes iniiciantur, deterfis ante intestinis.

Hæc enim febris pituitosa: sequitur Melancholica.
Febris melancholica Melancholica fere quarto quoquo die accessiones habet: 24. horas longas, interdum breuiiores.

Raro

Raro eundem bisprehendit.

Quartana statim fere pomeridianis tantum temporibus invadit: & eo contumacior est, quo meridiei propior.

Raro continua est: Autumno solet corripere. Accidit potissime post 35. annum: & naturis melancholicis, siue diata siue consuetudine talibus. *Continua.*

Rigor post initia accidit & in declinatione sudores.

Definit yrinis, crassis, alias albis, alias nigris; hæmorrhoidibus, menstruis, vel abscessibus in crura. Initio, id est, 8 primis diebus, tenues sunt urinae, & aqueæ: longiore intervallo si quartana intermittat.

Producitur intermittens ultra secundam dierum criticarum periodum: in tertium, vel sextum mensem: aliquando in annum: aliquando in decimum annum. *Intermittens.*

Quartana Melancholica æstiva sunt brevissime: Autumnales quæ hyemem: attingunt longissima existunt. Lienti nocent quartanae.

Melancholica signa.

Frigus initio abest quod in altum penetrat: ut etiam ossa perundere videatur. Calor hic minor quam in pituitosa. & pulsus imbecillior, minor, rarior, tardior, & obscurior. *Melancholica signa.*

Remedium.

Melancholica materia bene attenuanda, incidenda, tergendaque calore; temperatis ad gradum primum excessus. *Remedium.*

Febris paroxysmo imminente, ab initio, spinæ, atque scapulæ unguentur oleo de cucumere asinino, ex euphorbio, &c. tum postea molli lecto egrotum bene lectum reponitur: & lateres calidos vino tenui odorato perfrictos, & raro linteo convolutos, plantis, & volis, admovent, & calore succenso, amoveo mature. Victus attenuans esto: gallinarum, caponum,

carnes adultiores, & verruices minores, pulli colubarum, & auiculæ nemorales, &c.

Iuscula alterentur borragine, api foliis, & radicibus, vel eisdem — mel staphylli, othymi, adiecto cichorio, oxalide, endiuia.

Olera refrigerantia asperso piperis, vel zinziberi puluere retundantur.

Vux passilæ his conueniunt, & cappares sine aceteto.

Potus: vinum oligophorum per se: vel hydromedilatum, ex decima mellis parte ad aquam.

Si suppressa aliqua naturalis purgatio sit, vel ex hæmorrhoidæ, vel ex utero ea excitanda.

Intra 14. vel 20. diem sanguis parce mittatur ex saluatella si vires infirmæ sint: sin minus, ex interna sinistra, præmisso clystere.

Die phlebotomiam sequente, poterit imperari purgantium aliquod leniter melanophygun: & ab eo septem vel octo dies attenuando, incidendo, detergendo, humor præparetur, ex apozematis hyssopi, maioranæ, melissæ, &c. (nunquam — borragine & buglossa omissis) quibus apozematis syrupi conuenientes addantur.

Ab hac humorum præparatione, validius paulo est purgandum: & ab eo iterum humor præparandus per varias medicamentorum — formas: opiatas tabellas, &c. percutiendo, vsq; ad tertiam vel quartam hebdomadam: quo tempore (adhuc morbo persistente) per quatuor dies humore præparato, iterum purgandum: atq. deinceps (morbo ad statum accedente) clysterum solummodo vsus esto. medicamentorumq; alterantium tantû, & humores præparantium. Excretionem facta vel abscessu, si vires adhuc robustæ sint, catharticum adstringens, vt hammech, vel rhabbarum integrum exhibendum. Atque postea sudores prouocandi, & vrinæ, & viscera sympha-

lympatheticis roborāda, diarhodone, diambra, dianofcho.

Melancholica intermittens, & huius signa.

*Melan-
cholice
intermit-
tentis si-
gna.*

Primum suboritur pandiculatio, oscitatio, & mo-
esta quædam totius corporis inæqualitas: tum fri-
goris horror minime æstis: sed velut ossa confrin-
gens, & rūdens cum articulorum dissolutione Hor-
rorem sequitur dentiū stridor maximus, interdum
binas horas durans.

Cum ad statū morbus vergit, rigor levis loco hor-
roris suboritur, & horrorem huius febris sequitur
calor levis, pulsus initio rarus, tardus, in morbi au-
gmento velox, frequēs, sed rarior atq. tardior quam
in biliosa flaua sincera intermittēte. Et in pulsu lon-
ge habet velociorem arteriam, in principio & fine
motus, quam in medio. Viræ omnes crudæ sunt.

Paroxysmus tres diei naturalis partes sæpe occu-
pat: nō raro ultra 24. horas protenditur. In exiguum
sudorē definit: & finito paroxysmo, pulsus impres-
sum febris vestigium continet: rarior tardiorq; ex-
sistens.

Remedium.

Remediū.

In intermittente melancholica, liberalior cibus
concedatur, quam in remittente tantum. Omnia
valde humectantia & magis quam in remittente
incidentia, atq. calefacientia, tam sumta, quam ad-
mota.

Aer calidior esto, nec diebus intermissionis (si vi-
res ferant) negotia cōsuetā intermittantur: & ante
ipsum accessum, corpus vehementer exerceatur.

Cibi sint moderate sicci: vt panis purissimus, dili-
genter subactus, probe fermentatus, sale perexi-
guo, vel potius salis loco, anisi, aut fœniculi granis
asperfis.

Carnes: hadina, vitulina, pulli gallinacci, iuscula
elixorum, carnes assorum.

Æstate conueniunt potissimum pisces saxatiles
vt cancri, & testudines toti, & ex hordei cremor
cocti.

Ex fructibus humidi, nec tamen frigidi: vt pom-
dalia cocta, & ex saccharo sumta, pruna dulcia, ca-
rica pingues: passula exacinata, &c. Lac amygdali-
num. hordeum ad tabem decoctum.

In sculis incoquatur borrago & spinachia, & mer-
curialis aliquid, si alius est adstricta, atque tempus
æstiuum sit. Sin hyemali, mentha, maiorana, meli-
ssa, &c. porto data omnis esto humectans atq mo-
derate calefaciens. Condiuntur nutrimenta omnia
aromate puco, nec valde acri: vt cinnamomo, ma-
ce nuce muschata. croco; nisi caput dissuadeat.

Sassamentorum hic vsus maior quam in prædictis
conuenit: sinapios, piperis, &c.

Potus esto vinum generosum, clarum. dulce. di-
lutum aqua cocta cum aniso, cinnamomo, fanicu-
lo, aut ceruisia eadem arte præparata.

In hac intermittente per initia (virium habira-
tione) vberissime alendum: & somnus longus af-
fectandus.

Alius libera esto: & nisi per initia respondeat,
clysteres acriores vsurpentur quam postea.

Horrori hic oleo ex castorio. vel euphorbio, &c.
consulendum, & sudor copiosissimus eliciendus.

Vomat agrotus à cibo paulo ante accessionem,
leni vomitorio, vario prius cibo sumto: pingui, ac
oleoso.

Si sitiat in paroxysmi statu, potus esto syrupus
borraginis, violaceus, vel capillorum veneris cum
decocto fœniculi, & aqua hordei: & in ipso paroxy-
smi statu, consulendum viribus aliquo restaurante,
& pariter sitim leniente: multo magis vbi morbi
status vrget.

In hac seccetur initio basilica, vel media sinistra, &
si niger.

niger sanguis fluat, & crassus: satis magno forami-
ne, audacius perfundatur.

Vno vel altero die post sanguinem missum, pur-
gatio melanaphyga satis fortis paretur: eius tamen
citrate, vel cassia, vel aliquo syrupo humectante
fracta.

Deinceps (materia prius preparata) mensibus sin-
gulis, nunc hoc, nunc illo modo purgandum lenius:
sumatur catharticum pridie accessionis: aut si ac-
cessus tardior fuerit, ipso accessus die.

Postea studendum coctioni, atq; humorum præ-
parationi: nunc syrupis, nunc tabellis, nunc opiatis,
& omnibus magis calefacientibus, & attenuanti-
bus, quam in continua; vt oxymelite squillitico, sy-
rupo de radicibus, de fumaria, de epithymo: singulis
lulis decocto radicum capparum, tamarisci, corti-
s medianæ fraxini. Atq; hæc omnia laxatiua fiant
cartami medulla, senæ foliis, vel agarico; atque
in haustus vnus sumatur quarto quoquo die par-
tysmum antecedente.

Porro iuscula pullorum alterentur herbis molli-
tibus, malua, mercuriali, atriplice, & aromatum
liquo.

Diebus intermissionis poterunt inspergi pulue-
s diambæ, diamoschi, dulcis, diagalangæ, &c. o-
nia pondere maiore quam in continua: & quo
opius ad statum, eo calefacientia & attenuantia
at remissiora quam in continua.

A statu, viscera fouenda, ac fotu molliēda: & ma-
festis signis concoctionis apparentibus, lene pur-
gans ex adstringente materia propinetur: & viscera
eo firmentur: sudores, & vrinæ moueantur.

Viscera postquam quater aut quinquies fota fue-
runt, molliente vnguento illinantur, & incidente
marriato, &c. Cor in primis hic muniēdum, & in
his accessibus opithemata ex cardiacis applicanda:

E

& ex eadem materia sicca, scutū assidue extra par
xysum gestandum.

In morbi statu (lienis gratia) sanguis ex saluate
la pro viribus, ac morbi ratione detrahatur.

His peractis & concoctionis signis apparentibus
balneum valde humectās & refrigerans minus in
peretur: & ab eo corpus oleo violaceo inungatur
vel amygdalarum dulcium.

Si satis robustus sit ægrotus, poterit ex deco
attenuantis vapore postridie accessionis, bis bebb
made, sudare, præsertim vbi morbum inclinare co
siterit: quo tempore theriaca imperari queat, al
quo humectante mista.

*Haftenus febres ex bile unum humorem: sequuntur
ex eadem plures accendentes.*

Febres ex Vbi plures accenduntur, spuria dici queunt: &
bil. plures ex signis plurium humorum bile accensorum de
*humores*prehenduntur.

accenden- Hæ duplices sunt, vel æquabiliter mistis, atq; ac
te censis, vel inæquabiliter.

Spuria. Vbi æquabiliter miscetur, æquabilis ratio habenda,
Æqua- & præparationis & vacuationis humorum.

biliter Vbi inæquabiliter: inæquabiliter redundantis ra
mista. tio est maxima habenda.

Et in æ- In pituita siccandum magis: in Melancholia hu
quabili- mectandum.

ter. *Haftenus febris ex bile flava sequitur ex atra.*

Febris ex Ex atra quarto quoquo die frequentissime cor
bile atra. ripit.

Signa.

Signa. Accessiones à levi rigore incipientes habet, easq;
Melancholica breuiiores: sed cum mordaci calore
atq; sit vehementi.

Sunt item hac febricitates magis inquieti quam
ex melancholica laborantes, minus tamen diutur
na febris est.

Si ex

Si ex flaua bile vſta oriatur, omnia ſunt hic tanto
criora.

Cauſſa.

Cauſſa.

Ex prægreſſis aliis febribus maxime erraticis, ac
agis oriri ſolet.

Remedium.

Remediũ.

In hac omnia humidiffima ſint, & frigiduſcula
antum: vinum ſi concedatur, id bene aqua dilutum
ſto ad vehementiorem humectationem: aceti ta-
men vſus hic (quod in melancholica negandum)
arcus eſſe poterit.

Somnus eſto extra paroxyſmum diuturnus.

Sanguinis plus hic depleatur quam in melanco-
ca: die prima dextra baſilica aperta ad vnc. 4. vel
unc. 5. ſequenti & ſiniſtra ſaluatella, & (ſi vires feſcãt)
unc. 3. vel amplius ſi opus eſt.

Si atra bilis ex ſanguine fuerit, plus deplendum
nam ſi vel ex bile, vel p tuita, vel melancholia ex-
iſta oriatur.

Purgantia omnia hic aliquatenus frigida ſunt:
& bene humida ex melanaphygo aliquo.

Incidentia haud valde calefaciãt: vt oxymel ſquil-
ticum, cum ſyrupo violaceo temperatum atq. di-
utum decoctis herbarum mollientium & valde hu-
neſtantium: borragine, bugloſſa, violis, &c. Vel po-
ius iuſcula carnis ſalubris vt pulli gallinacei, verue-
is iuuenis vel vitulina cum multa borragine, bu-
loſſa, & pauca citragine alterata, vſurpanda: atque
tandem humore epiceraſticis temperato & præpa-
rato blande melanophygmum ſingulis hebdomadis
umatur.

Morbo tandem declinante adhibeantur fotus,
balnea, illitus, mollientia atq. attenuantia omnia,
itra inſignem calorem: maxime ſecundum hepatis
egionem: præſertim ſi atra bilis ſit ſanguinea

Hic cor toto morbi curſu, epithematis cardiacis

E. 2.

THERAPEVTICA,

muniendum: & tandem sub finem sudores prouocandi, & vrina: atq. vltimo viscera roboranda.

Hactenus febris hectica: sequitur

Hectica.

*Febris
Hectica.*

Hectica febris est, quæ in cordis substantia accenditur.

Hæc biliosis tantum febribus complicatur. Gradus tres habet: 1. ros conflagrat. 2. gluten. 3. humidum radicale.

Signa.

Signa.

Calor luculentior à cibo, alioquin æquabiliter per corpus diffusus: atq. vix febricitanti ob æquabilitatem perceptus. Qui tamen ab alio percipitur acris. Manifestior tamen in volis manuum, & plantis pedum percipitur.

Causa.

Causa.

Raro oritur nisi alio prius morbo prægresso. Interdum diatriam febrem excipit, frequentius ardentem, atque alias diuturnas.

Remediū.

Remedium.

In hectica, humidissima sunt omnia, & moderate frigida. Aer temperatus habeatur aquæ vaporibus, vel leui flamma: & acrior ignis est fugiendus.

Alimentum esto lac muliebre, asininum, caprilum, vaccinum, ebutyratum, recens multum: vel si muliebre sit, ex ipsa mamma suctum, ab vnc. iii. sensim augendo, vel etiam à pluribus pro viribus egroti, donec ad vnc. 8. peruentum sit: plus, minus, prout vires patientis ferant: atq. in hac dosi, integrā mensem consistere ex vsu erit. Si forte in ventre lac accescat, sacchari parum admisceatur: sin vritur, diluatur parum aqua. & ita subferuefactum propinetur. Exhibeatur autem mane, horis quatuor, vel amplius à prandio: atq. si ex eo prandere velit, mica panis sæpius lota immisceatur.

Ab his postea (viribus ferentibus) astaci fluuiatiles,

es, aqua hordei decoquantur, & apponantur esui: item cācri marini testa exuti, bene loti, & aqua hordei admodum elixi: ex quibus cum hordei farina, amygdalis, pineis recentibus, seminibus melonum, atq. cucurbitæ eisdem mistis inter se, atq. postea furæ coctis, testudinaturn fieri poterit.

Porro his similes cibi reliqui existant: vt iuscula pullorum alterata lactuca, portulaca, borragine, buglossa &c.

Potus esto frigidiusculus, atq; egelidus, somnus admodum prolixus. Et restaurantium, destillatorum, colatitorum, expressorum, vsus esto frequentissimus.

Balneum frequenter vsurpetur tepidum, eius vapore prius excepto, tum balneum ipsum, sensim affusum ægroto.

Epithemata partibus principibus accommodentur ex frigidis, humidis, sympatheticis.

Sudor si quis hic oritur, inhibendus oleis refrigerantibus, & adstringētibus leniter inunctis: vt rosaceo, nenupharino, myrtino, &c. Omnia in secundo cuius gradu, quam in primo, diligentius & vberius vsurpanda.

Symptomata medicum implorantia.

Syncope, alius adstricta, nimis laxa.

Symptomata he-

Syncope mitigatio ex præcedentibus petenda si alius profusa sit, (quod sæpius accidit in hac febre,) syrupus de rosis siccis, vel myrtinus, &c. Diuatur ptisana colata ex hordeo torrefacto, & dilutus propinetur. Et gelatina santalis aromatizentur: & aceto condiantur.

ctica fe-

Syncope.

Alius

laxa.

Sin autem alius adstricta sit, clyster refrigerans & humectans, ex malua, violaria, lactuca, &c. additis oleis refrigerantibus, violaceo, nenupharino, &c. infundendus.

Alius

adstricta.

Tertius hæcticæ gradus omne remedium respuit.

Æ 3

atq. signum habet faciem ab Hippocrate depictam oculi caui, nares acutę, collapſa tempora, frontis cutis arida, aures frigida: atq. contractę, & aurium extremitates auerſa: ungues acuti, & aduncę detortę, &c.

Hæc de cordis dyscrasia calida: atq. ita de febribus omnibus: sequuntur reliquarum principum dyscrasia.

Dyscrasia capitis calida.

Signum.

Remediũ.

Ad Capitis dyscrasiam calidam.

Signum.

Æstus cum dolore vehementi.

Remedium.

Moderata lux, alta quies. Fronti atq. temporibus (hæc namque partes in capitis calida dyscrasia laborare solent) panis ex oleo rosaceo inducendus: vel linteolum succo semperuiui, plantaginis, lactuca portulacę, mespillorum, &c. maceratum dolenti loco applicandum, & totidem gradibus frigida per omnes meatus applicanda: quæ omnia, siue fasciis siue anacollematis applicentur, crebro sunt mutanda.

Dolor autem ubi ingens sit, narcotica: opium, & camphora, cum croco ex lacte muliebri inducenda cautione maxima, ne longius quam dum dolorem sedauerint sinantur.

Sin autem dyscrasia hæc causam habeat feruentem sanguinem (quod ex tensione, grauitate, facie rubore percipitur) pro vsu atq. ægrotantis viribus vena pertundatur: primo cephalica dextera; atque tum postea vena puppis, vel alterutra iugularium si opus est. Vel cucurbitula cum multa flamma, scarificatis ceruicibus affigantur.

Sin vero bilem fouentem causam habeat (quod ex doloris acerbitate pungente, & veluti erodente, absque grauitate, oris amaritudine, faciei pallore, & infensibilis percipitur (præmissa parca phlebotomia) cholera-

holaphygis potionibus, & clysteribus res transi-
enda. Atque ab his, de tonlo capillo, topica sunt ap-
licanda.

Porro, si dolor contumax sit, atq. pulsatilis: arte-
rix in temporibus maxime micantes sunt inciden-
te: & sanguis satis largiter fundendus: nec non cu-
rbitula affigenda, extremorum frictiones adhi-
benda: & vincula dolorifica iniicienda. Atq. (malo
adhuc contumaci) cauterium actuale in medio ca-
ute ad futuras adigendum: nec sinapismos, nec
trochismos, pro mali contumacia, prætermitten-
dum.

Si vero ex ardore mens laborat, vel vigilia fati-
gant, multo diligentius prædicta vsurpanda: atque à
narcoticorum, valideq. refrigerantium vsu, sensim
discutientia cephalica ceteris admiscenda: vt beto-
nica, salvia, libanotis, stoechas, &c. quibus tandem so-
lis vtendum, & animalcula viua per spinam secta, &
exenterata, vt catelli, columbi, &c. sunt applicanda.

Hac ad capitis dyscrasiam calidam.

Ad pulmonem calida dyscrasia laborantem.

Signa.

Frequens spiritus atque is expiratus, iusto cali-
dior perceptus, lingua siccior, mala solito rubicun-
diores.

Remedium.

Aer frigidissimus, potio liquidissima, ac refrige-
rans, sensim pitissando bibita, amygdaloga, qua-
tuor seminum frigidorum maiorum emulsionem ex
hordei decocto, syrupi violacei dilutiones: pectoris
inunctiones ex humectantibus, atque refrigeranti-
bus: oleo violaceo, nenupharino, &c. cum succo re-
frigerante portulacæ, lactucæ &c.

E 4

*Dyscrasia
calida pul-
monis.*

Signa.

Remediū.

*Dyscrasia
calida ven-
triculi.*

Signa.

Remediū.

Ad ventriculum calidum.

Signa.

Appetentia remissa praterquam potionis, cuius ingens existit, à cibis, ructus nidorosi.

Remedium.

Cibus liquidus, frigidus, iurulentus, vt pulli ius & herbis refrigerantibus alteratum, maxime sympatheticis, oxalide, lactuca, &c.

Potus esto valde dilutus, vel aqua hordei, decoctum glycyrrhizæ, cum endiuia, lactuca, oxalide, &c.

Si bilis in ventriculo ferueat (cuius signum est oris amaritudo cum rosionis sensu) cholaphygo est abigenda: & si os ventriculi laceſcat, vomitu excutienda: sin fundum petat, ex adstringente cholaphygo vt rhabarbaro, vel diacydonio laxatiua est expurganda: à qua expurgata, epithemata refrigerantia ad ventriculi regionem ante & pene ex succo solani, endiuia, lactucæ, cum santalis aut camphora imponenda; vel cataplasmata refrigerantia ex farina hordei cum refrigerante succo, oleo rosaceo, vel melino addito, applicanda.

Sumantur autem ante cibum frequenter ribes, oxyacanthæ succus, oxalidis, mali medici, &c. corna, cydonia, &c.

*Dyscrasia
calida
hepatis.*

Signa.

Remediū.

Hepatis dyscrasia calida.

Signa.

Sitis contumacior, urina colorata, & acriores. Corporis color solito flauior.

Remedium.

Si sanguis ferueat, ex hepatica depleatur: sin bilis æstuat, prius refrigerantibus atque humectantibus alterata vacuetur.

Omnia intro sumenda sint copia largiore, atque maiore quam in ventriculo laborante. Cetera cum ventriculo conueniunt, si locum & sympathetica propria excipias.

Lienis

Lienis dyscrasia calida.

Signa.

Proditur communibus signis.

Remedium

Idem quod iecoris, nisi quod sympathetica propria sint huic accommodanda.

Renum dyscrasia calida.

Signum.

Calor molestus circum horum regionem perceptus, & oleosum quid urinis innatans.

Remedium.

Decubitus in alterutrum latus tantum, & in dorsum vitetur: dormiturus baltheo accingatur cui inexta sint spinacii semina, ne temere dorso noctu incumbat. Lectus esto durus. Quæ sumuntur hic liquidissima sunt omnia: & largiore quantitate quam in hepatis dyscrasia hauriantur.

Sin vero ex ardore renum diabetes oboriatur, verius & assumpta, & admota applicanda, & quæ admota sunt, frequentius immutanda: ut farina hordei cum succo foliorum vitis, plantaginis, portulacæ, &c. cataplasmatibus consistentia; & refrigerantia tum (quibus semper acetum admiscendum) toti ventri inducenda.

Testiculorum dyscrasia calida.

Hæc calore insolito atque molesto proditur: & eandem cum renibus therapeiam obtinet.

Uteri dyscrasia calida.

Signum.

Fervor atque dolor:

Remedium.

Loca circum os sacrum & pubem, decoctis refrigerantibus rigentur, & refrigerantia loco applicentur: ut oui candidum, vel ipsum integrum, cum oleo rosaceo quassatum, & stupa exceptum, &c.

Lienis

dyscrasia

calida.

Signa.

Remedium.

Renum

dyscrasia

calida.

Signum.

Remedium.

Testiculo-

rum dys-

crasia ca-

lida.

Uteri dys-

crasia ca-

lida.

Signum.

Remed.

Ad ambusta Remedium.

Curantur ambusta, vel ipsum ardorem auocantibus, vel exstinguentibus

Euocantia.

Euocantia calida sunt: ut ari, aut porri illita folia cepe sale contusa & inducta, vel oleum cum sale: atque hæc quam celerrime sunt inducenda.

Exstinguentia.

Exstinguentia, frigida sunt: oxycratum, semper uiui succus, oui album, succus solani, &c.

Hactenus ametria calida: sequitur frigida.

Ametria frigida signa.

Signa.

Pars tactu frigidior percepta: excrementa cruda & multa: pallor (si partium externarum aliqua sit) & decoloratio.

Causa.

Causa.

Primæ & procathartice: Exercitationes intermissæ, tristitia, curæ, &c. venus prodiga, in mulieribus menstrua nimium fluentia, somnus nimius: aer impenso frigidus, cibus, vel potio nimium refrigerantes.

Internæ causæ, frigida cacochymia, interdum ex pituita, interdum ex melancholia.

Remedium.

Remedium.

Dixta calida & calefaciens. Exercitatio pro corporis viribus satis valida, habitus fricandus, & à balneo attenuante, calidus vngendus. Hilaritas procuratur, etiam interdum ira excitanda.

Cibus calidus, panis triticeus, modice fermentatus, sale, aniso, &c. conspersus.

Carnes salubrium animalium, & concocta faciles, veruecinæ, virulinæ, pullorum, gallinarum, pisces saxatiles atque omnia aromate condita.

Potus meracus, olera acra, cepe, porrum, &c.

Medicamentum ex tribus piperibus, ex vino, certis interuallis sumatur: vel aliquid electuaria aromatarum vel puluerum diagalangæ, diamoschi, &c.

Cordin

Cordis dyscrasia frigida.

Signa.

Respiratio parua, & pulsus paruus, metus, trilitia.

Remedium

Corpus exercendum, hilaritas procuranda. Dieta eliqua esto aromatica. Potus, vinum satis generosum. Medicamenta exhilarantia cardiaca: ut diamo-chi, aromaticum rosatum: latificans Galeni & ex eadem materia stillatitia aqua rosarum, melissa, vel ochyimi admista, epithemata aptentur: atque ex eisdem siccis scuta ad cordis regionem gestanda concinnentur.

Cerebrum frigidum.

Signum: Sensus perceptio frigida.

Remedium.

Cephalica vberius quam in prophylactica adhibita.

Pulmo frigidus.

Conuenit cum corde frigido, si locum & sympathetica excipias.

Ventriculus frigidus.

Signa.

Tarda coctio: ructus acidus.

Remedium.

Si humore pituitoso fota sit: (quod ex grauitate quadam, & nausea, & ex ventriculi dissolutione, & languore, percipitur) ipse humor medicamento aloeetico, ut hiera picra, pilulis stomachicis, &c. est expurgandus, vel prius attenuatus (ceteris consentientibus) excutiendus: & postea ventriculus sympatheticis calidis corrigendus: sumto vel diaspolitico, vel diatrion pipereon, &c. & fomētis ac sacculis ex stomachica materia, vino aromatico, caryophyllis, nucem moschata, absinthio roborandus.

Cordis

dyscrasia

frigida.

Signa.

Signum.

Cerebri

dyscr. frigida.

Signa.

Signum.

Pulmo.

Signa.

Ventriculi.

Signa.

Cibus esto siccus ex volatiliū carnibus, cinnamomo, caryophyllis, &c. transfixis.

Potio esto parca & meraca. Cibus actu calidus potus frigidus.

Sub finem autem (expurgato humore) adstringentia vsurpentur, præsertim si inde diarrhœa lenterica immineat: tum namq. adstringentia vel toti ventri sunt inducenda.

Hepatis.

Hepar frigidum.

Signa

Color faciei pallidus, vrina alba, alias tenuis, alias crassa, attractrix facultas, vel alteratrix, vel ambę infirmæ.

Si attractrix vis infirma sit, liquida cruda, incocta per aluum excernuntur, ad chyli tamen formam accedentia.

Si alteratrix tantum infirma sit, simile quid loturæ carniū, vel sanguinis aqua diluti, ex interuallis excernitur.

Remedium

Cibi calefacientes: mel, passulæ, ficus, amygdalæ, pistachia, &c. Potio: vinum. Ex pharmacis: Electuatum ex vino chyphondes dictum, vel mel passulatum cum cinnamomo, cassia, spica, ligno, aloes, & croco, sumatur vnc β. ex vino odorifero.

Eupatorium, absinthium, schœnanthus, ex vino & aqua cum melle cocta, frequenter vsurpanda.

Foris autem illinantur oleum irinum, mastichinum, costinum &c.

Si quis autem humor ametriam pariat, est is primum pharmaco expediendus, atque deinde cetera sedulo vsurpanda.

Lienis.

Lien frigidus.

Conuenit cum iccore, si locum, & sympathetica propria excipias,

Rem.

Renes frigidi.

Testes.

Uterus.

Renum.

Testium.

Uteri.

Calidis sympatheticis in primis, secundum natura aditus applicatis curantur.

Ad partem frigore laesam.

Remedium.

Parti frigore laesa.

Pars sensim calefiat, & (perfrigerato loco calidior collocato) pars ipsa oleo irino, castoreo, & castorio, leuphorbio inungatur, & lana succida inuoluetur, nunquam omittis parti sympatheticis.

Hactenus dyscrasia frigida: sequitur humida.

Signa.

Dyscrasia humida signa.

Pars nimis mollis, & humiditate diffuens, excreta copiosa, facilis sudor.

Causa.

Causa.

Procathartica, vita sedentaria, somnolentia, aer, habitatio humida, iuscula crebra, cibi humidi, potus multa.

Internæ: excrementa, vel succi humidi copiosi, crassi humores redundantes.

Remedium.

Remedia.

Siccantia omnia, exercitatio valida, sudores multati, frictiones siccae, & hypocausta.

Cibus assus, & ex animalibus siccis, salsamenta, panis siccus & vetustus, modo haud nimium induerit. Iuscula nulla, potus parcus, Venus.

Cer humidum,

Cerebrum,

Iecur,

Ventriculus.

Lien, &c.

Omnia siccantibus, sympatheticis, & roborantibus sunt corrigenda.

Hactenus dyscrasia humida: sequitur sicca.

Dyscrasia Hæc difficilior quam humida cedit remediis.
ficca si *Signa.*

gna. Pars durior, squalidior, excrementa pauca.

Causa. *Causa.*

Procathartica: studia, vigilia, cura labor vehemens, & exercitatio vehementior, & laboriosa. Venus prodiga.

Aer siccus, Laconica multa. Cibus siccus. Potio parca. Interna: sanguis parcus.

Remed.

Remedium.

Humida omnia, exercitatio lenta & parca: iuscula crebra, lac, iuscula hordeo, borragine buglossa alterata. Balnea ex hydrelæ: & ex hydrelæ frictiones Hilaritas. Somnus etiam à cibo brevis. Potio diluta & vinum oligophorum.

Siccitas marasmodus (exhausto humido radicali) omnem therapeiam re-puit.

Partium principum sicca dyscrasia.

Harum atque reliquarum omnium siccitas, ex vberime adhibitis, quæ in prophylactica dicta sunt, est corrigenda.

Hactenus quarum tam partium elementarum dyscrasia.

Dyscrasia Si uniuersalis dyscrasia sit: per omnes vndiq. adiutus est abigenda: exordio ab illa parte ducto quæ alteri incommodat.

uniuersa

la. Causas habet vel vndique afficientes vel principes: & signis prædictis vndiq. manifestis proditur.

Hactenus ametria Elementaris: sequitur venenata.

Ametria Venenata ametria est, omnium eucrasie partium à venenata causa corruptio.

venenata

ta.

Venenata ametria est alexiteriis demolienda.

Venenata duplex § In corpore genito.
 ex illa: ex veneno & Velextianco.

In corpore

In corpore } Spiritus tantum inficiens:
entum est } Vel substantiam corporis, item cor-
plex, vel } rumpens.

Spiritus inficiens; fere vel cerebri, vel cordis, tan-
tum spiritus inuadit, idque pro veneni motu, vel se-
rsim, vel simul.

Cerebri spiritus seorsum inficiens epilepsiam
arrit.

Est autem epilepsia conuulsorius vniuersi corpo- *Epilepsia*
s motus, ab aura venenata, in qua de repente a-
roti concidunt, & ex interuallis (ouelluntur; & in-
rdum voce nil significante exclamant, & ore spu-
nam edunt. Aliquibus vesica & aluus, inuoluntarie
oluuntur, aliis adultis, genitura excernitur.

Pueros vexare solet septimestres iam dentientes, *Signa.*
interlunio natos, & matris menstruis fluentibus
conceptos, atq tum perseverare solet ad pubertatis
annos, quibus cum primum semen mares emittūt,
& menstrua femellis effluunt, cessare solet: quos si
operet annos, difficile curatur, & fere desperata res
st. Atq. alias ubi stertor, stridor dentium, partium
ocii peruersio, corporis totius iactatio vehemens,
ouma multa, seminis effusio, in ipso casu acclama-
io, res periculi plena existit.

Remedium.

Remedium

Corpus loco lucido collocandum ex temperate
alido, capite sublimiore, ex quo membra superne,
eorum fricentur: clystere satis acri prius injecto.
nte omnia os diducendum est, atq. tenendum di-
uctum: & lingua & palatum, theriaca, & mithrida-
o, vel alterutro ruta succo, vel oxymelite squilliti-
o dissoluto illinenda, & naribus excipiatur tumus
elzoini vel castoreum odorandum, vel castoreum,
q. be'zoinū oxymelite squillitico dissoluta in gn-
m indātur, in aures & nates oleum rosmarini, aut
ucis moschat ginfundatur, & inde coronalis sutura

& lambdoides, fricentur; & extremis vincula dolorifica iniciantur.

Hac arte excitato epileptico, reuulsionibus studendum, & vacuationibus ab ipso cerebro, primum clysteriis; tum purgantibus, præsertim per sedem, ex hiera diacolocynthidos: deinde cucurbitulæ, cū scarificatione affigendæ, pro ægroti viribus, ac morbi vehementia. Ex interuallis (ægroto interea recreato) cucurbitulæ primum hypochondriis affigantur: deinde scapulis, cum scarificatione, atq. (diebus interiectis purgato corpore & ægroto recreato) occipitio affigantur: & rubrificantia, & vesicas excitatæ, collo iuxta scapulas, ad mouenda; deniq. cerones, & cauteria, extremo occipiti, & carnex brachii parti inducenda, aperto diu seruato vlcere, caput radendum, vel detondendū, & cucupha ex cephalicis adiectis morbo antipatheticis, vt visco querno, pæoniæ maris radice, hyssopo, &c. gestada, & sternutatoriis ex pipere, euphorbio sinapi, &c. vtendum, & apoplegmatismis. Atque tota therapeiæ historia, antidotus sumatur huic malo proprius: vt squilla apud Gal, in consilio pro puero epileptico, vel aliud quodlibet accommodatum ex visco querno, radice, & semine pæoniæ maris, decrecente Luna collecto, cranio humano, ungula asini, cornu alcis, &c. Quibus autem inueterata est, malleoli venæ, veris initio, incidendæ.

Si infans sit, nutrix esto abstemia, & coitu abstinere.

Pueri corpus molliter fricadum, & caput detonsum inungendum oleo anethino, rutaceo, sampsuchino, &c puluere cyperi, angelicæ, radicis pæoniæ maris adiecto. Aluus semper tenenda tenera ex butyro & saccharo, vel melle nutricis mammæ illito, mercurialis cauliculo in anum inserto: vel aliquid syrupi laxatiui rosarū pallidarū puliculis misceatur, vel

el sedes melle illinatur, & rutæ succo: vel salis grunus in podicem indatur.

Si aliunde venenum deferatur: tum & origini est obstandum. Quæ ex sanie maligna biliosa in ventriculum irruente ieiuno fere, oriri solet. Hic ergo pa- is vino tenui austero, vel granatorum succo mace- andus, atque sumendus: atque ventriculus ex alo- tico medicamento purgandus: vel vomitu humor acuandus: & ne talem sanie admittat, sympa- heticis astringentibus roborandus. Pueris solet ex vermibus putrescentibus accidere. His, amaris, & a- xiteriis, vermes enecandi, atq; eiiciendi, tam sum- is, quam ad umbilici regionem applicatis. Atq; de- ur (luna declinante) semen pæoniæ cum pulvere ontra vermes, bis hebdomade.

Si ex alia particula quæ constringi poterit malum rriatur, fune diligenter excipiat: & pars arctissi- ne constringatur, vt præcludatur veneno aditus: & articula, rubrificans, & vesicans medicamentum, mponatur: vt lepidum, sinapi, cantharides, &c. Cu- urbitulæ loco affigantur, & mithridatio, vel theria- a, vel anagallide rubra, locus inducendus, & vici- ia omnis ex sinapi, pipere, euphorbio cum mellea- acardino, vel theriaca. Si locus præligari nequit, altem cucurbitulæ adhibeantur cum scarificatio- ne & multa flamma,

Vbi cor venenum petit, idque vehementius: li- *Lipoby-*
othymiam, aut syncopem parit, vbi remissius pal- *mia.*
itationem. Id autem fere accidit ex sanguinis gru-
no in ventriculo, vel intestinis, vel in pectore, vel in
vesica putrescente: vel ex vermibus putrefactis, vel
tomica subito rupta, ac virus in cor exhalante. Hic
primum ex syncope reuocandus agrotus vino por-
ecto, & odoratis astringentibus naribus adhibitis,
& spiritus recreantibus, vt aceto rosaceo, in quo hys-
opus maduerit, vel ipsa hysopica ma intincta, &c.

E

odorata: & frictiones adhibenda partibus extremis: & vincula dolorifica iniicienda. Atque deinceps, (reuocato agroto) grunus, & venenum, expurgandum: & Cor sympatheticis, & antidotis, tam sanctis, quam ad motus muniendum: vt diamargarito frigido, puluere de gemmis, quæ sumi poterunt ex syrupo de acetositate citri, & aqua rosacea dissoluta pannis intinctis, ad regionem cordis pro epithematis applicari &c. Nec non vtile theriacam cum conserua borraginis sumere. Deniq; cor vndique muniendum, & sibi sympatheticis: atq; antipatheticis veneno. eademq; ratio in palpitatione ex aura venenata est tenenda. Atq; hæc vbi seorsim peruntur: veneno simul autem, & cerebrum, & cor, in vteri suffocatione affici solent. Ergo in hac, cum accessio propinqua est: torpor mentis, pigritia, crurum imbecillitas, pallida facies, aspectus tristis: cum iam instat, strangulatus, grauis sopor premit; mens desipit; sensus torpent, vox obmutescit, crura contrahuntur; Deinde maxillæ rubere incipiunt; facies aliquantulum ardescit, pulsus exiguus, languidus, in nonnullis vix perceptibilis. Cum remittit, humiditas quædam ad tactum ex locis mulieribus procedit: atque tandem redeunt ad se.

Circu tibus mouetur: hyeme & autumnio magis, accidit iuenculis, ad vencrem procliuiibus: sterilibus maxime, si ex medicina sumpta fuerint infœcunda: & eis quæ præter consuetudinem non miscentur viris.

Causa.

Causa. Vapor in principes partes elatus ex semine corrupto, vel alio quouis humore crasso, & veluti seminali in vtero putrescente: & in partes nobiles virus exhalante.

Remedium.

Remediū. Excitetur e paroxysmo vellicatis auribus, maxime

me pilis pudendo adnatis. Aliquando opus & piper, zinziber, sal gemmæ, & huiusmodi alia pudendis immittere. In accessione, summa diligentia & crura tota, & corpus totum perfricandum, ex aceto, & sale. Odore fœda naribus admouerantur: ut castorium, galbanum, allium, pili combusti, veteramenta combusti, & naribus excepta. In vuluam autem odoratissima vnguenta infundenda, ut oleum, ciueta, vel moscho, mistum: vel in quo nux moschata, caryophyllum, &c. incoxerint: vel pulueres aromatici miscentur. Et inde obstetrix (intincto digito) affricet os vteri, in virginibus: in aliis interiora.

Porro sternutamenta fiant ex castorio, pipere, eleboro, sinapi, &c. Cucurbitulæ affigantur inguinibus, & ventri cum multa flamma: & voce aspera excitetur, ubi accessio conquieuerit: vomitus excitandus, & cibus parcus offerendus, vel nullus: & cardiacis roboretur.

His per intervalla, castorium drach. i pondere vel scrup 2. bibendum ex artemisiæ decocto: vel bryoniæ radix, vino albo incocta.

Si virgines sint, vel viduæ, nubant: si nuptæ, coitus frequentior esto solito.

Si prægnans laborat suffocatione, ea quæ conceptum corrumpunt caenda: & quæ vehementer vterum concutiunt.

Hactenus de veneno spiritus tantum: sicente: sequitur corporis item substantiam corrumpens, atque primum de Elephantiasi Signa.

Pili Elephantiacis defluunt: & ubi auelluntur, Elephantiacis signa. cutis pars vna sequitur: tubercula rotunda, multa, granosa, sub superciliis, & pone aures, variisque faciei locis. Auricularum contractior & exactior rotunditas: frontis rugositas: oculorum obtutus fixus, & exacta rotunditas: nares extrinsecus patulæ: intrinsecus constrictæ: labrorum sublatio, crassities, &

tumor gingivarum sordes: foetor: erosio. Venæ sub lingua varicosæ, & nigre: animæ foetor: vox clangola, & ex naribus manans. Vniuersæ cutis defœdatio cum arida scabritie, cum multis herpetibus, scabie, & vlceribus, squamas, crustasque remittentibus: sensus compunctionis per vniuersam cutem: consumptio musculorū inter pollicem, & indicem: scapulæ instar alarum exstantes: partium stupor, partium extremarum putredo: terrifica insomnia: timores: ad coitum furentes: sanguis si aqua dissoluatur, arenosus: pulsus debilis: vrina instar iumentorum crassa.

Remedium.

Remediū. Malum si inueterauerit, incurabile existit. vbi recens sit, (id est, cum nihil ex summis deciderit: nec vlla sit vlceratio, nec eminentiæ tuberosæ plurimū exsurgant: sola facies aspectu ingrator, neque tamen admodum indecora) therapeia experiunda, quantumuis difficilis.

A somno, manu molliter permulceantur: aluæque deiecta prius, gestetur: & vocem exerceat: deinde perfricetur, & vario exercitationum genere vtatur. Sudor ab exercitatione contractus abstergeatur, & corpus butyro recenti delineatur: & post (tēpore pauxillo interposito) succo scœnigræci, aut ptisanæ cremore corpus perungatur in balneo: & a balneo, deterfus, perungatur oleo myrtino, vnoq; modico cum alumine, vel ammoniaco, vt sordium sit spissitudo: rursus teneris panniculis absterfus, dimidia hora conquiescat, inde potu aquæ ad vomitum sollicitetur, post vomitum detur vinum absinthites, aut organites.

Cibus: Panis hordeaceus, vel maza. ptisana, oua, lac, mel cum pane, pisces molli carne præditi, saxatiles: ex testaceis ostrea, pectines, tellinæ cum betis incocta.

Volantia boni succi.

Ex

MEDICINAE PARS II.

85

Ex oleribus: beta, lactuca, malua, rumex, &c.

Ex fructibus: ficus, vuar, passulæ, pinei nuclei, amygdala, &c.

Vino, ac venere, toto morbi curriculo abstinendum.

Leui adhuc malo, caput vrendum ferramentis nuclei modo rotundis: capite ad cutem prius detonso, quinque crustis excitatis: vna supra sinciput, altera paulo supra frontem vbi pili desinunt, tertia in occipitio: duabus reliquis supra ossa squamosa: vlceribus diu apertis seruatis.

Quo nisi cedat malum, atque valentius sit: protinus per initia sanguis mittatur, præsertim vere, pro viribus, ac vsu, ex vtroque brachio, ampla vena, si ferant vires, sin minus, ex malleolis, vel manu extrema, ac nouem diebus, vel decem interpositis: purgetur corpus hiera diacolocynthidos: non semel, sed (habita virium ratione) frequentius, atque aliis decem diebus interpositis, lactis scissilis serum detur, haud minus tribus heminis, nec amplius quinque: sequente tempore, recens mulctum bibi poterit: & frequenter vsurpari.

Si morbus haudquaquam cedat: lacte abstinendum, & vomitus tentandus ex radícula: atque postea ad helleborum album accedendum: bis vere, (si fieri potest) semel per autumnum, & metasyncriticis vtendum ex alto humorum rapientibus: & leues cucurbitulæ hypochondriis, & ori ventriculi applicentur: & membra dropaci illinantur, atque iterum ex intervallo corpus purgandum ex hiera: & sanguinis tum missio prætermittenda: atq; hoc ter in anno repetendum: vere potissimum, & autumno.

Inter dies purgationis, vtendum frequentibus balneis, & antidotis: balneis ex fumaria, boragine, buglossa, nepeta, &c. smegmatis in balneo vtendum,

F 3

ex rumicis radice, sulphure, nitro, & tumidis emi-
nentiis, iberidis viscidis folia, cum axungia tula, ap-
plicentur.

Ad spirandi difficultatem: qua elephantiaci affli-
gi solent: aselli sub aquariis degentes, quinque aut
sex, ex aqua mulsæ cyathis tribus potentur.

Antidotus autem sint, decoctum brassicæ absin-
thii, ligni sancti, cum passulis, ficubus, violarum flo-
ribus & boraginis, ac buglossi foliis, erinacei caput
eodem modo decoctum.

Viperarum carnes, abscisso capite & cauda, ad pu-
trilaginem coctæ: carnibus assis, & iusculo absor-
pto, theriaca ipsa, tum pota, tum illita: & sales the-
riaci.

*Atque hec potius ne morbus inualescat: quam
ut omnino curetur.*

Cancer.

Signa.

*Canceri si-
gna.*

Durities partis: color liuidus, id est, inter rubrum,
& nigrum medius: circa locum affectum ictus, qua-
si punctim illati sentiuntur: interdum torpet: ve-
nas ostendit in circuitu tumentes, ac elatas, canceri
brachiorum modo, vbi exulceratur pars, dolet; la-
bra prætumida habet, aspectu horrida, & colluue
ingrata, sanies continue manat tenuis, aquosa, ni-
gra, aut fulua, & grauiter olens.

Remedium.

Remediū.

Est item fere & istud malum immedicabile, est-
que vel mitigandum, vel prorsus excidendum: si in
eis partibus sit, quæ incidi poterunt, mitigatur pri-
mum sanguinis missione: tum alios humores pur-
gante pharmaco ex intervallo diata esto ex ptisanæ
cremore, lactis sero, piscibus saxatilibus, omnis ge-
neris auiculis, exceptis palustribus.

Ex oleribus conueniunt malua, atriplex, blitum,
cucur-

eucurbita, &c. acia vitentur omnia: & potus generosus, menses, & hæmorrhoides cōsuevis irritentur: & linteum molle duplicatum succo solani imbuetur, & applicetur, &c. lanam molliusculam extrinsecus eodem succo madentem linteo circum dato: & ne siccescant, hæc eo succo subinde irrigato, vel applicetur vnguētum album, vnguentum elithargyro, & plumbo vſto: ex pompholige, &c.

Atq; hæc mitigandi ratio.

Vbi autem excindere libet, prorsus rescindendus, vt nulla radix superſit: & ſanguis exprimendus, & ſinendus fluere, etiam exciſo cancro, cādente ferro locus inutendus: vel ſi minus libet ſecare, & cādente cauterio adurere: Exedatur carcinoma aſenico ſublimate: quod triduo ſinendum, vel dum effectum præſtiterit, quod ex loci tumore percipitur. Interea vicinis partibus bolo, oleo roſaceo, ſucco ſolani plantaginis, ſemperuiui, munitis, dolor mitigandus malua, althæa, in mulſo ſubaſta, & oleo roſaceo pauco amiſto, ad cataplaſmatis formam.

Carbunculus.

Signa.

Pars dura, ardore feruens, puſtula ſæpe multa, exiles, milii magnitudine: interdum vna maiuſcula, ab eis cruſtoſa vlcuſcula, qualia ferramentiſ cantentibus excitantur, cruſta modo cinereum colorem, modo nigrorem, præ ſe fert; eoq; loco, leuari cutis nequit: ſed carni inferiori quaſi infixæ eſt. circumiacens caro inflammatur ingenti ardore, & colore nigreſcente, ſplendetq; bituminis, & picis modo. His accidit febris, nauſea, frequens vomitus, appetitus proſtratio, cordis tremor, palpitatio, & frequens animi defectio.

Carbunculi ſigna.

Remedium.

Cordi inprimis hic conſulendum antidotiſ, *Remedi.*

F 4

& alexiteriis sumtis, & admotis, sympatheticis, & veneno repurgantibus diamargarito frigido, de gemmis, puluere bezoardico, &c. Sanguis (si vires ferant) ad lypothymiam mittatur: ac deinde tumor scarificandus plagis altis: & ipsæ incisiones, aqua calente statim perfundendæ: interdum & opus est arsenicum sublimatum imponere: vel sanguisugæ affigendæ & vicinæ partes muniendæ bolo, succo solani, cum rosaceo, &c. & malum punicum acidum in aceto coquatur ad tabem: tum deteratur, ad leuorem, & parti laboranti, & circumiacenti imponatur, & recondita facultate præditum sequens pulicula applicetur; succorum symphyti maioris, scabiosæ, pedis columbini, an. drach. 2. farinæ hordei vnc. 3. misce. Quidquid carnis emortuæ fuerit, radicitus exstirpandum: quod nisi succedat, inurendum ferro candenti, dum omni ex parte sensus doloris sit; & crustalaxanda, vel si vri recuset, adhibeatur plebeius quis, qui carbonem mordicus apprehensum radicitus euellat.

Porro diæta esto tota acida: vt pruna acida, oxalis in iusculis: & aceti, mali punici, & aranciorum, atq; omphacii condimenta.

Ad Gangrenam. Signa.

Gangrena signa

Color partis liuidus, fuscus, arteriarum motus in parte insensibilis, putredo, ac fœtor: pressa pars digitis cedit: atque etiam apparet cutis a parte semota.

Remedium.

Remediū.

Gangrena quamprimum excidenda: quanquam pars aliquem sensum obtineat. Cor roborandum theriaca ex aqua cardui benedicti, angelicæ, &c. Et epithemata ex sympatheticis cordi imponantur: atq; veneni vim retundentibus, fantalis, corallo, rosis, theriaca, mithridatio, &c. Pars ipsa scarificanda, vel ubi opus est, ad ossa vitatis vasis, nisi & ipsa putredunt, incidenda: & pars aqua salsa lauanda in qua ægyptia-

gyptiacū, & aloe bullierint: sub finē addita aqua vitæ
est lotionē, ægyptiacum imponendū, & ægyptiaco
liud emplastrū loca vicina cōplectēs, putredini re-
stans ex fabarū farina, bordei, orobi, lupinorū &c.
um aloe, myrrha, mastiche, aqua vitæ, & oxymelite
exceptis. Interea partes circumiacentes muniendæ
epellente, atque astringēte materia: succo planta-
ginis, solani, semperuiui, cum oleo rosaceo, bolo ar-
nena, oxyacantha &c. Atque sēpe repetenda reme-
lia hæc, quæ nisi fructum præstiterint, cauterio pars
renda, & ab eo, porri succus, cum sale trito atque
dissoluto apponendus.

Quod si nec cauteria proficiant, pars (si præscindi
poterit) est ex amputanda prorsus: potius ex sana
parte aliquo exciso, quam ex ægra relicta.

Hactenus venenum gentium, sequitur extraneum.

*Venenum
extraneū.*

Extraneum est { Intro sumtum.

vel { Foris exceptum.

Intro sumtum est du- { Spiritu raptum.

plex: vel { Potum, vel æstum.

Spiritu raptum, ut pestis.

Signa.

Rapto per inspirationem veneno, continuo per *Testis f-*
pulmones cor petit, & labefactat: huius, arteriarum. *gna.*
que spiritus, atque interdum humores, & vniuer-
sum corpus inquinat. Vires omnes vitales quamprimum
infringuntur, & squalent spiritus hinc pulsus
arteriarum exilior, imbecillior, frequentior, celeri-
or, quæ argumenta sunt pestis acutissima, quæ vno
die hominem rapit. In hæc nec ardor mordax, nec
fitis vehemens, ut nec laborans sibi febricitare vi-
detur: nec in vrinis, quid alieni apparet: sed synco-
pe, pulsu paruo, ac presso, vel assidua vomitione, vel
vigiliis, iactatione corporis, viriumque prostratione,
proditur: nullus item sensus doloris percipitur.

Si vna & humores corrumpuntur mitior pestis

est sine carbunculo: Carbunculo fociata grauior
Atque in his minus grauis, si bubo apparet ante a
groti decubitus.

Remedium.

Remediū. Vbi corpus plethoricum est, ad diminuendum
hanc, sanguis mittendus audacter: & frictionibus
(pro aegroti viribus) & vigiliis, venenum euocan-
dum, & leuibus pharmacis & clysteriis.

Cor muniendum antidotis: tormentilla, beto-
nica, morsu diaboli, scabiosa, vel electuaria ex bolo
vel theriaca, cum oxalidis stillitica, &c.

Aeris fiat frequens mutatio & temperatus sit.

Aluus quotidie ducatur clysteribus blandis & ca-
tharticis mollibus.

Cor epithematis muniatur ex aqua rosarum, vio-
larum &c. cum santalis, camphora, vel puluere be-
zoardico N. Præpositi, & subinde repetenda alexi-
teria: & vires, & cor recreanda diamargaritone, di-
arrhodo, &c.

Cibus este leuis, & acidis conditus.

Bubo si proruperit, conandum pro viribus foras
euocare, cucurbitulis, cum scarificatione: sanguisug-
is, cauteriis si vires ferant, catellis dissectis, & appli-
catis, vel attrahentibus pharmacis: vt in cepa inco-
cta theriaca, vel scabiosa, lysimachia. Vomica aperta,
sinatur die vna, vt virus exspiret.

Si pestis mitior sit, erumpunt bubonis loco, exan-
themata, morbilli, variolæ, atque in his, præstat fe-
briculam præcedere quam sequi. plures hic deterio-
res, paucioribus, maiores, minoribus, malæ prurigi-
nosæ, ardentes, & quas vomitus comitatur frequēs,
& alui fluor. item quæ intro redeunt, sunt perniciosi
plenissimæ: nisi aluus fluat & colluiem expurget:
solent apparere, primo, secundo, aut tertio post fe-
brem die: melius cito apparere, celeriter augeri &
maturari: atq; fere ad diem 7. maturantur.

Exan-

Exanthematis & iſthymatis magis obnoxii ſunt *Exanthema-*
 ſeri, ob corporis teneſcitatem: nec enis accidunt, *mata.*
 ſi conſtitutio aeris valde gravis fuerit. Ex his au-
 tem naſcentes grauiſſimæ ſunt. In his initio raptò vene-
 re, vniuerſum corpus, maxime caput ingraueſcit,
 calore plerumque concuſſitur, oculi tument, & illa-
 crymantur: facies quali inflammata rubefcit: rau-
 eſcat vox, ſpiritus crebrior, ac difficilius euadit: pul-
 ſus frequens, ac celer, & malo ingraueſcente, pro-
 ſtat in cute. Eſthymata puſtulis multis, toto cor-
 pore, confertim albo colore, extuberant: pituitæ, ac
 bilis miſtionem præ ſe ferentes. Exanthemata qua-
 ſi pulicum maculæ, fere rubra apparent: interdum
 purpurea, interdum viridia aut nigra.

Remedium.

Postquam eruperint, parcendum ſomno, atque *Remediũ.*
 ſum diaphoreticis, & ſudorificis vtendum: Ex deco-
 cto fœniculi, caricarum vel ficuum, ſemine apii, &c.
 ſum ſirupo acetoso ſimplici.

*Haſtenus inſpiratum venenum: ſequitur potum
 vel eſtum.*

Ad venenum ſumtum.

Aſutum ex hydrelæo vomendum calente, vel o- *Ad vo-*
 leum aut eius loco butyrum, ex decocto ſeminum *nenum*
 lini, maluæ, fœnigræci, bibendum. *ſumtum.*

Atq; poſt, clyſter paulo acrior, inſundendus ad
 inteſtina purganda: & ab his, lac copioſe potandũ:
 & antidotus veneno repurgans ſumenda larga quã-
 titate: vt terra lemnia, marrubii ſuccus, betonix
 folia, & præ ceteris theriaca vel mithridatium. drac.
 1. vel 2. pondere, vel bis etiam die.

Venena ſumta
 ſunt vel ex { Animalibus aut horum operibus
 vel in anima { Vegetabilibus:
 tis, eiſq; vel { Metallicis.

Ad animalia venenata: atq; primum ad Cantharides. Signa.

Ad Cantharides.

A Cantharide sumto: a stomacho ad vesicam cuncta morderi sentiuntur: & gustum similem pici, aut cedrino liquori habent. Dextra hypochondria inflammantur: Urina difficulter redditur, & sæpe vna sanguis exit: & per alium excernuntur qualia in terminibus intestinorum egeri solent: a nullo liquantur, anguntur, vertiginibus laborant tandem mente alienantur.

Remedium.

Hic oleum rosaceum potandum ex hordei cremore: & frequentes post vomitum clysteres ex cremore hordei, orizæ, cum semine fœniculi, & maluis. In vesicam item fundenda emulsio seminum frigidorum maiorum, cum decocto hordei, & balneum aquæ dulcis imperandum.

Ad Buprestem. Signa.

Ad Buprestem.

Buprestis sumto, gustus virosus offendit vehementer, stomachus, & venter dolent, & instar hydropicorum tument: extima corporis cutis intenditur, urina supprimitur.

Remedium.

Post vacationes, detur decoctum ficuum aridarum ex vino, & remittente malo, iuuabit & palmulas, & ex omni genere pyrorum edere.

Salamandra. Signa.

Lingua inflammatur, mens impeditur, tremor cum torpore quidam, & resolutione virget, partes quædam corporis in orbem liuoribus variantur, & subinde permanente veneno, putrefactæ defluunt.

Remedium.

Ad Salamandram.

His conuenit resinam e pinu, aut e picea sumere: vel galbanum cum melle, & nucleos pineos, cum decocto chamæpityos, vel ranarum ius, cum decocta eryngii radice sumere.

Tingitum

Pinorum cruce, Signa.

Oris palatque dolor, valida linguæ inflammatio, *Ad pino-*
machi intestinorumq; cruciatus, quæ cum pruri *rū arum.*
circumtendi sentiuntur: feruor toto corpore af-
git, & stomachi fastidium vrget.

Remedium.

His oleum melinum sumendum: & clystere ex-
iendum.

Lepus Marinus. Signa.

Gustus piscibus virosis haud absimilis: temporis *Ad lepore*
ogressu, aluus inolet, vrina supprimitur, & si quæ *marinū.*
eruperit, purpurei coloris cernitur. Auerantur
scæ omnes, præter fluuiatiles caneros: sudor fœ-
lus erumpit, & vomitus biliosus, & nonnunquam
anguine mixtus.

Remedium.

His sumendū continue lac asininum: aut passum,
ut sanguis recens, & calens anseris, aut cyclamini
dix trita ex vino propinanda.

Rana rubeta, & palustris. Signa.

Corporis tumor, pallor intensus buxo similis: & *Ad ranæ*
e spiritus trahitur: os fœtet, singultus infestat: & *rubetans*
emen aliquando inuoluntarie prorumpit. *& palu-*
strem.

Remedium.

His multum meraci vini sumendum, item arun-
nis radicis, vel ciperi drach. 2.

Porro cogendi sunt celeriter ambulare, & curre-
re: & calida quotidie lauandi sunt.

Cameleon. Signa.

Valida ventris erosio, dolor cum totius corporis *Ad Ca-*
eruersione, tremor, mox conuulsio, item vomitio- *meleontas.*
es spumantes, & pituitosæ: quibusdam singultus:
ox nihil sonat, facies distorquetur.

Remedium.

Pinguis tritici cremor calidus epotus, absinthii
orio: nitrum cum oxymelite, vel radícula præcor-

diorum fots: terebinthina, styrax, semen vrtica
folia cupressi, sumta

Cerebrum felu. Signa.

*Ad cere-
brum fe-
lu.*

Vertigines crebrae, stoliditas: amentia.

Remedium.

Potent moschi scrup.ß ex vino, vel diamoschi su-
mant drach i. quatuor horis ante cibum: mane, ex
vino, certos dies, dum malum cedat.

*Haftenus venena ex Animalibus: sequuntur
ex vegetabilibus.*

Altercum. Signa.

Altercū.

Mentis alienatio, ebriorum more.

Remedium.

Conquiescendum his: & mulla, vel lacasinium
& ficuum siccatum decoctum bibere his vtile.

Porro cichorium, sinapi, nasturtium, raphanus,
cepa, allia singula cum vino sumta, plurimum con-
ferunt.

Coriandrum. Signa.

*Corian-
drum.*

Rauicitatem facit, mentem mouet, similiter te-
mulentis: loquuntur turpia, totum corpus corian-
drum olet.

Remedium.

Potandum oleum irinum, & id ipsum clystere su-
mendum: atque tandem vinum meracum cum ab-
sinthio bibendum: & oua testa vacuata, & agitata,
cum muria sorbenda: & muria, & ius salsum galli-
naceum, vel anserinum, bibendum.

Tsyllium Signa.

Tsyllium.

Totum corpus refrigerat: torpetque cum reso-
lutione, atq; tristitia, vt animum despondeant.

Eaq; praesidio sunt, quae coriandro conueniunt.

Cicuta. Signa.

Cicuta.

Caligo: vertigines, vt nec minimum videant: sin-
gultus, mentis alienatio: & artuum perfrictio: vlti-
mo conuulsio, & suffocatio.

Rem-

Remedium.

Vinum meracum potandum per interualla, quibus interuallis, absinthium cum pipere, & vino exhibendum, vel passum per se potandum,

Opium Signa.

Veternus cum perfrictione & pruritu vehemens & toto corpore odor veneni percipitur. *Opium.*

Remedium.

Merum copiosum cum absinthio, & cinnamomo, piper cum castorio, & oxymelite.

Excitandi sunt, naribus admotis hyssopo aceto trito, vel pulegio, vel sternutatoriis infertis.

Aqua calida, & balneis fouendum corpus.

Carpesia. Signa.

Sopor & praesens strangulatio. Eadem quae cicuta conueniunt remedia. *Carpesia.*

Mandragora Signa.

Sopor, virium resolutio: validus veternus, atque ethargicus. *Mandragora.*

Remedium.

Corpus excitetur, & commoueatur admotis aëribus ad nares: & absinthium cum vino dulci sumendum. Caput aceto & rosaceo fouendum.

Aconitum. Signa.

Lingua cum astrictione quadam dulcescit: inde vertigines: praesertim in surgendo, & oculorum humiditates: thoracis, & praecordiorum grauitas, ut multi erumpant flatus. *Aconitum.*

Remedium.

Chamaepitys, origanum, marrubium, aut abrotonum ex vino. Vinum in quo ferrum, aurum vel argentum, extinctum est frequentius.

Ixia. Signa.

Linguae inflammatio; valida mentis abalienatio; omnium naturalium excretionum suppressio, murmura alui, ac strepitus: nec quicquam tamen elicitur. *Ixia.*

Remedium.

Abfinthium cum vino diluto, copiosoque, aut c
aceto, vel oxymelite, vel castorium, & ruta, ex ei
dem: & acetum calidum.

Ephemorum. Signa.

Ephemorum.

Totius corporis pruritus velut urtica, aut squill
tactum: interiora roduntur: stomachus uritur, cum
ponderosa gravitate, & malo inualecente, cruent
strigmentis mista, per aluum egeruntur.

Remedium.

Folia quercus, aut glandium, aut malicorii, au
sarpilli decoctum cum lacte bibendum: lac vacci
num calidum potandum, & simul in ore continen
dum.

Taxus. Signa.

Taxus.

Perfrictio totius corporis, strangulatus.

Remedium.

Omnia, quæ cicutæ conveniunt.

Solanum furiosum. Signa.

Solanum furiosum.

Gustum lactis repræsentat, singultus crebri: lin
guæ humiditas, & larga sanguiniseductio.

Remedium.

Dulce vinum tepidum, cum anisi modico potum
amygdalæ, & elixa gallinarum pectora: conchyli
cruda pariter, & tosta, in cibo: locustæ marinæ, &
gammari, & ex ipsis ius esculentum, potui sumtum.

Sardoniam. Signa.

Sardoniam.

Mentis alienatio: convulsio cum labiorum con
tractione, ut risus imaginem præbeat.

Remedium.

Aqua mulsa copiosa, & lactis potio, corporis in
unctio ex calefacientibus ubi prius in hydrelaum.
descensum sit: a quo corpus est vehementer infri
candum, & inungendum.

Papaver corniculatum.

Papaver corniculatum.

Eadem infert mala quæ opium, atq; eadem the
rapeia curatur.

Pharis.

Tharicum. Signa.

Resolutio cum furore, ac conuulsione.

Tharicū.

Remedium.

Cinnamomum, aut myrrha, ex vino: aut spica
ardi drach. 2. myrrhæ oboli duo cum passo misti.

Caput deraſum, farina hordacea, cum ruta trita,
aceto, cataplaſmatis modo inducendum.

Toxicum. Signa.

Labrorum, & linguæ inflammatio, mentis furor, *Toxicum*
ſi coerceri non poteſt, variis obnoxius imaginibus,
ſere deſperatum malum eſt.

Remedium.

Vinculis continendi, & vi cogendi, vt vinum dulce,
cum roſaceo bibant, reddantque vomitum, & rorum ſemen
cum vino potum, peculiariter conuenit, & mala Coronea
his, cum pulegio potanda.

Fungi. Signa.

Strangulatus laqueis ſimiles: interdum & inteſtina
exulcerantur. *Fungi.*

Remedium.

Lixiuum ex ſarmentis, aut pyraſtri ſurculorum cinere,
cum poſca, ſale, vel nitro potum. Item pyraſtri
ſylueſtria, incocta, ac ſumta. Si exulcerentur inteſtina,
detur abſinthium, & ficum decoctum, copioſe. Porro
in calidam descendendum: & cruda hordeacea farina,
cataplaſmatis modo, præcordiis admodum admo-
nenda.

Sanguis taurinus. Signa.

Spiritus difficultatem & ſtrangulationem inducit: tonſillarum,
& gutturis meatus valida conuulſione obſtruendo,
lingua rubet: & dentes tincti ſanguine apparent. *Sanguis taurinus.*

Remedium.

Vomitus hic fugiendus, atque primum incidendus
ſanguis coagulatus, & aluus ducenda, vt coagulo,
cum aceto, ſanguis attenuandus eſt, & clyſtere

G

euocandus Stomachus, ac venter, hordeacea farina cum aqua multa obducendus.

Ad lac coagulatum.

Lac coagulatum. Lac coagulatum eadem parit symptomata: & eisdem remediis curatur. Atque hic saluum nil offere debet.

Ad mel Heracleoticum.

Mel Heracleoticum. Eadem parit symptomata cum aconito: & eisdem curatur remediis.

Hactenus ex vegetabilibus: Sequuntur mineralia

Ac primum Gypsum.

Gypsum. Strangulat in lapidem concrefcens. Eadem conuenit, quæ fungis debeantur, & clyster ex passo, & maluis decoctis indatur.

Cerusea. Signa.

Cerusea. Singultus, tussis, lingue siccitas, extremorum perfrictio, cum mentis abalienatione, & difficili corporis motu.

Remedium.

Lixiuum e vitium sarmentis propinetur, lacryma thuris, vel prunorum gummi, aut vlni humor, qui istius folliculis seruat, & cum aqua tepida, vomitus quotidie citetur.

Calx, Sandaracha, Auripigmentum.

Signa.

Calx Sandaracha, auripigmentum. Ventris, & intestinorum, torsiones, cum vehementi rosione.

Remedium.

Vomitiones faciles: & aluum lubricam facientia, vt hibisci, & malua succus, decoctum seminis lini, tragi, orizæ, lac copiosum, aqua multa, iura pingua, & boni succi.

Argentissuma. Signa.

Argentissuma. Grauitas stomachi, ventris, & intestinorum, cum torsionibus validis nonnunquam & intestina pondere

ere vulnerat, & disrumpit: vrinam supprimit: corpus intumescit, color fit plumbeus.

Remedium.

Agrestis hormini semen, cum vino, myrrhæ oboli res: absinthium: hyssopum aut apii semen: aut piper, aut ligustri flos, cum vino, palumbium finus aridus, cum nardo, & vino.

Plumbum.

Similia præcedenti pericula infert: & similia potulat remedia. *Plumbū.*

Argentum viuum.

Eadem quæ argenti spumæ conferunt, & lac co- *Argentum
viuum.*

Uchementia cathartica: Veratrum album, Thapsia, elaterium, Agaricus niger, &c.

Sistenda purgatio somno, & quiete inductis, & contringentibus, & theriaca sumta, & frictionibus. *Cathartica uehementia.*

*Hactenus ad Venena sumta: Sequuntur ad
feruillata.*

Foris illatum est } Cum vulnere inflatum:
duplex: vel } vel absque eo.

Si cum vulnere sit, supra vulnus pars deliganda, non tamen nimis arcte: Homo adhibeatur, qui venenum ore puto, prius vino abluto, vel oleo ore contento, exsugat. Deinde, si pars admittat, cucurbitula cum multa flamma affigenda, scarificata & ipsa prius, & partibus vicinis, vel vltio (si necesse sit adhibenda) & si natura lethale vulnus sit, & immedicabile: pars (si extremorum aliqua sit) præcidenda: sed id antequam venenum reliquum corpus peruadat.

Si vulneratus plethoricus sit, sanguis mittatur.

Exhibendum autem cum cibis piper, aut allium, & vinum forte, ac generosum bibendum: & parti imponatur acria, vt cepæ cum polenta, aut pane: vel porra cum sale. Conuenit & acetum calidum superundere, in quo nepeta sit incocta: & gallinacci, & fi.

alia animalcula dissecta applicentur parti affectæ. Præterea bibant seryn, aut ericen, chamæpityn, cinamomum, vrticæ semen, & ante omnia theriaca: denique & sudores mouendi, & alui deiectiones.

Alque hæc omnia vulnorum venenatorum communia,

Sequuntur propria, atque primum, Ad Canis rabiosi morsum, Signa.

Canis rabiosi morsus signa.

Huius signa petenda primum a cane ipso, qui spectandus an rabidus sit. Signa Canes rabidi, potum, & cibum, auerſantur: siti premuntur, nec tamen bibunt: anhelant nō parum, aures inclinant, saliuam, & copiosam, & spumantem edunt, muti prorsus, & veluti insani sunt, vt ne domesticos quidem agnoscant: insiliunt sine latratu hominibus, pariter & bestiis, mordentque: vbi momorderunt, statim nil molestiæ afferunt, præterquam ex vulnere Et vt cōstet certo num rabidus sit, nucibus iuglandibus cōcisis, vulnus diligenter obstruatur, sequente die ablata, gallinis in cibo apponantur: & si ederint (fame adactæ edent) ac sequente die moriantur ab eis rabidus est qui momorderit.

Signa a symptomatis.

Hydrophobia (magna ex parte circa quadragesimum a morsu diem, quibusdam post sex menses, nonnullis sed id perraro, post septimum annum) cum conuulsione totius corporis, rubore (præsertim faciei) sudore, & anenxietate, omnem humorem fugiunt: alii canum more dilatrant, & obuium quemque dentibus petunt & inficiunt malo.

Remedium.

Naturæ succurrendum, ante hydrophobiæ inuasionem, vbi constiterit rabiosum esse, & antequam rapiatur in corpus venenum, aperientibus inductis, & ex alto reuocantibus: vt emplastro ex pice, acetoque acerrimo, & opopanace, vel theriaca cum aqua vitæ affricetur, vel cæpe, vel allia cum sale, ac ruta in-

a inducantur, & caustica imponantur, & vlcus ad quadraginta dies apertum teneatur.

Vinum dulce, vetustum, meracum potandum, & ac copiose, & allia, porra, cepæ, in cibo sumenda: & antidorus ex cancris fluuiatilibus, iure, & gentiana, sumenda, & theriaca satis larga quantitate, & æpius in die, ad dies quatuor vel quinq; ante omnia Æschrionis pharmacum ad rabidi morsum ex cancris fluuiatilibus. Purgatio item fiat ex helleboro, vel antimonio, præsertim si venenum iam corpus inuasit, atque tum sudores, dropacismus, synapismus etiam toto tempore.

Medicamentum Æschrionis ex cancris fluuiatilibus ita habet: Capiantur cancri fluuiatiles cum sol in Leonem transierit, luna decima octaua, vrantur in patella æris rubri, donec in cinerem redigantur, vt in puluerem leuissimum redigi possint: Sume thuris partem vnā, quinq; gentianæ, cancrorum decem. Huius medicamenti quotidie ad quadraginta dies detur mensura cochlearis magni, cum aqua, atq; si non protinus ab initio, sed post aliquot dies cura suscipitur, quotidie duo cochlearia sumenda sunt,

Vesparum, atq; apium ietus. Signa.

Dolor, pars rubet, propinqua partes tument.

Remedium.

Bubulus fimus, vel lutum illitum, farina hordeacea cum aceto, folia maluæ leuigata.

Thalangiorum morsus. Signa.

Locus rubescit, & veluti punctus, per ambitum apparet, nec tumet, nec incalescit, sed leuiter rubidus frigore, & pruritu, vexatur. Perfrictio, tremor corporis, grauitas, sudor frigidus, dolor vagus, pallor, continua vrinx excernendæ incitatio, quibusdam vrinx difficultas, colis intentio, oculi humens.

*Vespariū
atq; apii
ietus.*

*Thalangiorū mor-
sus.*

inguina, & poplites intenduntur, rigentque conuulsorio modo.

Valida stomachi rosio vrget, lingua sermonem manifeste non explicat, vomitus aquæ, vel araneorum telis similium erumpit: quæ aliquibus & per urinam, & aluum descendunt.

Remedium.

Cinis ficulneus cum sale leui, ex vino maceratus, imponatur, vel aristolochiæ puluis, cum farina hordeacea aceto madefactæ: & vlcus aqua salsa calida diligenter fouendum, & balneo frequenti vtendum, & propinandum drachmas duas seminis abrotani, anisi, vel aristolochiæ, vel trifolii herbæ semen. Et canceri fluuiatilis succum, cum lacte, & apii semine.

Ad aranea ictum. Signa.

Aranea ictus.

Validi dolores circa media præcordia, rubor partium, urinx difficultas, nonnunquam suffocatio.

Remedium.

Allia sumenda, & vinum meracum superbibendum.

Scorpionis. Signa.

Ictus Scorpionis.

Locus inflammari incipit, duratur, rubet, & cum dolore circumtenditur, nunc feruor, nunc frigus vicissim inuadit, acceditque dolor, qui modo decrescit, modo intenditur, sudor, horroris sensus, tremor extremorum, perfrictio, inguina attolluntur, pars intenditur, sæpe flatus, cum sonitu per sedem erumpit, pili rigent, cutis fit discolor, dolorque tota cute affligit, ceu acus spiculo excitatus.

Remedium.

Lac ficulneum protinus instillandum, & ipse scorpius per se tritus, vulneri imponendus, & sulphur vitium resina terebinthina exceptum. Propinandum autem aristolochiæ drachmas duas, præsertim corticis, cum vino, vel gentianam, vel trifolii,

lii, aut ocimi semen, balnea, & diaphoretica vini diluti, larga portio.

Ad Scolopendræ morsum. Signa.

Locus affectus in orbem luescit & attollitur, interdum faciei similis: rarius ruber apparet, exulceraturq; statim ab ipso morso, toto corpore pruriginis sensus percipitur: & si a marina imperiti sunt, aquosus, & pellucidus tumor efficitur: a terrestri, rubeus.

Remedium

Plagæ imponatur sal. bene tritus: vel ruta leuigata: aut cinis aceto maceratus, aut scilla. Locus foueatur prius muria, cum aceto. Potui detur aristolochia, aut serpillum, aut calamintha, cum vino.

Ad stellionis morsum. Signa.

Intente dolent: morsum liuidum habent.

Remedium.

Plaga cepis, & alliis integatur: eademque edantur, & vinum meracum superbibatur,

Ad felis morsum. Signa.

Validus dolor, locus affectus liuidus.

Remedium

Eadem quæ ad stellionem, conferunt.

Mus araneus. Signa.

Dolores pulsatiles: & in singulis dentium eius animalis ictibus, rubores. Pustula surgit sanioso humore plena: propinquæ partes omnes liuent cute pustula dirupta, albū apparet vlcus, dilaniatis membranis nervosis. Excidunt partes exesa, de passione orta, his quæ serpunt simili. Etiam intestinorum tormina sequuntur, urinx difficultas, & frigidi madoris vndique eruptio.

Remedium

Mus ipse dissectus, applicetur: vel galbani spleniū imponatur, vel sinapi cum aceto lenigatum. Mus ipse qui momorderit, exaste tritus, ex vino bibatur: aut agni hædive coagulum vel gentianæ radix.

*Vipera.**Vipera Signa.*

Dolor loci, tum totius corporis, in morfu duo foramina, paruo inuicem spatio discreta: atque ex his sanguis fluit, & humor saniosus: deinde oleosus, postremo etiam aruginosus, tumores iuxta morsum subrubri, linidi, assurgentes: corpus decolor, vertigines oculorum, stomachi resolutio, anima defectus, quibusdam vomitiones biliosæ, urinx angustia, pustulæ in comorsa parte rumpentes, velut in ambustis. Tandem depassio inuadit ad viciniam procedens, gingivæ cruentantur, tremor, sopor, frigidi sudores. Minus periculum est in maris viperæ morfu, quam in feminæ, & minus vbi morfi cibum præsumserint.

Remedium.

Allii esus, & vini meraci potio: item porra, cepæ & salsamentum quam acerrimum, & theriacæ loco applicentur, gallinæ pulli dissecti & locus foueatur trifolii decocto, aut pulegii, aut muria, adiecto aceto.

*Amphibana & scytale.
Actus dry-*

Ad amphibana, & scytale.

Eadem symptomata, & therapeia.

Ad dyni istum. Signa.

Tumor circa locum vitiatum cum rubore, pustulæ in circuitu assurgunt. Aliquando emanat aquosa sanies, stomachi rosio vexat & torsiones.

Remedium.

Aristolochia vino pota, & trifolium herba, & cuiuscunq; quercus fructus leuigatus, & potatus,

Applicandæ autem ilicis radices tuscæ, quæ malo auxiliantur.

Ad Hamorrhoidum. Signa.

Hamorrhoidum.

Validi cruciatus: quibus corporis raritates breues, atque angustæ, redduntur. Multus a plaga sanguis erumpit: & quandoque cicatrix inducatur, de quo rumpitur: funditq; sanguinem, cruenta excernuntur

nuntur recrements: sanguis qui defluit in grumum
cōcretus est: tussi sanguinem ex pulmone reliciunt,
& euomunt.

Remedium.

Periculosissimum omnium hoc. Vitis folia cocta,
& cum melle leuigata, imponantur. & hæmorrhoi
ipsius caput crematum potui dandum: atq. nisi ma-
ture occurratur, & priusquam symptomata vehе-
mentia eruperint, desperata salus est.

Ad ipsam. Signa.

Ardor intolerabilis urget, sitis tanta, ut nec exstin- *Dipsas.*
gui, nec intermitteri possit: cōsimilisq. totius corporis
habitus consequitur, velut in hydropicis, propter as-
siduam potus ingestionem.

Remedium.

Eadem quæ ad hæmorrhoum, præter ipsius ca-
put: proprie, portulacæ folia trita ex aceto imponē-
dar item allium album, porrum, ruta, vitica.

Ad natricem. Signa.

Natrix.

Vlcus factum dilaturatur, & linefcēs augetur: sanies
ex eo nigra, copiosa, & fœdi odoris, qualis ex depa-
scente vlcere cernitur.

Remedium.

Applicetur origanum tritum, & aqua subactum;
& lixiuia cum oleo indenda: & querna radix minu-
tim contrita. Bibantur autem binę aristolochiæ dra-
chmæ in potione poscæ cyathis duobus: & fauus re-
cens cum aceto.

Ad cenchrum. Signa.

Morsus viperæ similis est, putredo comitatur, & *Cenchrus.*
carnes intumefactæ prius, (ut in aqua inter cutem)
defluant: lethargo, veterinoq. premuntur.

Remedium.

Lactucæ, & lini semen, pariter mista, applicentur:
& satureia trita. Potui dentur cētaurii radices drach.
duæ, cum ternis vini cyathis, vel aristolochiæ radix
similiter.

*Ceraſtis.**Ad Ceraſti morſum. Signa.*

Locus ex duritie, & puſtulis, intumefcit: emanat ex vulnere ſanies, modo nigra, modo ſuppallida & porraceo colore. Totum corpus varicum modo at- tollit: ingentale erigitur, mens alienatur, oculi ob- ſcureſcunt, poſtremo tetanus.

Remedium.

Membrum mutilatio quam mox à morſu: & in his, & propinquis partibus, omnē carnem circum ſecare ſtatim, & radicibus vſq; ad os exſcindere oportet: & reliquæ ferro candenti adrendæ.

*Aſpis.**Ad aſpidem. Signa.*

Acus punctura ſimilis exiſtit & omnino exiguus ſine tumore apparet: ſanguis exiguus & niger deſtil- lat: ſub ta oculorū hebetudo innadit, & dolor cor- poris multiplex admodum, ſed mitis nec ſine qua- dam voluptate: mutatur color, & vireſcit: ſtomachi roſio exigua infeſtat: frons continue reuellitur pal- pebræ ſine ſenſu veluti in ſomno commouentur.

Remedium.

Eadem quæ ceraſti debetur ac celerrime matu- randum.

Nam etiam intra ſeptem vel octo horas mors aduentabit.

*Baſili- ſcus.**Ad Baſiliſcum. Signa.*

Plaga ſubaureo colore tingitur.

Remedium.

Caſtorii drachmæ tres potandæ ſimiliter & pa- paueris liquor.

*Paſtina- ca mari- na.**Ad Paſtinacam marinam. Signa.*

Dolor pertinax & totius corporis ſtupor.

Remedium.

Hepar diſſecandum & vulnere imponendum & vſus piſcis & in pollinem redactus.

*Murana.**Ad muranam. Signa.*

Eadem infert quæ viperæ morſus, & eandem the- rapeiam poſtulat.

Ad

Ad marinum draconem. Signa.

Draco

Ictus pars vulnerata grauius dolet cum inflā-
tione febre animi deliquium gangræna, & necrosis
nisi tempestiue succurratur.

Remedium.

Imponenda cepa sub prunis cocta cum fermento
& pauca theriaca, & pars incidenda scarificata, & the-
riaca cum aqua vitæ mista affricanda: porro piscis i-
pse dissectus vulnere medela est applicatus.

Ad Scorpionem marinum.

Scorpio

Sanatur ictus multo pisce dissecto & imposito, &
sulphure viuo cum aceto infricato.

marinus.

Ad crocodili morsum.

Morsus

Adeps ipsorum impositus prius vlcere repurgato
nitro cum melle trito.

crocodili.

*Ad hominis ieiuni morsum prius leguminibus
ex his præsertim lenticula usum.*

Remedium.

Vbi primum oleo morsum illeueris fœniculi ra-
dice cum melle obducito aut lomentum cum po-
sca, & oxyrodino frequenter immutando.

Morsus

hominis.

*Hactenus vulnere illata venena: sequitur quæ absq;
vulnere insicit contagione tantum.*

Lues Venerea. Signa.

Huius pro corporis partiumq. natura infinita ex-
citantur symptomata. Cuicunq. particulæ lues pri-
mum insederit, illic inhærescens pustulam excitat,
interdum vlcusculum. Deinde intro venæ cavæ san-
guinem arterieq. maioris spiritum labefactat, tum-
que bubo prorumpit in inguine, inde vasis sperma-
ticis infectis ac renibus gonorrhœa virulenta. Cum
in iecur, & ventriculū irrepserit malum, leuis alui
fluor atq. vna cū iecore sanguis polluitur, profiliunt
liuidæ rubentesq. pustulæ, vlcuscula crustosa & her-
petes, nonnullis vlcera caua atque maligna, biliosis
phagedenica, melancholicis cancrofa, pituitosis sor-

Luis ve.

nerea si-

gna.

didatumoreq. mucoso foetidoq. manantia, sanguineis crebriora & carbunculi effigies. Omnia labris perduris tumentibus inuersis, quæ tandem carne exesa ossa depascunt primum tenella nasus, tum solidiora, quæ tempore cariosa atq. putrida excidunt. Cum malum in cerebrum obrepserit omnia redundant pituitosis excrementis, quæ capite interclusa magnum dolorem & acerbum commouent. Sin in articulos & ossium membranas ruat, his immanes dolores excitantur motu præsertim. affligentes & in tophos & duros humores concresecunt doloris haud expertes. In ossium substantia: hæc ipsa diffunduntur in tumorem, & tandem putrefaciunt: & huius vapore maligno in cutim dilato, pilorum defluuium parit. Atque his omnibus malis, in vrinis nullum signum malum. Interdum male curata recidua fit post 30 annum: & raro per similes est radici: neq. eadē habet symptomata: sed fere distillatione, arthritide, artuum dolore, tophis, vel ossium carie, molesta: neq. adeo contagiola est, exitiosissima quæ aut à visceribus, aut à partibus obliquis ortum ducit.

Remedia.

Remediū. Therapeia luis venereæ duplex est: Guaiaci potione: vel illitu ex hydrargyro. Ceteræ inanes sunt, vel haud tanti momenti.

Ex Guaiaci potione.

Lignum Guaiaci recens, nigrum, & resinofum, lima in puluerem redigatur: huius pulueris sex libra in aquæ fontanæ tepidæ aut fluiatilis libris sex diem vnum maceretur: deinde lento admodum igni (vase fictili vitrato, cooperulato) dū libræ duæ supersunt: etiam (morbo inueterato) dum quarta tantum pars supersit. Decoctum perfrigerari sinatur dū defideat: deinde percoletur: & in vitreum vas indatur: post vas diligenter obstruendum. Atq. hoc primum decoctum, valde medicamentosum est.

Aliud

Aliud dilutius.

Sumatur noui pulueris Guaiaci ſelibra, decoquatur in libris decem (vbi prius horas 15 maceratus fuerit) dum libræ 7. ſuper ſint.

Poterunt vtriq. decocto (vt iucundiora ſint) paſſulæ, & glycyrrhiza incoqui.

Ergo hyeme in conclauigni continuo calefacto & bene ventis & aeri obſtructo ægrotus contineatur. Atque alius primum ducatur ex medicamento phlegmagogo, poſtridie purgationis ſi corpus plethoricum ſit, aperiatur vena basilica aut mediana. Deinde die tertio propinandum bis die ex valentiore decocto cyathus vel vnc 6 tepēs, hauſto guaiaco, horis aliquot, interquieſcendum lecto: & corpus ſtragulis operiendum ad ſudorem. Sudandum autem quamdiu vires ferant: atq. tum corpus ſiccandum: & è lecto ſurgendum, vbi corpus refrixerit, eſtibus offerendus. poſt quartam à ſumto medicamento horam, ad nonam: veſperi, ad ſeptimā. Alimenta eſto tenuis ſucci boni ex aſſis, potius quam elixis, videlicet ex pullis columbinis, & gallinaceis, &c. Panis vero eſto vnc. 4. delicatioribus, validioribus, vncia 6. in diem. bellaria ſint paſſulæ, modicum panis nautici biſcocti, aut ad ignē exſiccati, aut intermedia panis cruſtula. Potus eſto decoctum dilutius. Vinum & venus, vt inſenſiſſima vitentur, niſi vires valde inſirmæ ſint, at tum præmiſſo cyatho decocti, eſto illud vinum valde oligophorum. Inter paſtus, tempus hilariter tranſigendum: & omnia negotia tota therapeiæ hiſtoria intermittenda. Sin vero uſu guaiaci ſudores haud ſuccedant, vtres aqua calente pleni, vel lapides candentes vino exſincti, &c. ſunt plantis & genibus admouendi tenuibus telis inuoluti, & totum caput calefaciendum, & diligenter integendum.

Sudore pro patientis viribus effuſo, linteis calidis

& corpus tergendum exsiccandumq. & leuibus frictionibus quod in partibus extremis hæserit dissipandum.

Sed inprimis caput est exercendum calidis panis & diligenter perfricandum.

Interea toto curationis tempore seruetur alius renerrima ex carnum iusculo, vel decocto matutino incocta vel cassia fistula medulla seminiæ pondere, alternis diebus pastus initio.

Circa diem sextum ab initia cura oriri solent graui symptomata ex materia mota ac fusa. In ergo his obortis, vel imminentibus medicamēto pro viri ratione satis valido pituitam vacuante purgandum eo die validiori decocto & sudore intermisso atque deinceps post 6. vel 7. dies vtile erit simile catharticum sumere. Hæc ratio tenenda in grauiter affectis diutius ad diem quadragesimum aut quinquagesimum: recens inquinatis & leuiter affectis ad diem, 15. vel 20. Atq; sedatis omnibus symptomatis & doloribus perutile erit laconicum adire sumto prius guaiaci decocto in ipso laconici ingressu, atq. pro ægroti viribus sudores dies aliquot mouere, & postea 6. vel 7. diebus iterum purgare. Tum validum decoctum prætermittere aquoso tantum in pastu bibito atq. demum sensim atq. lente consueta diæta suscipienda.

Sin æstate cura suscipitur domo ægrotus haud continendus, quin deterfis sudoribus matutinis, sumtoq. cibo dum ad vespertinos sudores ventum sit quotidianis muniis vacare permittendum.

*Hactenus ex Guaiaci decocto Luis curatio; sequitur
ex hydrargyri illitu.*

℞ Argenti viui expurgati & præparati vnc. 6. sulphuris viui vnc. 3. sublimati drach. 3. axūgiæ porci cū herbis cephalicis incocta & salis expertes lib vnam:
vitellos

vitellos ouorum sub cineribus coctorum numero
tres: olei terebinthini & laurini, an. vnc. 2. theriacæ
veteris & mithridaticæ, an. vnc. β. fiat linimentum.

Ægro in angusto conclavi igni calefacto mane
ieiuno (nisi vires infirmæ sint: tum namq; hora an-
te litum in sculū sumi poterit vel olei vitellus, &c.)
oblinantur initio articuli tantum manuum, cubi-
torum, pedum, genuum; & humerorum, atq; de in-
ceps (robusto ægroto) & mali magnitudine postu-
lante, poterunt emunctoria oblini, totaque spina
dorsi: vitatis semper visceribus, & partibus nobili-
bus. Frictiones esto molles, & à partibus ductæ quæ
minus dolent. Quibus corpora densa sunt, hi obli-
nendi bis die, mane, & vesperi, sex à prandio horis.
Delicata corpora & imbecilla, alternis tantum
sunt perfricanda vel duobus diebus interpositis.
Deniq; ita viribus consulendum, vt nil remaneat
morbi: atque frictio tam diu, atque toties vsurpan-
da, dum malum extinctum, sit quod ex
symptomatis cessantibus
constabit.

F I N I S.

